

Devoir maison n°13 : Ln, IAF et suites

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier

1E1

Problème 1 - Fonction logarithme népérien

1)

2)

3)

4)

5) a)

b)

c)

Problème 2 - Inégalité des accroissements finis et suites

Partie A

1) Supposons être dans les conditions de l'énoncé. Posons :

$$g(x) = f(x) - f(a) - M(x - a)$$

$$h(x) = f(x) - f(a) - m(x - a)$$

Alors, d'une part, $g(a) = h(a) = 0$. De plus, ces deux fonctions sont dérivables sur $]a; b[$ par sommes de fonctions dérivables et pour tout $x \in]a; b[$:

$$g'(x) = f'(x) - M \leq 0 \text{ par hypothèse}$$

Ainsi que :

$$h'(x) = f'(x) - m \geq 0 \text{ par hypothèse}$$

Donc g est décroissante sur $]a; b[$. Comme elle est continue sur $[a; b]$, on peut conclure que, comme $b \geq a$, $g(b) \leq g(a) = 0$, d'où :

$$f(b) - f(a) \leq M(b - a)$$

Similairement, h est croissante sur $]a; b[$ et $h(b) \geq h(a) = 0$, d'où :

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a)$$



Ce qu'il fallait démontrer.

Partie B

On définit sur \mathbb{R}_* :

$$\varphi(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{5}{x} \right)$$

1) φ est impaire : soit $x \in \mathbb{R}_*$. Alors $-x \in \mathbb{R}_*$ et :

$$\begin{aligned} \varphi(-x) &= \frac{1}{2} \left(-x - \frac{5}{x} \right) = -\frac{1}{2} \left(x + \frac{5}{x} \right) \\ &= -\varphi(x) \end{aligned}$$

2)

• Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{5}{x} \rightarrow 0$ et par somme :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$$

• Quand $x \rightarrow -\infty$: $\frac{5}{x} \rightarrow 0$ et par somme :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = -\infty$$

• Quand $x \rightarrow 0^-$: $\frac{5}{x} \rightarrow -\infty$ et par somme :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \varphi(x) = -\infty$$

• Quand $x \rightarrow 0^+$: $\frac{5}{x} \rightarrow +\infty$ et par somme :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = +\infty$$


3) φ est dérivable sur son intervalle de définition comme somme de deux fonctions dérivables sur \mathbb{R}_* . Sa dérivée est pour tout $x \in \mathbb{R}_*$:

$$\varphi'(x) = \frac{1}{2} - \frac{5}{2x^2}$$

Ainsi, $\varphi'(x) \leq 0$ si et seulement si :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &\leq \frac{5}{2x^2} \\ \Leftrightarrow x^2 &\leq 5 \\ \Leftrightarrow x &\in [-\sqrt{5}; \sqrt{5}] \cap \mathbb{R}_* \end{aligned}$$

On a donc le tableau de variations suivant :



x	$-\infty$	$-\sqrt{5}$	0	$\sqrt{5}$	$+\infty$
Signe de $\varphi'(x)$	+		-	-	+
Variations de φ	$-\infty \nearrow -\sqrt{5} \searrow -\infty$		$+\infty \searrow \sqrt{5} \nearrow$		

4) TODO: Thomas ? dis moi si tu ne veux pas le faire :3

5) Soit $x \in \mathbb{R}_*$:

$$\begin{aligned}
 \varphi(x) - x &= \frac{x}{2} + \frac{5}{2}x - x \\
 &= -\frac{x}{2} + \frac{5}{2}x \\
 &= \frac{5 - x^2}{2x}
 \end{aligned}$$

Ce qu'il fallait démontrer.

6)

Partie C

1)

2)

3) a)

b)

4)

5)