

# Devoir maison n°13 : Calcul de $\zeta(2)$

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier

TE1

## Partie A - Convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$

1) Puisque pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{1}{k^2} > 0$ , la suite définie par  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$  est strictement croissante. De plus,  $u_1 = 1 \leq v_1 = 1$  et pour tout  $k \geq 2$ , par décroissance de la fonction inverse,  $\frac{1}{k(k-1)} \geq \frac{1}{k^2}$ . Ainsi, pour tout  $n \geq 2$  :

$$u_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = v_n$$

2) La suite  $(v_n)$  est convergente. En effet, pour tout  $n \geq 2$  :

$$v_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = 1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n}$$

Donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 2$ . Comme  $v_n$  converge, alors elle est majorée.  $(u_n)$  est donc alors également majorée, et croissante. Donc  $(u_n)$  converge par le théorème de la limite monotone.

## Partie B - Analyse de $(u_n)$

1) a) Par définition, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $C_n(0) = \sum_{k=1}^n \cos(0) = n$ . De plus, pour tout  $t \in ]0; \pi]$  :

$$\begin{aligned} C_n(t) &= \sum_{k=1}^n \Re(e^{ikt}) = \Re\left(\sum_{k=1}^n e^{ikt}\right) \\ &\stackrel{e^{it} \neq 1}{=} \Re\left(e^{it} \frac{e^{int} - 1}{e^{it} - 1}\right) \\ &\stackrel{\text{Angle moitié}}{=} \Re\left(e^{it} \frac{e^{i\frac{n}{2}t} \cdot 2 \sin(\frac{nt}{2})}{e^{i\frac{t}{2}} \cdot 2 \sin(\frac{t}{2})}\right) \\ &= \frac{\sin(\frac{nt}{2})}{\sin(\frac{t}{2})} \Re\left(e^{i\frac{(n+1)}{2}t}\right) \\ &= \frac{\sin(\frac{nt}{2}) \cos(\frac{(n+1)}{2}t)}{\sin(\frac{t}{2})} \end{aligned}$$

b) Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $C_n$  est une somme finie de fonctions continues sur  $[0; \pi]$ , et est donc continue sur  $[0; \pi]$ .

c) TODO



**d)** Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $t \in [0; \pi]$ ,  $D_n(t) = 1 + 2C_n(t)$ . Par continuité de  $C_n$  et opérations,  $D_n$  est également continue sur  $[0; \pi]$

**2)** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Les fonctions  $t \mapsto \frac{t^2}{2\pi} - t$  et  $t \mapsto C_n(t)$  sont de classe  $C^\infty$  par opérations (cos est de classe  $C^\infty$ ). On peut donc calculer par intégration par parties :

TODO :  $d$  droit

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \left( \frac{t^2}{2\pi} - t \right) \cos(nt) dt &= \left[ \frac{1}{n} \left( \frac{t^2}{2\pi} - t \right) \sin(nt) \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{1}{n} \left( \frac{t}{\pi} - 1 \right) \sin(nt) dt \\ &\stackrel{\sin(k\pi)=0}{=} -\frac{1}{n} \int_0^\pi \left( \frac{t}{\pi} - 1 \right) \sin(nt) dt \end{aligned}$$

Ainsi que :

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \left( \frac{t}{\pi} - 1 \right) \sin(nt) dt &= \left[ \frac{1}{n} \left( \frac{t}{\pi} - 1 \right) (-\cos(nt)) \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{1}{n\pi} (-\cos(nt)) dt \\ &= \left[ \frac{1}{n} \left( \frac{t}{\pi} - 1 \right) (-\cos(nt)) \right]_0^\pi + \left[ \frac{1}{n^2\pi} (-\sin(nt)) \right]_0^\pi \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} \left[ \frac{1}{n} \left( \frac{t}{\pi} - 1 \right) (-\cos(nt)) \right]_0^\pi &= \left( 0 - \frac{1}{n} (-1) (-\cos(0)) \right) = -\frac{1}{n} \text{ et} \\ \left[ \frac{1}{n^2\pi} (-\sin(nt)) \right]_0^\pi &\stackrel{\sin(k\pi)=0}{=} = 0 \end{aligned}$$

On en conclut donc que :

$$\int_0^\pi \left( \frac{t^2}{2\pi} - t \right) \cos(nt) dt = -\frac{1}{n} \left( -\frac{1}{n} \right) = \frac{1}{n^2}$$