


Devoir maison n°14 : Puissance d'un point par rapport à un cercle

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier
1E1

Problème 1 -

Partie A - Définition



1) a) Comme $[AA']$ forme un diamètre de Γ , les vecteurs \overrightarrow{AB} et $\overrightarrow{A'B}$ sont orthogonaux. Comme \overrightarrow{MA} et \overrightarrow{BA} sont colinéaires, $\overrightarrow{MA} \perp \overrightarrow{A'B}$ et :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MA'} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{A'B} \\ &= \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MA'}\end{aligned}$$

b) Comme $[AA']$ est un diamètre de Γ , en appliquant la formule de la médiane,

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MA'} = OM^2 - R^2$$

2) a) TODO

b) Notons H l'un des points T ou S : la preuve est la même pour les deux. Par définition des tangentes, le triangle MHO est rectangle en H , et par Pythagore :

$$\begin{aligned}MH^2 + OH^2 &= OM^2 \\ \Leftrightarrow P_{\Gamma}(M) &= OM^2 - OH^2 = MH^2\end{aligned}$$

Ce qui prouve l'égalité.

3)

- \mathcal{E}_1 : Pour un point M n'appartenant pas à Γ , $OM \neq R$ et $OM^2 \neq R^2$, d'où $P_{\Gamma}(M) \neq 0$.
Donc $\mathcal{E}_1 = \emptyset$. (Alternativement, en étendant la définition de P_{Γ} , $\mathcal{E}_1 = \Gamma$)
- \mathcal{E}_2 et \mathcal{E}_3 : Soit $M \in \mathcal{P} \setminus \Gamma$. Alors :



$$P_{\Gamma}(M) < 0 \Leftrightarrow OM^2 < R^2$$

$$\Leftrightarrow OM < R$$

Donc \mathcal{E}_2 est l'intérieur de Γ et \mathcal{E}_3 est l'extérieur de Γ .

4) a) C'est un cercle (montrer que comme P_{Γ} est cste, OM est constant)

b) :3:3

Partie B - Critère de cocyclicité

1) Notons Γ le cercle tel que $A, B, C, D \in \Gamma$. Comme A, B, C, D sont distincts, M n'appartient pas à Γ . Ainsi, le résultat du 1)b) d'unicité de la puissance d'un point s'applique et comme $[AB]$ et $[CD]$ sont des cordes de Γ :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = P_{\Gamma}(M) = \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD}$$

Ce qui donne l'égalité cherchée.

2) Supposons que

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD}$$

Par définition, $D, E \in (MC)$. On a donc dans un premier temps \overrightarrow{DE} et \overrightarrow{MC} colinéaires. De plus, comme A, B, C, E sont sur un même cercle Γ , par unicité de la puissance d'un point, on obtient :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = P_{\Gamma}(M) = \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{ME}$$

En faisant la différence des deux expressions de $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$, on obtient :

$$\overrightarrow{MC} \cdot (\overrightarrow{ME} - \overrightarrow{MD}) = \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{DE}$$

$$= \vec{0}$$

Donc $\overrightarrow{DE} \perp \overrightarrow{MC}$. Comme \overrightarrow{DE} et \overrightarrow{MC} sont à la fois perpendiculaires et colinéaires, et que $\overrightarrow{MC} \neq \vec{0}$, $\overrightarrow{DE} = \vec{0}$ et $E = D$. Donc A, B, C, D sont bien cocycliques.

3)

Partie C - Quelques applications

1)

2) a)

b)

3)

