

Devoir maison n°9 : Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier
TE1

Problème 1 - Bac 1974

Soient $a, b \in \mathbb{R}^*$. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} u_0, u_1 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \end{cases}$$

Soit Δ le discriminant de l'équation caractéristique $x^2 - ax - b = 0$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

1)

$$u_2 = au_1 + bu_0$$

$$u_3 = au_2 + bu_1 = a(au_1 + bu_0) + bu_1 = (a^2 + b)u_1 + bu_0$$

$$u_4 = au_3 + bu_2 = a((a^2 + b)u_1 + bu_0) + b(au_1 + bu_0) = (a^3 + 2ab)u_1 + (ab + b^2)u_0$$

$$u_5 = au_4 + bu_3 = (a^4 + 2a^2b)u_1 + (a^2b + ab^2)u_0 + (a^2b + b^2)u_1 + b^2u_0$$

$$= (a^4 + 3a^2b + b^2)u_1 + (a^2b + ab^2 + b^2)u_0$$

$$u_6 = au_5 + bu_4 = (a^5 + 3a^3b + ab^2)u_1 + (a^3b + a^2b^2 + ab^2)u_0 + (a^3b + 2ab^2)u_1 + (ab^2 + b^3)u_0$$

$$= (a^5 + 4a^3b + 3ab^2)u_1 + (a^3b + a^2b^2 + 2ab^2 + b^3)u_0$$

2) On suppose $\Delta > 0$. On note α et β les solutions de l'équation caractéristique.

a) D'après les relations coefficients-racines d'un polynôme du second degré, on a :

$$\alpha + \beta = -\frac{-a}{1} = a \text{ et } \alpha\beta = \frac{-b}{1} = -b.$$

Ainsi, la relation (1) peut se réécrire comme suit :

$$u_{n+2} = (\alpha + \beta)u_{n+1} - \alpha\beta u_n$$

$$\text{i.e. } u_{n+2} - \alpha u_{n+1} = \beta(u_{n+1} - \alpha u_n).$$

b) On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_{n+1} - \alpha u_n$ et $w_n = u_{n+1} - \beta u_n$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. D'une part, $v_{n+1} = u_{n+2} - \alpha u_{n+1}$ soit d'après la relation précédente, $v_{n+1} = \beta(u_{n+1} - \alpha u_n) = \beta v_n$. La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc géométrique de raison β .

D'autre part,



$$\begin{aligned}w_{n+1} &= u_{n+2} - \beta u_{n+1} \\&= (\alpha + \beta)u_{n+1} - \alpha\beta u_n - \beta u_{n+1} \\&= \alpha u_{n+1} - \alpha\beta u_n \\&= \alpha w_n.\end{aligned}$$

La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc géométrique de raison α .

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}v_n &= v_0 \beta^n = (u_2 - \alpha u_1) \beta^n \\w_n &= w_0 \alpha^n = (u_2 - \beta u_1) \alpha^n\end{aligned}$$