

Mathématiques : Devoir maison n° 5

Thomas Diot, Jim Garnier, Jules Charlier, Pierre Gallois
1E1

Partie A - Méthode de Cardan

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0 \quad (E_0)$$

1)

$$X = x + \frac{a}{3} \Leftrightarrow x = X - \frac{a}{3}$$

On remplace x dans (E_0) .

$$\begin{aligned} & \left(X - \frac{a}{3}\right)^3 + a\left(X - \frac{a}{3}\right)^2 + b\left(X - \frac{a}{3}\right) + c = 0 \\ \Leftrightarrow & X^3 - 3X^2\left(\frac{a}{3}\right) + 3X\left(\frac{a}{3}\right)^2 - \left(\frac{a}{3}\right)^3 + a\left(X^2 - 2X\left(\frac{a}{3}\right) + \left(\frac{a}{3}\right)^2\right) + bX - \frac{ab}{3} + c = 0 \\ \Leftrightarrow & X^3 - aX^2 + aX^2 + bX + \frac{a^2}{3}X - 2\left(\frac{a^2}{3}X\right) - \frac{a^3}{3^3} + \frac{a^3}{3^2} - \frac{ab}{3} + c = 0 \\ \Leftrightarrow & X^3 + \left(b - \frac{a^2}{3}\right)X + \frac{2a^3}{3^3} - \frac{ab}{3} + c = 0 \\ \Leftrightarrow & X^3 + pX + q = 0 \quad (E_1) \end{aligned}$$

$$\text{avec } p, q \in \mathbb{R} \text{ tel que } \begin{cases} p = b - \frac{a^2}{3} \\ q = \frac{2a^3}{3^3} - \frac{ab}{3} + c \end{cases}$$

2)

a)

$$X = u + v \quad \text{avec } u, v \in \mathbb{R}$$

On remplace X dans (E_1) .

$$\begin{aligned} & (u + v)^3 + p(u + v) + q = 0 \\ \Leftrightarrow & u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3 + pu + pv + q = 0 \\ \Leftrightarrow & u^3 + v^3 + v(3uv + p) + u(3uv + p) + q = 0 \\ \Leftrightarrow & u^3 + v^3 + (u + v)(3uv + p) + q = 0 \quad (E_2) \end{aligned}$$

b) On impose $3uv + p = 0$ donc (E_2) devient :

$$u^3 + v^3 + q = 0 \quad (E_3)$$

c)

$$\begin{aligned} & 3uv + p = 0 \quad (\text{relation imposée}) \\ \Leftrightarrow & uv = \frac{-p}{3} \\ \Leftrightarrow & u^3v^3 = \frac{-p^3}{3^3} \quad (\text{on élève au cube}) \quad (E_4) \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} & u^3 + v^3 + q = 0 && \text{d'après } (E_3) \\ \Leftrightarrow & u^3 + \frac{u^3 v^3}{u^3} + q = 0 && (*) \\ \Leftrightarrow & u^3 + \frac{-p^3}{3^3 u^3} + q = 0 && \text{d'après } (E_4) \\ \Leftrightarrow & u^6 - \frac{p^3}{3^3} + qu^3 = 0 && \text{(on multiplie par } u^3) \end{aligned}$$

Avec $U = u^3$ on a :

$$U^2 + qU - \left(\frac{p}{3}\right)^3 = 0 \quad (E_5)$$

qui est une équation du second degré, u^3 est donc solution d'une équation du second degré.

À l'étape (*) nous aurions pu multiplier et diviser par v^3 sur u^3 , nous aurions alors obtenu une équation similaire à (E_5) mais avec v à la place de u .

u^3 et v^3 sont donc racines d'un polynôme du second degré.

Partie B - Exemples

Partie C - Formules

3)

Notons P le polynôme de l'équation (E_1) . On sait qu'il existe une racine $X_0 \in \mathbb{R}$ de P si et seulement si il existe u, v tels que u^3, v^3 sont les racines du polynôme $D(x) = x^2 + qx - \left(\frac{p}{3}\right)^3$. Ce polynôme a pour discriminant :

$$\begin{aligned} \Delta &= q^2 + 4 \left(\frac{p}{3}\right)^3 \\ &= \frac{27q^2 + 4p^3}{27} \end{aligned}$$

Ainsi, si $\Delta > 0$, le polynôme a deux racines distinctes $U, V = \frac{-q}{2} \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2}$, qui donnent le choix unique de :

$$u, v = \sqrt[3]{\frac{-q}{2} \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2}}$$

Et enfin le choix unique de :

$$X_0 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{27q^2 + 4p^3}{108}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{27q^2 + 4p^3}{108}}}$$

Qui est donc la seule racine réelle de P .¹

4)

1. Nous avons conscience que cet argument n'est pas très rigoureux, mais la méthode de l'exercice suivant n'a pas porté ses fruits sur celui-ci pour prouver l'unicité de X_1 ...

Si $\Delta = 0$, D a une racine double $U = -\frac{q}{2}$. On doit donc poser $u = v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2}}$. Donc $X_1 = 2u$ est une racine de (E_1) .

En faisant la division euclidienne de P par $x - X_1$, on trouve $P(x) = (x - X_1)Q(x)$ avec un deuxième facteur quadratique $Q(x) = x^2 + X_1x + (X_1^2 + p)$ dont le discriminant Δ' est :

$$\Delta' = -3X_1^2 - 4p$$

On trouve enfin que :

$$\begin{aligned}\Delta' = 0 &\iff -12u^2 = 4p \\ &\iff -u^2 = \frac{p}{3} \\ &\iff -(\sqrt[3]{-\frac{q}{2}})^2 = \frac{p}{3} \\ &\iff -\frac{q^2}{4} = \left(\frac{p}{3}\right)^3 \\ &\iff \Delta = 0\end{aligned}$$

Comme $\Delta = 0$, $\Delta' = 0$ et Q a une racine double $X_2 = -\frac{X_1}{2}$. Ainsi, si $\Delta = 0$, les seules racines de P sont :

$$X_1 = 2\sqrt[3]{-\frac{q}{2}} \quad X_2 = \sqrt[3]{\frac{q}{2}}$$