

# Devoir maison n°7 : Autour de Farey

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier

1E1

## Partie A - Somme des cancrs dans $\mathbb{Q}_+$ .

Soient  $x = \frac{a}{b}, y = \frac{c}{d}, z = \frac{e}{f}$ , avec  $a, c, e \in \mathbb{N}$ , et  $b, d, f \in \mathbb{N}^*$ .

1)

$$x \oplus x = \frac{a}{b} \oplus \frac{a}{b} = \frac{2a}{2b} = \frac{a}{b}$$

Donc  $x \oplus x = x$ .

---

2)

$$x \oplus y = \frac{a+c}{b+d} \text{ et } y \oplus x = \frac{c+a}{d+b} = \frac{a+c}{b+d}$$

$x \oplus y = y \oplus x$  donc l'opération est commutative.

---

3) D'une part :

$$(x \oplus y) \oplus z = \left( \frac{a+c}{b+d} \right) \oplus \frac{e}{f} = \frac{a+c+e}{b+d+f}$$

Et d'autre part :

$$x \oplus (y \oplus z) = \frac{a}{b} \oplus \left( \frac{c+e}{d+f} \right) = \frac{a+c+e}{b+d+f}$$

$(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$  donc l'opération est associative.



## Partie B - B

## Partie C - Ensembles de Farey

1) Bah non en fait, Thomas python please

2) Si  $\frac{m}{n} \in F_n$ , alors  $0 \leq m \leq n$  et  $n \geq n - m \geq 0$ . Donc  $\frac{n-m}{n} \in F_n$ .

Comme  $n - (n - m) = m$ ,  $\frac{m}{n} \in F_n$  si et seulement si  $\frac{n-m}{n} \in F_n$ , qui est son symétrique par rapport à leur moyenne  $\frac{1}{2}$ . Ce centre de symétrie ne dépend pas de  $m$  : on en conclut donc que  $\frac{1}{2}$  est le centre de  $F_n$  pour  $n \geq 2$ .

3) Pas trouvé :/

4) Notons pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $P(n)$  l'assertion suivante : Si  $x < y$  sont deux fractions consécutives de  $F_n$ , alors :

- $\delta(x, y) = -1$
- La première fraction qui apparaît dans un  $F_m$ ,  $m > n$  est  $x \oplus y$

Il s'agit de prouver par récurrence  $P(n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**a) Initialisation :** Les seules fractions de  $F_1$  sont  $\frac{0}{1}$  et  $\frac{1}{1}$ . On a bien  $\delta(\frac{0}{1}, \frac{1}{1}) = -1$  et la première fraction qui apparaît entre elles dans un  $F_m$  suivant est  $\frac{1}{2}$  dans  $F_2$  : or,  $\frac{1}{2} = \frac{0}{1} \oplus \frac{1}{1}$ . Donc  $P(1)$  est vraie.

**b) Hérédité :** On suppose par la suite  $P(n)$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , et on prouve  $P(n+1)$ .

On pose  $x = \frac{a}{b}$  et  $y = \frac{c}{d}$  deux fractions irréductibles et consécutives dans  $F_{n+1}$ . Par C.3, on sait que  $x \in F_n$  ou  $y \in F_n$ .

**1<sup>er</sup> cas :**  $x \in F_n$  et  $y \in F_n$ .

Comme  $x$  et  $y$  sont consécutives dans  $F_{n+1}$ , alors elles le sont aussi dans  $F_n$ , car  $F_n \subseteq F_{n+1}$ . Alors par l'hypothèse de récurrence,  $\delta(x, y) = -1$ . De plus, la première fraction qui apparaît entre  $x$  et  $y$  est  $x \oplus y$  dans  $F_m$ ,  $m > n$ . Mais  $x$  et  $y$  sont consécutives dans  $F_{n+1}$ , donc  $m > n + 1$ . Ainsi, dans ce cas,  $P(n+1)$  est vérifiée.

**2<sup>e</sup> cas :**  $x \in F_n$  et  $y \in F_{n+1} \setminus F_n$ . Posons  $z \in F_n$  la fraction successive de  $x$  dans  $F_n$ .

Par hypothèse de récurrence, comme  $y$  doit être la première fraction à s'être intercalée entre  $x$  et  $z$ , on doit avoir  $y = x \oplus z$ . De plus, on a  $\delta(x, z) = -1$ . On a donc

$$\delta(x, y) = \delta(x, x \oplus z) = \delta(x, z) = -1$$

Ce qui valide la première condition de  $P(n+1)$ .

Posons maintenant  $t = \frac{r}{s}$  la première fraction irréductible à apparaître entre  $x$  et  $y$  dans un  $F_m$  pour  $m > n + 1$ .



D'abord, on a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \delta(t, x) \geq 1 \\ \delta(y, t) \geq 1 \end{cases} &\stackrel{\text{B.2}}{\iff} \begin{cases} \delta(x, t) \leq -1 \\ \delta(t, y) \leq -1 \end{cases} \\ &\stackrel{\text{B.3}}{\iff} x < t < y \end{aligned}$$

Comme  $t$  s'intercale entre  $x$  et  $y$ ,  $\delta(t, x)$  et  $\delta(y, t)$  sont bien supérieurs ou égaux à 1.

Ensuite, on a :

$$\begin{aligned} a\delta(y, t) + c\delta(t, x) &= a(cs - dr) + c(br - as) \\ &= acs - acs + rbc - rad \\ &= r(bc - ad) \\ &= -r\delta(x, y) \\ &= r \end{aligned}$$

Similairement, on a :

$$\begin{aligned} b\delta(y, t) + d\delta(t, x) &= b(cs - dr) + d(br - as) \\ &= bdr - bdr + sbc - sad \\ &= s(bc - ad) \\ &= -s\delta(x, y) \\ &= s \end{aligned}$$

Si  $\delta(t, x) \neq 1$  ou  $\delta(t, y) \neq 1$ , alors la fraction  $t' = x \oplus y$  a un dénominateur  $s' = b + d < s$ . De plus, comme  $\delta(x, y) = -1$ ,  $t'$  est irréductible. Donc  $t'$  s'intercale entre  $x$  et  $y$  strictement avant  $t$ , ce qui contredit la minimalité de  $t$ . Donc  $\delta(x, t) = \delta(y, t) = 1$ , et  $t = x \oplus y$ , ce qui conclut la preuve de la deuxième condition de  $P(n + 1)$  dans ce cas.

3<sup>e</sup> cas : TODO

## Partie D - C


## Partie E - Cercles de Ford

### 1) Tangents à l'axe des abscisses.

Prouvons que tout cercle de Ford est tangent à l'axe des abscisses. Soit  $\frac{a}{b}$  une fraction irréductible. Son cercle de Ford associé est de centre  $(\frac{a}{b}, \frac{1}{2b^2})$  et de rayon  $\frac{1}{2b^2}$ . Comme le rayon du cercle et son ordonnée sont égaux, tout cercle Ford est bien tangent à l'axe des abscisses.

### 2) Tangents entre eux quand consécutifs.

Soient  $\alpha$  et  $\beta$  deux fractions consécutives de  $F_n$  tel que



$$\alpha = \frac{m}{a} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{n}{b}$$

avec  $m, n \in \mathbb{N}$ ,  $a, b \in \mathbb{N}^*$  et  $\alpha < \beta$ .

Les deux cercles de Ford associés à  $\alpha$  et  $\beta$  sont tangents à l'axe des abscisses d'après la propriété