

# Devoir maison n°13 : Ln, IAF et suites

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier

1E1

## Problème 1 - Fonction logarithme népérien.

1)

---

2)

---

3) Soient  $x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

$$\begin{aligned}\ln(x^n) &= \ln\left(\prod_{k=1}^n x\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \ln(x) \text{ d'après 2} \\ &= n \ln(x).\end{aligned}$$

Donc  $\ln(x^n) = n \ln(x)$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}_+^*$ .

$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{1}{x}\right) + \ln(x) &= \ln\left(\frac{1}{x} \times x\right) \text{ d'après 2} \\ &= \ln(1) \\ &= 0 \text{ par définition.}\end{aligned}$$

Donc  $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ .

---

4) Pour tout  $x > 0$ , la dérivée de la fonction  $\ln$  est la fonction inverse, par définition. Or la fonction inverse est strictement positive sur  $\mathbb{R}_+^*$ . Donc la fonction  $\ln$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

---

5) a)

b)

c)

## Problème 2 - Inégalité des accroissements finis et suites.

Partie A



1) Supposons être dans les conditions de l'énoncé. Posons :

$$g(x) = f(x) - f(a) - M(x - a)$$

$$h(x) = f(x) - f(a) - m(x - a)$$

Alors, d'une part,  $g(a) = h(a) = 0$ . De plus, ces deux fonctions sont dérivables sur  $]a; b[$  par sommes de fonctions dérivables et pour tout  $x \in ]a; b[$  :

$$g'(x) = f'(x) - M \leq 0 \text{ par hypothèse}$$

Ainsi que :

$$h'(x) = f'(x) - m \geq 0 \text{ par hypothèse}$$

Donc  $g$  est décroissante sur  $]a; b[$ . Comme elle est continue sur  $[a; b]$ , on peut conclure que, comme  $b \geq a$ ,  $g(b) \leq g(a) = 0$ , d'où :

$$f(b) - f(a) \leq M(b - a)$$

Similairement,  $h$  est croissante sur  $]a; b[$  et  $h(b) \geq h(a) = 0$ , d'où :

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a)$$

Ce qu'il fallait démontrer.

### Partie B

On définit sur  $\mathbb{R}^*$  :

$$\varphi(x) = \frac{1}{2} \left( x + \frac{5}{x} \right)$$

1)  $\varphi$  est impaire : soit  $x \in \mathbb{R}^*$ . Alors  $-x \in \mathbb{R}^*$  et :

$$\begin{aligned} \varphi(-x) &= \frac{1}{2} \left( -x - \frac{5}{x} \right) = -\frac{1}{2} \left( x + \frac{5}{x} \right) \\ &= -\varphi(x) \end{aligned}$$

2)

• Quand  $x \rightarrow +\infty$  :  $\frac{5}{x} \rightarrow 0$  et par somme :


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$$

• Quand  $x \rightarrow -\infty$  :  $\frac{5}{x} \rightarrow 0$  et par somme :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = -\infty$$

• Quand  $x \rightarrow 0^-$  :  $\frac{5}{x} \rightarrow -\infty$  et par somme :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \varphi(x) = -\infty$$



- Quand  $x \rightarrow 0^+ : \frac{5}{x} \rightarrow +\infty$  et par somme :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = +\infty$$

**3)**  $\varphi$  est dérivable sur son intervalle de définition comme somme de deux fonctions dérivables sur  $\mathbb{R}^*$ . Sa dérivée est pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$  :

$$\varphi'(x) = \frac{1}{2} - \frac{5}{2x^2}$$



Ainsi,  $\varphi'(x) \leq 0$  si et seulement si :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &\leq \frac{5}{2x^2} \\ \Leftrightarrow x^2 &\leq 5 \\ \Leftrightarrow x &\in [-\sqrt{5}; \sqrt{5}] \cap \mathbb{R}^* \end{aligned}$$

On a donc le tableau de variations suivant :

$x$	$-\infty$	$-\sqrt{5}$	$0$	$\sqrt{5}$	$+\infty$
Signe de $\varphi'(x)$	+		-		+
Variations de $\varphi$	$-\infty \nearrow -\sqrt{5} \searrow -\infty$		$+\infty \searrow \sqrt{5} \nearrow +\infty$		

**4)**



5) Soit  $x \in \mathbb{R}^*$  :

$$\begin{aligned}\varphi(x) - x &= \frac{x}{2} + \frac{5}{2}x - x \\ &= -\frac{x}{2} + \frac{5}{2}x \\ &= \frac{5 - x^2}{2x}\end{aligned}$$

Ce qu'il fallait démontrer.

6) Soit  $x \in \left[\sqrt{5}; \frac{5}{2}\right]$ . Alors  $x \geq \sqrt{5}$ , et par le 3),  $\varphi'(x) \geq 0$ . De plus :

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &\leq \frac{1}{10} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} - \frac{1}{10} &\leq \frac{5}{2x^2} \\ \Leftrightarrow \frac{4}{5} &\leq \frac{5}{x^2} \\ \Leftrightarrow x^2 &\leq \frac{25}{4} \\ \Leftrightarrow x &\leq \frac{5}{2} \text{ car } x \geq \sqrt{5} \geq 0.\end{aligned}$$

Donc  $0 \leq \varphi'(x) \leq \frac{1}{10}$  sur  $\left[\sqrt{5}; \frac{5}{2}\right]$ .

**Partie C**



**1)** Par le tableau de variations,  $\varphi$  est croissante sur  $[\sqrt{5}, \frac{5}{2}]$ . Ainsi, si pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \in [\sqrt{5}, \frac{5}{2}]$ ,  $u_{n+1}$  est bien défini et :

$$\sqrt{5} \leq u_{n+1} = \varphi(u_n) \leq \varphi\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{9}{4} \leq \frac{5}{2}$$

Comme  $u_0 \in [\sqrt{5}, \frac{5}{2}]$ , par récurrence, la suite  $(u_n)$  est bien définie et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\sqrt{5} \leq u_n \leq \frac{5}{2}$ .

---

**2)** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Alors :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \varphi(u_n) - u_n \\ &= \frac{5 - u_n^2}{2u_n} \text{ par le B)5)} \\ &\leq 0 \text{ car } u_n \geq \sqrt{5} \end{aligned}$$

Donc  $u_{n+1} \leq u_n$  est la suite  $(u_n)$  est décroissante.

---

**3) a)** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On sait par le B)6) que pour tout  $x \in [\sqrt{5}, \frac{5}{2}]$ ,  $0 \leq \varphi'(x) \leq \frac{1}{10}$ .  $\varphi$  est dérivable, en particulier continue, sur cet intervalle, et on peut donc appliquer l'IAF avec  $u_n$  et  $\sqrt{5}$  qui sont dans le bon intervalle, donnant :

$$\begin{aligned} 0(u_n - \sqrt{5}) &\leq \varphi(u_n) - \varphi(\sqrt{5}) \leq \frac{1}{10}(u_n - \sqrt{5}) \\ \Leftrightarrow 0 &\leq u_{n+1} - \sqrt{5} \leq \frac{1}{10}(u_n - \sqrt{5}) \end{aligned}$$

Ce qu'il fallait démontrer.

**b)** On procède par récurrence.

Initialisation :  $0 \leq u_0 - \sqrt{5}$  car  $\frac{5}{2} \geq \sqrt{5}$ , et  $u_0 - \sqrt{5} \leq \frac{1}{2}$  car  $\sqrt{5} \geq 2$ .

Hérédité : Supposons pour  $n \in \mathbb{N}$  que  $0 \leq u_n - \sqrt{5} \leq \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^n$ . Alors  $u_{n+1} - \sqrt{5} \geq 0$  par le 1), et le 3)a) donne :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - \sqrt{5} &\leq \frac{1}{10}(u_n - \sqrt{5}) \\ &\leq \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^{n+1} \end{aligned}$$

Par récurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$0 \leq u_n - \sqrt{5} \leq \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^n$$

---

**4)** La suite  $(u_n)$  est bornée en bas par  $\sqrt{5}$  (1) et décroissante (2). Elle est donc convergente. Notons  $l = \lim u_n$  : on a donc  $l \geq \sqrt{5}$ . Par passage à la limite du membre droit du 3)b),  $l - \sqrt{5} \leq 0$ . Donc  $l = \sqrt{5}$  : la suite  $(u_n)$  tend vers  $\sqrt{5}$ .



(On aurait pu procéder uniquement avec le 3)b) par gendarmes.)

5) On voit par l'inégalité du 3)b) que  $u_6 - \sqrt{5} \leq 10^{-6}$ . Ainsi,  $k \leq 6$ . Le code python (non optimisé) suivant calcule la valeur de  $k$  :

```
from math import sqrt
def u(n):
    if n == 0:
        return 5/2
    else:
        return ( u(n-1) + 5/(u(n-1)) )/2

k = 0
while u(k) - sqrt(5) > 10**(-6):
    k += 1

print(k)
```

Trouvant  $k = 3$ . L'absence d'erreur de précision sur les flottant, trop récurrentes, a été vérifiée a posteriori sur calculatrice.

## Annexes

On peut généraliser la méthode utilisée dans cet exercice, qui est (il me semble) un prétexte pour utiliser l'IAF pour trouver une borne qui permet d'appliquer le théorème du point fixe de Banach.

Posons<sup>1</sup>  $a \in \mathbb{R}_*^+$ , pour lequel on veut trouver une suite  $(u_n)$  de rationnels qui approche  $\sqrt{a}$ . Posons  $\varphi_a$  une bonne fonction qui a pour point fixe  $\sqrt{a}$  : on reprend ici l'exemple du problème

$$\varphi_a(x) = \frac{1}{2} \left( x + \frac{a}{x} \right)$$

Que l'on définit uniquement sur  $\mathbb{R}_*^+$  par simplicité (on réduira encore l'intervalle après). On cherche, pour un certain  $0 \leq q < 1$  ( $q = \frac{1}{10}$  pour les besoins pratiques des décimales) à borner :

$$0 \leq \varphi'_a \leq q$$

Sur un intervalle adapté, contenant  $\sqrt{a}$ , de manière à obtenir par l'IAF pour une suite  $(u_n)$  contenue dans cet intervalle

$$|u_{n+1} - \sqrt{a}| \leq q |u_n - \sqrt{a}|$$

Où on aura défini  $u_{n+1} = \varphi(u_n)$ .

**a) Trouver le bon intervalle :** La dérivée de  $\varphi$  (dérivable sur son intervalle de définition par somme) est :  $\varphi'_a(x) = \frac{1}{2} - \frac{a}{2x^2}$ . Ainsi :

<sup>1</sup> $a \geq \frac{5}{4}$  pour la méthode présentée ici, la raison est présentée plus tard



- $\varphi'_a(x) \geq 0 \iff x^2 \geq a \iff x \geq \sqrt{a}$
- $\varphi'_a(x) \leq \frac{1}{10} \iff \frac{4}{5} \leq \frac{a}{x^2} \iff x \leq \frac{\sqrt{5a}}{2}$ .

On se place donc sur l'intervalle  $I = \left[ \sqrt{a}; \frac{\sqrt{5a}}{2} \right]$  (si besoin, on peut réduire la borne supérieure de l'intervalle à une valeur  $u_0$  plus simple à gérer (rationnelle par exemple), la suite convergera toujours correctement sous réserve que  $\varphi_a(u_0) \leq u_0$

L'IAF donne donc que pour tout  $x, y \in I$  :

$$|\varphi_a(y) - \varphi_a(x)| \leq \frac{1}{10}|y - x|$$

**b) Trouver la suite :** Posons la suite  $(u_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par :

$$\begin{cases} u_0 = \frac{\sqrt{5a}}{2} \text{ (en général } u_0 = \sup I \text{ si celui ci a la bonne propriété)} \\ u_{n+1} = \varphi_a(u_n) \end{cases}$$

Cette suite est bien définie :  $u_0 \in I$  et si  $u_n \in I$ , alors :

- Par croissance,  $u_{n+1} = \varphi_a(u_n) \geq \varphi_a(\sqrt{a}) = \sqrt{a}$
- Par croissance encore,  $u_{n+1} = \varphi_a(u_n) \leq \varphi_a(\sup I) \leq \sup I$

(Pour  $\sup I = \frac{\sqrt{5a}}{2}$ , cette dernière inégalité est ssi  $a \geq \frac{5}{4}$  : un désavantage d'avoir choisi  $q = \frac{1}{10}$ )

Donc  $u_{n+1} \in I$  et la suite est bien définie. Comme le montre le a),  $\varphi_a$  définit une contraction  $I \rightarrow I \subset \mathbb{R}$ , qui est complet pour  $|\cdot|$ . Le théorème du point fixe de Banach donne donc immédiatement l'existence d'un point fixe unique  $x^* = \sqrt{a}$  sur  $I$ , et assure que  $\lim u_n = x^*$ .

Enfin, si on arrive à prendre  $u_0 \in I$  rationnel qui satisfait la bonne propriété, on peut avoir que tout terme de la suite  $(u_n)$  est rationnel (en regardant  $\varphi_a$ ), ce qui est plutôt sympa.

Merci d'avoir lu :)