

# Devoir maison n°8 : Chemins sur un quadrillage

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier  
TE1

## Partie A - Retrouver des formules bien connues

**1)** Un chemin entre  $O$  et  $M(p, q)$  équivaut à une somme ordonnée de  $p$  vecteurs  $\vec{i}$  et de  $q$  vecteurs  $\vec{j}$ . Une telle somme est composée de  $p + q$  termes, et est déterminée uniquement par la position des  $p$  vecteurs  $\vec{i}$  parmi les  $p + q$  termes, en complétant tous les autres termes par des  $\vec{j}$ . Ainsi, comme l'ordre des  $\vec{i}$  n'importe pas, il y a  $\binom{p+q}{p}$  telles sommes.

On en déduit que le nombre de chemins entre  $O$  et  $M(p, q)$  est de  $\binom{p+q}{p} = \binom{p+q}{q}$  (par symétrie).

---

**2)** Un chemin de longueur  $n$  partant d'un point consiste en une somme ordonnée de  $n$  vecteurs parmi  $\{\vec{i}, \vec{j}\}$ , assimilable à une  $n$ -liste de cet ensemble à deux éléments. On en déduit qu'il y a  $2^n$  chemins de longueur  $n$  partant de tout point (et en particulier de l'origine).

---

**3) a)** Par translation de vecteur  $\overrightarrow{PO} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ , un chemin joignant  $P(0, 1)$  à  $B_k(n - k, k)$  équivaut à un chemin joignant l'origine et  $B'_k(n - k, k - 1)$ . Ceux ci sont donc au nombre de  $\binom{n-k+k-1}{k-1} = \binom{n-1}{k-1}$ .

Similairement, un chemin entre  $Q$  et  $B_k(n - k, k)$  équivaut à un chemin entre l'origine et  $B''_k(n - k - 1, k)$ . Ils sont donc au nombre de  $\binom{n-k-1+k}{k} = \binom{n-1}{k}$ .

**b)** On double compte les chemins de  $O$  à  $B_k$ . D'une part, ceux-ci sont au nombre de  $\binom{n}{k}$  par le 1). D'autre part, un tel chemin doit passer soit par  $Q(1, 0)$ , soit par  $P(0, 1)$  en fonction du premier vecteur du chemin. Ainsi, un chemin entre  $O$  et  $B_k$  est soit un chemin de  $Q$  à  $B_k$ , soit un chemin de  $P$  à  $B_k$ . On en déduit :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$