Devoir maison n°14 : Intégrales de Wallis

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier
TE1

Partie A - Intégrales de Wallis.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\mathrm{d}t.$$

1) Soit $n \in \mathbb{N}$.

On pose

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} - t \iff t = \frac{\pi}{2} - x \\ \mathrm{d}x = -\mathrm{d}t \iff \mathrm{d}t = -\mathrm{d}x \end{cases}$$

Par changement de variable, on obtient donc :

$$\begin{aligned} W_n &= \int_{\frac{\pi}{2}-0}^{\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}} \cos^n\left(\frac{\pi}{2} - x\right)(-\mathrm{d}x) \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} -\sin^n(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

---

2) **a)**

$$W_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(t))^0\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$$

$$W_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\mathrm{d}t = [\sin(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

b) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$W_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+2}(t)\mathrm{d}t$$

$$W_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\cos^{n+1}(t)\mathrm{d}t$$

$$W_{n+2} = \left[\sin(t)\cos^{n+1}(t)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} -(n+1)\sin^2(t)\cos^n(t)\mathrm{d}t$$

$$
\begin{aligned}
W_{n+2} &= (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\cos^2(t))\cos^n(t)\mathrm{d}t \\
W_{n+2} &= (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\mathrm{d}t - (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+2}(t)\mathrm{d}t \\
W_{n+2} &= (n+1)W_n - (n+1)W_{n+2} \\
(n+2)W_{n+2} &= (n+1)W_n \\
W_{n+2} &= \frac{n+1}{n+2}W_n.
\end{aligned}
$$

c) Montrons par récurrence que, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2} \text{ et } W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}.$$

- *Initialisation.*

Pour $p = 0$:

$$\text{d'une part, } \; W_{2\times 0} = W_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad \frac{(2\times 0)!}{2^{2\times 0}(0!)^2}\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2};$$

$$\text{d'autre part, } \; W_{2\times 0+1} = W_1 = 1 \quad \text{et} \quad \frac{2^{2\times 0}(0!)^2}{(2\times 0+1)!} = 1.$$

On a bien $W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2}$ et $W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$ pour $p = 0$.

- *Hérédité.*

Soit $p \in \mathbb{N}$. On suppose que $W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2}$ et $W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$.

Montrons que $W_{2p+2} = \frac{(2p+2)!}{2^{2p+2}((p+1)!)^2}\frac{\pi}{2}$ et $W_{2p+3} = \frac{2^{2p+2}((p+1)!)^2}{(2p+3)!}$.

D'après 2.b, d'une part,

$$
\begin{aligned}
W_{2p+2} &= \frac{2p+1}{2p+2}W_{2p} \\
&= \frac{2p+1}{2p+2}\frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2} \\
&= \frac{(2p+1)!}{2^{2p}(2p+2)(p!)^2}\frac{\pi}{2} \\
&= \frac{(2p+2)!}{2^{2p}(2p+2)^2(p!)^2}\frac{\pi}{2} \\
&= \frac{(2p+2)!}{2^{2p+2}(p+1)^2(p!)^2}\frac{\pi}{2} \\
&= \frac{(2p+2)!}{2^{2p+2}((p+1)!)^2}\frac{\pi}{2}.
\end{aligned}
$$

Et d'autre part,

$$\begin{aligned}
W_{2p+3} &= \frac{2p+2}{2p+3}W_{2p+1} \\
&= \frac{(2p+2)2^{2p}(p!)^2}{(2p+3)(2p+1)!} \\
&= \frac{2^{2p}(2p+2)^2(p!)^2}{(2p+3)(2p+2)(2p+1)!} \\
&= \frac{2^{2p+2}(p+1)^2(p!)^2}{(2p+3)!} \\
&= \frac{2^{2p+2}((p+1)!)^2}{(2p+3)!}.
\end{aligned}$$

On a donc montré par le principe de récurrence que pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2} \text{ et } W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}.$$

---

3) a) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}
W_{n+1} - W_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+1}(t)\mathrm{d}t - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\mathrm{d}t \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)(\cos(t)-1)\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

Or, pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $0 \leqslant \cos(t) \leqslant 1$ donc $\cos^n(t) \geqslant 0$ et $\cos(t) - 1 \leqslant 0$.

Ainsi, $\cos^n(t)(\cos(t)-1) \leqslant 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Par conséquent $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)(\cos(t)-1)\mathrm{d}t \leqslant 0$ i.e. $W_{n+1} - W_n \leqslant 0$.

La suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est donc décroissante.

De plus, pour tous $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $n \in \mathbb{N}$, on a $\cos^n(t) \geqslant 0$.

Donc $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\mathrm{d}t > 0$ i.e. $W_n > 0$. (Inégalité stricte puisque $\cos^n(t) > 0$ en au moins un point, par exemple $t = \frac{\pi}{4}$.)

La suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ étant décroissante et minorée, d'après le TLM, elle converge vers $l \in \mathbb{R}_+$.

b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Par décroissance de la suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$, on a :

$$\begin{aligned}
& W_{n+2} \leqslant W_{n+1} \leqslant W_n \\
\iff & \frac{n+1}{n+2}W_n \leqslant W_{n+1} \leqslant W_n \text{ d'après 2.b} \\
\iff & \frac{n+1}{n+2} \leqslant \frac{W_{n+1}}{W_n} \leqslant 1
\end{aligned}$$

$\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$ donc d'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} \frac{W_{n+1}}{W_n} = 1$.

c) On a pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}(n+1)W_{n+1}W_n &= (n+1)\frac{n}{n+1}W_{n-1}W_n \\ &= nW_{n-1}W_n\end{aligned}$$

La suite $(nW_{n-1}W_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est donc bien constante, de valeur $W_0W_1 = \frac{\pi}{2}$.

d) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{n}{n+1}W_{n-1} \leqslant W_n \leqslant W_{n-1} \quad \text{d'où} \quad \frac{n}{n+1}\frac{\pi}{2} \leqslant nW_n^2 \leqslant \frac{\pi}{2}$$

En utilisant le fait que les W_n sont positifs.

Par croissance de $x \mapsto \sqrt{x}$ et positivité des termes, on obtient :

$$\sqrt{\frac{n}{n+1}}\sqrt{\frac{\pi}{2}} \leqslant \sqrt{n}W_n \leqslant \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Par gendarmes, on obtient :

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n}W_n = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

En multipliant les équivalents, on a $W_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$. Comme $\sqrt{\frac{\pi}{2n}} \overset{n\to+\infty}{\to} 0$, idem pour (W_n).

Partie B - Produit et formule de Wallis, formule de Stirling

1) a) Démontrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\rho_n = \frac{2}{\pi}\prod_{k=1}^{n}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)}$$

<u>Initialisation :</u> $\rho_0 = \frac{1}{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi}$.

<u>Hérédité :</u> Supposons l'assertion pour $n \in \mathbb{N}$. On a alors :

$$\begin{aligned}\rho_{n+1} &= \frac{W_{2n+3}}{W_{2n+2}} = \frac{\frac{2n+2}{2n+3}W_{2n+1}}{\frac{2n+1}{2n+2}W_{2n}} \\ &\overset{\text{HR}}{=} \frac{2}{\pi}\prod_{k=1}^{n}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} \cdot \frac{(2(n+1))^2}{(2n+1)(2n+3)} \\ &= \frac{2}{\pi}\prod_{k=1}^{n+1}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)}\end{aligned}$$

b) Comme $W_n \underset{n\to+\infty}{\sim} W_{n+1}$, en particulier, $W_{2n} \underset{n\to+\infty}{\sim} W_{2n+1}$. Donc $(\rho_n) \to 1$ et on obtient :

$$\lim_{n\to+\infty}\prod_{k=1}^{n}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}$$

2) **a)** Avec les formules de la question A)2)c), on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\rho_n} = \frac{W_{2n}}{W_{2n+1}} &= \frac{\pi}{2}\frac{\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}}{\frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}} \\ &= \frac{\pi}{2}\frac{2n+1}{2^{4n}}\left(\frac{(2n)!}{(n!)^2}\right)^2 \\ &= \pi\frac{2n+1}{2^{4n+1}}\binom{2n}{n}^2\end{aligned}$$

b) Comme $(\rho_n) \to 1$, $\frac{1}{\sqrt{\pi\rho_n}} \overset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{\sqrt{\pi}}$. On trouve donc :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n+\frac{1}{2}}}{2^{2n}}\binom{2n}{n} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

Ce qui donne, comme $\sqrt{n+\frac{1}{2}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{n}$, la limite attendue.