

---

# Intégration d'une fonction continue sur un segment

## CORRIGÉ DES EXERCICES

---

Correction de l'exercice 11.

(i) On reconnaît une forme  $\frac{u'}{u}$ , ce qui permet d'écrire

$$\int_0^1 \frac{e^t}{1+e^t} dt = \left[ \ln(1+e^t) \right]_0^1 = \ln(1+e) - \ln(2) = \ln\left(\frac{1+e}{2}\right).$$

(ii) En écrivant l'intégrande sous forme exponentielle, on a

$$\int_0^1 5^x dx = \int_0^1 e^{x \ln(5)} dx = \left[ \frac{1}{\ln(5)} e^{x \ln(5)} \right]_0^1 = \frac{e^{\ln(5)} - e^0}{\ln(5)} = \frac{4}{\ln(5)}.$$

(iii) On utilise la relation de Chasles pour découper l'intégrale :

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 (1 - |x-1|)^2 dx &= \int_{-2}^1 (1 - (1-x))^2 dx + \int_1^2 (1 - (x-1))^2 dx \\ &= \int_{-2}^1 x^2 dx + \int_1^2 (2-x)^2 dx \\ &= \left[ \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^1 + \left[ -\frac{(2-x)^3}{3} \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{3} - \left( \frac{-8}{3} \right) - 0 - \left( -\frac{1}{3} \right) = \frac{10}{3}. \end{aligned}$$

(iv) On reconnaît dans l'expression  $\frac{1}{x \ln^2(x)} = \frac{1/x}{\ln^2(x)}$  une forme  $\frac{u'}{u^2}$ , d'où

$$\int_2^5 \frac{dx}{x \ln^2(x)} = \left[ -\frac{1}{\ln(x)} \right]_2^5 = -\frac{1}{\ln(5)} + \frac{1}{\ln(2)} = \frac{\ln(5) - \ln(2)}{\ln(2) \ln(5)}.$$

(v) On reconnaît dans l'expression  $\frac{1}{t(1+\ln^2(t))} = \frac{1/t}{1+\ln^2(t)}$  une forme  $\frac{u'}{1+u^2}$ , d'où

$$\int_1^e \frac{dt}{t(1+\ln^2(t))} = \left[ \arctan(\ln(t)) \right]_1^e = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}.$$

(vi) On reconnaît dans l'expression  $\frac{x}{(3+x^2)^2} = \frac{1}{2} \frac{2x}{(3+x^2)^2}$  une forme  $\frac{u'}{u^2}$  (au facteur  $\frac{1}{2}$  près), d'où

$$\int_0^1 \frac{x}{(3+x^2)^2} dx = \left[ -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3+x^2} \right]_0^1 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} - \left( -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{1}{24}.$$

(vii) On décompose l'intégrande en  $\frac{3x+1}{1+x^2} = 3\frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2} = \frac{3}{2}\frac{2x}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2}$  ; le terme  $\frac{2x}{1+x^2}$  étant de la forme  $\frac{u'(x)}{u(x)}$ , on peut écrire

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{3x+1}{1+x^2} dx &= \left[ \frac{3}{2} \ln(1+x^2) + \arctan(x) \right]_0^1 \\ &= \frac{3}{2} \ln(2) + \arctan(1) - \frac{3}{2} \ln(1) - \arctan(0) \\ &= \frac{3}{2} \ln(2) + \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

(viii) Les deux intégrales formant la somme proposée ne se calculent pas séparément (en effet, les primitives de la fonction  $x \mapsto e^{x^2}$  ne s'expriment pas à l'aide des fonctions usuelles) ; en revanche, elles sont bien définies puisque  $x \mapsto e^{x^2}$  et  $x \mapsto 2 - e^{x^2}$  sont continues sur  $[0, 1]$ , et on peut écrire par linéarité de l'intégrale que

$$\int_0^1 e^{x^2} dx + \int_0^1 (2 - e^{x^2}) dx = \int_0^1 (e^{x^2} + 2 - e^{x^2}) dx = \int_0^1 2 dx = 2.$$

**Correction de l'exercice 12.** Soit  $a \in \mathbb{R}$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a

$$\begin{aligned}|\phi(x) - \phi(a)| &= \left| \int_0^1 f(xt) dt - \int_0^1 f(at) dt \right| \\ &= \left| \int_0^1 (f(xt) - f(at)) dt \right| \quad \text{par linéarité de l'intégrale} \\ &\leq \int_0^1 |f(xt) - f(at)| dt \quad \text{par l'inégalité triangulaire} \\ &\leq \int_0^1 k |xt - at| dt \quad \text{car } f \text{ est lipschitzienne} \\ &= k|x - a| \int_0^1 t dt \quad \text{par linéarité de l'intégrale} \\ &= \frac{k}{2} |x - a|.\end{aligned}$$

Or lorsque  $x \rightarrow a$ , on a  $\frac{k}{2}|x - a| \rightarrow 0$ , d'où  $|\phi(x) - \phi(a)| \rightarrow 0$  par encadrement, soit  $\phi(x) \rightarrow \phi(a)$ . La fonction  $\phi$  est donc continue en  $a$  ; comme  $a$  est quelconque,  $\phi$  est bien continue sur  $\mathbb{R}$ .

**Correction de l'exercice 13.**

1. Si  $n \in \mathbb{N}$ , la fonction  $t \mapsto \frac{1}{1+t+t^n}$  est continue sur le segment  $[0, 1]$  comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas, donc l'intégrale définissant  $u_n$  existe.
2. On a

$$u_0 = \int_0^1 \frac{1}{2+t} dt = [\ln(2+t)]_0^1 = \ln(3) - \ln(2)$$

et

$$u_1 = \int_0^1 \frac{1}{1+2t} dt = \left[ \frac{1}{2} \ln(1+2t) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \ln(3).$$

3. (a) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Pour tout  $t \in [0, 1]$ , on a  $t^{n+1} \leq t^n$ , d'où

$$0 < 1 + t + t^{n+1} \leq 1 + t + t^n$$

et donc

$$\frac{1}{1 + t + t^n} \leq \frac{1}{1 + t + t^{n+1}}.$$

En intégrant cette inégalité sur  $[0, 1]$ , on obtient

$$\int_0^1 \frac{dt}{1 + t + t^n} \leq \int_0^1 \frac{dt}{1 + t + t^{n+1}}$$

d'où  $u_n \leq u_{n+1}$ . La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est donc croissante.

- (b) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Pour tout  $t \in [0, 1]$ , on a  $1 + t + t^n \geq 1 + t > 0$  donc  $\frac{1}{1+t+t^n} \leq \frac{1}{1+t}$ . En intégrant cette inégalité sur  $[0, 1]$ , on obtient

$$\int_0^1 \frac{dt}{1 + t + t^n} \leq \int_0^1 \frac{dt}{1 + t} = [\ln(1 + t)]_0^1 = \ln(2).$$

La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est donc majorée par  $\ln(2)$ , or elle est croissante d'après la question précédente, donc elle converge.

4. (a) Si  $n \in \mathbb{N}$ , alors

$$\begin{aligned} \ln(2) - u_n &= \int_0^1 \frac{dt}{1 + t} - \int_0^1 \frac{dt}{1 + t + t^n} \\ &= \int_0^1 \left( \frac{1}{1 + t} - \frac{1}{1 + t + t^n} \right) dt \quad \text{par linéarité de l'intégrale} \\ &= \int_0^1 \frac{t^n}{(1 + t)(1 + t + t^n)} dt, \end{aligned}$$

ce qu'il fallait démontrer.

- (b) Si  $n \in \mathbb{N}$ , on a pour tout  $t \in [0, 1]$  l'inégalité  $(1 + t)(1 + t + t^n) \geq 1$ , d'où

$$\begin{aligned} \ln(2) - u_n &= \int_0^1 \frac{t^n}{(1 + t)(1 + t + t^n)} dt \\ &\leq \int_0^1 t^n dt \quad \text{par croissance de l'intégrale} \\ &= \left[ \frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}, \end{aligned}$$

d'où le résultat attendu.

- (c) Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $0 \leq \ln(2) - u_n \leq \frac{1}{n+1}$  d'après les questions 3b et 4b. Lorsque  $n \rightarrow +\infty$ , on a  $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ , et le théorème des gendarmes donne alors  $\ln(2) - u_n \rightarrow 0$ . Ainsi, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ln(2).$$

**Correction de l'exercice 14.** En suivant l'indication, on écrit que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on a

$$\int_0^2 \frac{x^n}{1+x^{2n}} dx = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^{2n}} dx + \int_1^2 \frac{x^n}{1+x^{2n}} dx.$$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , en intégrant l'inégalité  $\frac{x^n}{1+x^{2n}} \leq x^n$  sur  $[0, 1]$ , on obtient

$$\int_0^1 \frac{x^n}{1+x^{2n}} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}.$$

Si  $n \geq 2$ , en intégrant l'inégalité  $\frac{x^n}{1+x^{2n}} \leq \frac{x^n}{x^{2n}} = \frac{1}{x^n}$  sur  $[1, 2]$  on obtient

$$\int_1^2 \frac{x^n}{1+x^{2n}} dx \leq \int_1^2 \frac{1}{x^n} dx = \left[ -\frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{x^{n-1}} \right]_1^2 = \frac{1}{n-1} \left( 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right).$$

Ainsi, pour tout  $n \geq 2$  on a

$$0 \leq \int_0^2 \frac{x^n}{1+x^{2n}} dx \leq \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n-1} \left( 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right).$$

Or  $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$  et  $\frac{1}{n-1} \left( 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) \rightarrow 0$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ , donc  $\int_0^2 \frac{x^n}{1+x^{2n}} dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  d'après le théorème des gendarmes.

**Correction de l'exercice 15.**

- (i) Aucune intégration par parties n'est nécessaire ici : on reconnaît une forme  $u'e^u$  (à un facteur près), ce qui donne

$$\int_0^1 x e^{x^2} dx = \left[ \frac{1}{2} e^{x^2} \right]_0^1 = \frac{e-1}{2}.$$

- (ii) On effectue une intégration par parties en dérivant la fonction  $x \mapsto x^2$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et en primitivant la fonction continue  $x \mapsto x e^{x^2}$  (puisque  $x^3 e^x = x^2 \cdot x e^{x^2}$ ), ce qui donne

$$\int_0^1 x^3 e^{x^2} dx = \left[ x^2 \cdot \frac{1}{2} e^{x^2} \right]_0^1 - \int_0^1 2x \cdot \frac{1}{2} e^{x^2} dx = \frac{e}{2} - \int_0^1 x e^{x^2} dx$$

soit, en utilisant le résultat de la question précédente :

$$\int_0^1 x^3 e^{x^2} dx = \frac{e}{2} - \frac{e-1}{2} = \frac{1}{2}.$$

- (iii) On peut écrire  $t^2 = (t-1)(1+t) + 1$ , ce qui permet décomposer l'intégrande sous la forme

$$\frac{t^2}{1+t} = \frac{(t-1)(1+t)}{1+t} + \frac{1}{1+t} = t-1 + \frac{1}{1+t}.$$

On en déduit

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{t^2}{1+t} dt &= \int_0^1 \left( t-1 + \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= \left[ \frac{t^2}{2} - t + \ln(1+t) \right]_0^1 = \frac{1}{2} - 1 + \ln(2) = \ln(2) - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

- (iv) On réalise une intégration par parties en dérivant la fonction  $\ln^3$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et en primitivant la fonction constante (et donc continue)  $x \mapsto 1$ , ce qui donne

$$\int_1^2 \ln^3(x) \, dx = \left[ x \ln^3(x) \right]_1^2 - \int_1^2 x \cdot 3 \ln^2(x) \cdot \frac{1}{x} \, dx = 2 \ln^3(2) - 3 \int_1^2 \ln^2(x) \, dx.$$

On calcule ensuite l'intégrale de  $\ln^2$  par une nouvelle intégration par parties, en dérivant la fonction  $\ln^2$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et en primitivant la fonction constante (et donc continue  $x \mapsto 1$ ), ce qui donne

$$\int_1^2 \ln^2(x) \, dx = \left[ x \ln^2(x) \right]_1^2 - \int_1^2 x \cdot 2 \ln(x) \cdot \frac{1}{x} \, dx = 2 \ln^2(2) - 2 \int_1^2 \ln(x) \, dx.$$

L'intégrale de  $\ln$  se calcule enfin en utilisant une primitive de  $\ln$  déterminée dans le cours (elle-même obtenue par intégration par parties!) :

$$\int_1^2 \ln(x) \, dx = [x \ln(x) - x]_1^2 = 2 \ln(2) - 2 - (0 - 1) = 2 \ln(2) - 1.$$

Ainsi, on a

$$\int_1^2 \ln^2(x) \, dx = 2 \ln^2(2) - 2(2 \ln(2) - 1) = 2 \ln^2(2) - 4 \ln(2) + 2$$

et enfin

$$\int_1^2 \ln^3(x) \, dx = 2 \ln^3(2) - 3(2 \ln^2(2) - 4 \ln(2) + 2) = 2 \ln^3(2) - 6 \ln^2(2) + 12 \ln(2) - 6.$$

- (v) En écrivant  $\ln(t^4) = 4 \ln(t)$  (ce qui est licite lorsque  $t > 0$ ) et en utilisant une primitive de  $\ln$  déterminée dans le cours, on peut directement écrire

$$\begin{aligned} \int_1^2 \ln(t^4) \, dt &= 4 \int_1^2 \ln(t) \, dt = 4 \left[ t \ln(t) - t \right]_1^2 \\ &= 4(2 \ln(2) - 2 - (0 - 1)) = 8 \ln(2) - 4. \end{aligned}$$

- (vi) On réalise trois intégrations par parties successives, en dérivant trois fois la fonction  $t \mapsto t^2$  de classe  $\mathcal{C}^3$  et en primitivant trois fois la fonction continue  $\cos$ , ce qui donne

$$\int_0^\pi t^2 \cos(t) \, dt = \left[ t^2 \sin(t) \right]_0^\pi - \left[ -2t \cos(t) \right]_0^\pi + \left[ -2 \sin(t) \right]_0^\pi - \int_0^\pi 0 \, dt = -2\pi.$$

- (vii) On réalise quatre intégrations par parties successives, en dérivant quatre fois la fonction  $t \mapsto (2t - 4)^3$  de classe  $\mathcal{C}^4$  et en primitivant quatre fois la fonction continue  $t \mapsto (t - 3)^5$ , ce qui donne

$$\begin{aligned} \int_2^4 (t - 3)^5 (2t - 4)^3 \, dt &= \left[ (2t - 4)^3 \cdot \frac{1}{6} (t - 3)^6 \right]_2^4 - \left[ 6(2t - 4)^2 \cdot \frac{1}{6 \cdot 7} (t - 3)^7 \right]_2^4 \\ &\quad + \left[ 6 \cdot 4(2t - 4) \cdot \frac{1}{6 \cdot 7 \cdot 8} (t - 3)^8 \right]_2^4 - \left[ 6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \frac{1}{6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9} (t - 3)^9 \right]_2^4 + \int_2^4 0 \, dt \\ &= \frac{32}{3} - \frac{16}{7} + \frac{2}{7} - \frac{1}{63} + \frac{1}{63} = \frac{544}{63}. \end{aligned}$$

- (viii) On réalise une intégration par parties en dérivant la fonction  $\ln$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et en primitivant la fonction continue  $u \mapsto \sqrt{u}$ , ce qui donne

$$\begin{aligned}\int_1^2 \sqrt{u} \ln(u) \, du &= \left[ \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \ln(u) \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{u} \, du = \frac{4\sqrt{2}}{3} \ln(2) - \left[ \frac{4}{9} u^{\frac{3}{2}} \right]_1^2 \\ &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \ln(2) - \left( \frac{8\sqrt{2}}{9} - \frac{4}{9} \right) = \frac{4 - 8\sqrt{2} + 12\sqrt{2} \ln(2)}{9}.\end{aligned}$$

- (ix) On réalise une intégration par parties en dérivant la fonction  $\arctan$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et en primitivant la fonction continue  $x \mapsto x$ . On obtient alors<sup>1</sup>

$$\int_0^1 x \arctan(x) \, dx = \left[ \frac{1}{2} (x^2 + 1) \arctan(x) \right]_0^1 - \int_0^1 \underbrace{\frac{1}{2} (x^2 + 1)}_{=\frac{1}{2}} \frac{1}{1+x^2} \, dx$$

soit

$$\int_0^1 x \arctan(x) \, dx = \frac{1}{2} (2 \arctan(1) - \arctan(0)) - 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} = \frac{\pi - 2}{4}.$$

### Correction de l'exercice 16.

1. (a) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Pour tout  $x \in [0, 1]$ , on a  $\sin(\pi x) \in [0, 1]$ , d'où l'encadrement  $0 \leq x^n \sin(\pi x) \leq x^n$  puisque  $x^n \geq 0$ . En intégrant cette inégalité sur  $[0, 1]$ , on obtient

$$0 \leq I_n \leq \int_0^1 x^n \, dx = \frac{1}{n+1},$$

ce qui est le résultat à démontrer.

- (b) On sait que  $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ . D'après le théorème des gendarmes et l'encadrement démontré dans la question précédente, on a donc  $I_n \rightarrow 0$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ .

2. On a tout d'abord

$$I_0 = \int_0^1 \sin(\pi x) \, dx = \left[ \frac{-\cos(\pi x)}{\pi} \right]_0^1 = \frac{2}{\pi}.$$

Pour calculer  $I_1$ , on effectue une intégration par parties : on dérive la fonction  $x \mapsto x$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et on primitive la fonction continue  $x \mapsto \sin(\pi x)$ , ce qui donne

$$\begin{aligned}I_1 &= \int_0^1 x \sin(\pi x) \, dx = \left[ \frac{-\cos(\pi x)}{\pi} x \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{\cos(\pi x)}{\pi} \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} + \left[ \frac{\sin(\pi x)}{\pi^2} \right]_0^1 = \frac{1}{\pi}.\end{aligned}$$

---

1. On notera le choix astucieux de la primitive  $x \mapsto \frac{1}{2}(x^2 + 1)$  plutôt que de  $x \mapsto \frac{x^2}{2}$ , qui n'aurait pas permis la même simplification avec la dérivée de  $\arctan$ .

3. Soit  $n \geq 2$ . On réalise deux intégrations par parties successives, en dérivant deux fois la fonction  $x \mapsto x^n$  de classe  $\mathcal{C}^2$  et en primitivant la fonction continue  $x \mapsto \sin(\pi x)$ , ce qui donne

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 x^n \sin(\pi x) dx \\ &= \left[ \frac{-\cos(\pi x)}{\pi} x^n \right]_0^1 + \left[ \frac{n \sin(\pi x)}{\pi} x^{n-1} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{n \sin(\pi x)}{\pi} (n-1) x^{n-2} dx \\ &= \frac{1}{\pi} + \frac{n(n-1)}{\pi^2} I_{n-2}. \end{aligned}$$

4. Démontrons la formule par récurrence. Elle est valable pour  $p = 1$ , puisque d'une part

$$I_2 = \frac{1}{\pi} - \frac{2}{\pi^2} I_0 = \frac{1}{\pi} - \frac{4}{\pi^3}$$

et d'autre part

$$(-1)^1 \frac{2!}{\pi^{2+1}} + (-1)^0 \frac{2!}{\pi^1(2!)} + (-1)^1 \frac{2!}{\pi^{2+1}} = \frac{1}{\pi} - \frac{4}{\pi^3}.$$

Supposons à présent que la formule soit vérifiée pour un certain entier  $p \geq 1$ . Alors, en vertu de la relation trouvée dans la question précédente :

$$I_{2(p+1)} = I_{2p+2} = \frac{1}{\pi} - \frac{(2p+2)(2p+1)}{\pi^2} I_{2p}$$

soit, d'après l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} I_{2(p+1)} &= \frac{1}{\pi} - \frac{(2p+2)(2p+1)}{\pi^2} \left( (-1)^p \frac{(2p)!}{\pi^{2p+1}} + \sum_{k=0}^p (-1)^k \frac{(2p)!}{\pi^{2k+1}(2p-2k)!} \right) \\ &= \frac{1}{\pi} + (-1)^{p+1} \frac{(2p+2)!}{\pi^{2p+3}} + \sum_{k=0}^p (-1)^{k+1} \frac{(2p+2)!}{\pi^{2k+3}(2p-2k)!} \\ &= \frac{1}{\pi} + (-1)^{p+1} \frac{(2(p+1))!}{\pi^{2(p+1)+1}} + \sum_{k=0}^p (-1)^{k+1} \frac{(2(p+1))!}{\pi^{2(k+1)+1}(2(p+1)-2(k+1))!}. \end{aligned}$$

En effectuant le changement d'indice  $j = k + 1$ , on obtient alors

$$\begin{aligned} I_{2(p+1)} &= \frac{1}{\pi} + (-1)^{p+1} \frac{(2(p+1))!}{\pi^{2(p+1)+1}} + \sum_{j=1}^{p+1} (-1)^j \frac{(2(p+1))!}{\pi^{2j+1}(2(p+1)-2j)!} \\ &= (-1)^{p+1} \frac{(2(p+1))!}{\pi^{2(p+1)+1}} + \sum_{j=0}^{p+1} (-1)^j \frac{(2(p+1))!}{\pi^{2j+1}(2(p+1)-2j)!}, \end{aligned}$$

d'où la formule au rang  $p + 1$ . Ainsi, la formule est vraie à tout rang  $p \geq 1$  d'après le principe de récurrence.

**Correction de l'exercice 17.**

1. Soient  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ . Pour tout  $x \neq 0$ , on a

$$\frac{\alpha}{2x} + \frac{\beta + \gamma x}{x^2 + 1} = \frac{\alpha(x^2 + 1) + 2x(\beta + \gamma x)}{2x(x^2 + 1)} = \frac{(\alpha + 2\gamma)x^2 + 2\beta x + \alpha}{2x(x^2 + 1)},$$

donc la condition considérée est satisfaite dès lors que l'on a

$$(\alpha + 2\gamma)x^2 + \beta x + \alpha = 1$$

pour tout  $x \neq 0$ . Il est donc suffisant que l'on ait  $\alpha + 2\gamma = 0$ ,  $\beta = 0$  et  $\alpha = 1$ , ce qui implique que  $\gamma = -\frac{1}{2}$ . On vérifie bien que l'on peut écrire :

$$\forall x \neq 0, \quad \frac{1}{2x(x^2 + 1)} = \frac{1}{2x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{x^2 + 1}.$$

2. En dérivant la fonction  $\ln$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et en primitivant la fonction continue  $x \mapsto \frac{2x}{(x^2+1)^2}$ , on obtient par intégration par parties et en utilisant la question précédente

$$\begin{aligned} I &= \left[ -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + 1} \cdot \ln(x) \right]_1^2 + \int_1^2 \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + 1} \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= -\frac{1}{10} \ln(2) + \int_1^2 \frac{dx}{2x(x^2 + 1)} \\ &= -\frac{1}{10} \ln(2) + \int_1^2 \left( \frac{1}{2x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{x^2 + 1} \right) dx \\ &= -\frac{1}{10} \ln(2) + \left[ \frac{1}{2} \ln(x) - \frac{1}{4} \ln(x^2 + 1) \right]_1^2 \\ &= -\frac{1}{10} \ln(2) + \frac{1}{2} \ln(2) - \frac{1}{4} \ln(5) + \frac{1}{4} \ln(2) \\ &= \frac{13}{20} \ln(2) - \frac{1}{4} \ln(5). \end{aligned}$$

**Correction de l'exercice 18.** D'après le théorème fondamental de l'analyse, une primitive de  $f$  est la fonction  $F : x \mapsto \int_0^x \cos(t)e^t dt$ . Or pour tout  $x \in \mathbb{R}$  on peut reformuler l'intégrale qui définit  $F(x)$  grâce à une double intégration par parties, en dérivant deux fois la fonction  $\cos$  de classe  $\mathcal{C}^2$  et en primitivant deux fois la fonction continue  $\exp$  :

$$F(x) = \int_0^x \cos(t)e^t dt = [\cos(t)e^t]_0^x + [\sin(t)e^t]_0^x - \int_0^x \cos(t)e^t dt,$$

d'où  $F(x) = \cos(x)e^x - 1 + \sin(x)e^x - F(x)$ , soit  $2F(x) = \cos(x)e^x - 1 + \sin(x)e^x$ . Ainsi, la fonction  $F : x \mapsto \frac{1}{2}((\cos(x) + \sin(x))e^x - 1)$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .



**Correction de l'exercice 19.** Pour tout  $n \geq 1$ , une intégration par parties (en dérivant la fonction  $f$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et en primitivant la fonction continue  $t \mapsto \cos(nt)$ ) permet d'écrire


$$\begin{aligned} \int_0^\pi \cos(nt)f(t) dt &= \left[ \frac{1}{n} \sin(nt)f(t) \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{1}{n} \sin(nt)f'(t) dt \\ &= -\frac{1}{n} \int_0^\pi \sin(nt)f'(t) dt. \end{aligned}$$

Or  $f'$  est continue sur le segment  $[0, \pi]$ , donc elle y est bornée par un réel  $M \geq 0$  d'après le théorème des bornes atteintes. Ainsi, on a

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\pi \cos(nt)f(t) dt \right| &= \frac{1}{n} \left| \int_0^\pi \sin(nt)f'(t) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \int_0^\pi |\sin(nt)| \cdot |f'(t)| dt \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire} \\ &= \frac{1}{n} \int_0^\pi 1 \cdot M dt \\ &= \frac{1}{n} \pi M \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \end{aligned}$$

d'où  $\int_0^\pi \cos(nt)f(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  d'après le théorème des gendarmes.

**Correction de l'exercice 20.** La figure ci-dessous illustre la propriété démontrée : graphiquement, elle résulte du fait que les surfaces mesurées par l'intégrale de  $f$  sur n'importe quelle période sont semblables à une recomposition près.



On élabore une démonstration s'appuyant sur cette intuition graphique. Soit  $a \in \mathbb{R}$  ; en utilisant la relation de Chasles, on peut écrire

$$\int_a^{a+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt - \int_0^a f(t) dt + \int_T^{a+T} f(t) dt,$$

mais le changement de variable  $u = t - T$  et la  $T$ -périodicité de  $f$  donnent

$$\int_T^{a+T} f(t) dt = \int_0^a f(u + T) du = \int_0^a f(u) du,$$

d'où

$$\int_a^{a+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt - \int_0^a f(t) dt + \int_0^a f(u) du = \int_0^T f(t) dt,$$

ce qu'il fallait démontrer.

**Correction de l'exercice 21.**

1. Soit  $x \in \mathbb{R}^*$ . En utilisant le changement de variable affine  $u = xt$ , qui donne  $du = x dt$  et donc  $dt = \frac{1}{x} du$ , on peut écrire

$$\varphi(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du.$$

Or d'après le théorème fondamental de l'analyse, la fonction  $\Phi : x \mapsto \int_0^x f(u) du$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  et  $\mathbb{R}_-^*$  puisque  $f$  est continue, donc c'est aussi le cas de la fonction  $\varphi : x \mapsto \frac{1}{x}\Phi(x)$  comme produit de fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$ .

2. Toujours d'après le théorème fondamental de l'analyse, la fonction  $\Phi$  admet  $f(0)$  pour nombre dérivé en 0, c'est-à-dire que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x) - \Phi(0)}{x - 0} = f(0), \quad \text{soit} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x)}{x} = f(0).$$

Or cette relation se réécrit  $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = f(0)$ ; mais  $\varphi(0) = \int_0^1 f(0) dt = f(0)$ , donc  $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = \varphi(0)$ , c'est-à-dire que  $\varphi$  est continue en 0.

3. Dans le cas où  $f$  est la fonction valeur absolue, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = \int_0^1 |xt| dt = |x| \int_0^1 t dt = \frac{|x|}{2}.$$

Dans ce cas, la fonction  $\varphi$  n'est pas dérivable en 0, donc *a fortiori* pas de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Correction de l'exercice 22.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , le changement de variable affine  $u = xt$ , qui donne  $du = x dt$ , permet d'écrire

$$\varphi(x) = \int_{-x^2}^{x^2 \cos(x)} e^u \sqrt{1+u^2} du.$$

La fonction  $f : u \mapsto e^u \sqrt{1+u^2}$  est continue sur  $\mathbb{R}$  comme combinaison de fonctions continue; en considérant une primitive  $F$  de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ , on a donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = F(x^2 \cos(x)) - F(-x^2).$$

Ainsi,  $\varphi$  apparaît comme une combinaison de fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  : elle est donc elle-même de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Correction de l'exercice 23.** D'après le théorème fondamental de l'intégration, la fonction continue  $x \mapsto \sin(\sqrt{x})$  admet la fonction  $\Phi : x \mapsto \int_0^x \sin(\sqrt{t}) dt$  pour primitive sur  $\mathbb{R}_+$ . Fixons  $x \geq 0$  et calculons explicitement  $\Phi(x)$  : on réalise pour cela le changement de variable  $t = u^2$  associé à la fonction  $u \mapsto u^2$  de classe  $\mathcal{C}^1$ , qui donne

$$\begin{cases} t = 0 & \text{si } u = 0 \\ t = x & \text{si } u = \sqrt{x} \end{cases} \quad \text{et} \quad \frac{dt}{du} = 2u \quad \text{donc} \quad dt = 2u du$$

et donc

$$\Phi(x) = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(u) 2u \, du.$$

On réalise à présent une intégration par parties en primitivant la fonction continue  $\sin$  et en dérivant la fonction  $u \mapsto u$  de classe  $\mathcal{C}^1$ , pour obtenir

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= 2 \left[ -\cos(u)u \right]_0^{\sqrt{x}} + 2 \int_0^{\sqrt{x}} \cos(u) \, du \\ &= -2\sqrt{x} \cos(\sqrt{x}) + 2 [\sin(u)]_0^{\sqrt{x}} = -2\sqrt{x} \cos(\sqrt{x}) + 2 \sin(\sqrt{x}). \end{aligned}$$

Ainsi, une primitive de  $x \mapsto \sin(\sqrt{x})$  sur  $\mathbb{R}_+$  est donnée par

$$\Phi : x \mapsto -2\sqrt{x} \cos(\sqrt{x}) + 2 \sin(\sqrt{x}).$$

Notons que la dérivabilité à droite en 0 de cette fonction n'aurait pas été évidente si elle n'avait pas été donnée par le théorème fondamental de l'analyse, puisque la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. On aurait toutefois pu la retrouver à l'aide de développements limités à l'ordre 1 des fonctions  $\cos$  et  $\sin$  en 0 ; l'exercice est laissé au lecteur.

#### Correction de l'exercice 24.

- (i) On réalise le changement de variable  $t = \sqrt{e^x - 1}$ , licite puisque la fonction  $x \mapsto \sqrt{e^x - 1}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[\ln(2), 1]$  ; on obtient

$$\begin{cases} t = 1 & \text{si } x = \ln(2) \\ t = \sqrt{e^x - 1} & \text{si } x = 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \frac{dt}{dx} = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}}$$

ainsi que  $2 + e^x = 3 + (e^x - 1) = 3 + t^2$ , donc

$$\begin{aligned} \int_{\ln(2)}^1 \frac{e^x}{(2 + e^x)\sqrt{e^x - 1}} \, dx &= \int_1^{\sqrt{e-1}} \frac{2 \, dt}{3 + t^2} \\ &= \left[ \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left( \frac{t}{\sqrt{3}} \right) \right]_1^{\sqrt{e-1}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left( \arctan \left( \frac{\sqrt{e-1}}{\sqrt{3}} \right) - \arctan \left( \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left( \arctan \left( \frac{\sqrt{e-1}}{\sqrt{3}} \right) - \frac{\pi}{6} \right). \end{aligned}$$

- (ii) On réalise le changement de variable  $t = \sin(x)$ , licite puisque  $\sin$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  : on obtient

$$\begin{cases} t = 0 & \text{si } x = 0 \\ t = \frac{1}{\sqrt{2}} & \text{si } x = \frac{\pi}{4} \end{cases} \quad \text{et} \quad \frac{dt}{dx} = \cos(x) \quad \text{donc} \quad dt = \cos(x) \, dx,$$

d'où, en remarquant <sup>2</sup> que  $\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x) = 1 - t^2$  :

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos(x)}{1 + \cos^2(x)} dx &= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{dt}{2 - t^2} = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left( \frac{\frac{1}{2\sqrt{2}}}{\sqrt{2} + t} + \frac{\frac{1}{2\sqrt{2}}}{\sqrt{2} - t} \right) dt \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[ \ln(\sqrt{2} + t) - \ln(\sqrt{2} - t) \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left( \ln\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right) - \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right) = \frac{\ln(3)}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

(iii) On réalise le changement de variable  $t = \sqrt{e^x + 1}$ , qui est licite puisque  $x \mapsto \sqrt{e^x + 1}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  : on obtient

$$\begin{cases} t = \sqrt{2} & \text{si } x = 0 \\ t = \sqrt{1 + e} & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

et

$$x = \ln(t^2 - 1) \quad \text{donc} \quad \frac{dx}{dt} = \frac{2t}{t^2 - 1} \quad \text{et} \quad dx = \frac{2t}{t^2 - 1} dt,$$

d'où

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{e^x + 1} dx &= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} t \cdot \frac{2t}{t^2 - 1} dt = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \frac{2t^2}{t^2 - 1} dt \\ &= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \left( \frac{2(t^2 - 1)}{t^2 - 1} + \frac{2}{t^2 - 1} \right) dt = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \left( 2 + \frac{2}{t^2 - 1} \right) dt \\ &= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \left( 2 + \frac{1}{t - 1} - \frac{1}{t + 1} \right) dt \\ &= \left[ 2t + \ln(t - 1) - \ln(t + 1) \right]_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \\ &= 2(\sqrt{1 + e} - \sqrt{2}) + \ln\left(\frac{\sqrt{1 + e} - 1}{\sqrt{1 + e} + 1}\right) + \ln\left(\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}\right). \end{aligned}$$

(iv) On réalise le changement de variable  $u = \sin(x)$ , qui est licite car  $\sin$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ . On obtient

$$\begin{cases} u = 0 & \text{si } x = 0 \\ u = \frac{1}{2} & \text{si } x = \frac{\pi}{6} \end{cases} \quad \text{et} \quad \frac{du}{dx} = \cos(x) \quad \text{donc} \quad du = \cos(x) dx,$$

d'où

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{dx}{\cos(x)(1 - \sin(x))} &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos(x) dx}{\cos^2(x)(1 - \sin(x))} \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{du}{(1 - u^2)(1 - u)} \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{du}{(1 - u)(1 + u)(1 - u)} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{du}{(1 - u)^2(1 + u)}. \end{aligned}$$

---

2. La décomposition de  $\frac{1}{2-t^2}$  est ensuite obtenue par la méthode classique reposant sur l'identification des coefficients du numérateur, comme dans la question 1 de l'exercice 17.

On cherche à présent des coefficients  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  vérifiant la décomposition  $\frac{1}{(1-u)^2(1+u)} = \frac{\alpha}{1-u} + \frac{\beta}{1+u} + \frac{\gamma}{(1-u)^2}$  pour tout  $u \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$  : on doit pour cela avoir

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-u)^2(1+u)} &= \frac{\alpha(1+u)(1-u) + \beta(1-u)^2 + \gamma(1+u)}{(1-u)^2(1+u)} \\ &= \frac{(\beta - \alpha)u^2 + (\gamma - 2\beta)u + \alpha + \beta + \gamma}{(1-u)^2(1+u)} \end{aligned}$$

pour tout  $u \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ , ce qui est le cas lorsque

$$\begin{cases} \beta - \alpha &= 0 \\ \gamma - 2\beta &= 0 \\ \alpha + \beta + \gamma &= 1 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} \alpha &= \beta \\ \gamma &= 2\beta \\ 4\beta &= 1 \end{cases} \quad \text{soit encore} \quad \alpha = \beta = \frac{1}{4} \text{ et } \gamma = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, on peut écrire

$$\forall u \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, \quad \frac{1}{(1-u)^2(1+u)} = \frac{1}{4(1-u)} + \frac{1}{4(1+u)} + \frac{1}{2(1-u)^2},$$

d'où

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{dx}{\cos(x)(1-\sin(x))} &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{du}{(1-u)^2(1+u)} \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{4(1-u)} + \frac{1}{4(1+u)} + \frac{1}{2(1-u)^2} \right) du \\ &= \left[ -\frac{1}{4} \ln(1-u) + \frac{1}{4} \ln(1+u) + \frac{1}{2(1-u)} \right]_0^{\frac{1}{2}} \\ &= -\frac{1}{4} \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{4} \ln\left(\frac{3}{2}\right) + 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \ln(3) + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

### Correction de l'exercice 25.

1. Pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ , on a par linéarité de l'intégrale

$$P(\lambda) = \int_a^b (f^2 + 2\lambda fg + \lambda^2 g^2) = \int_a^b f^2 + 2\lambda \int_a^b fg + \lambda^2 \int_a^b g^2 = A\lambda^2 + B\lambda + C$$

avec  $A := \int_a^b g^2$ ,  $B := 2 \int_a^b fg$  et  $C := \int_a^b f^2$ . La fonction  $P$  est donc bien une fonction polynomiale de degré au plus 2.

2. En tant qu'intégrale d'une fonction positive sur un segment dont les bornes sont « dans le bon sens »,  $P(\lambda)$  est positif quel que soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Si  $A = 0$ , c'est-à-dire si  $\int_a^b g^2 = 0$ , la fonction continue et positive  $g^2$  est nulle sur  $[a, b]$ , c'est-à-dire que  $g$  l'est ; l'inégalité de Cauchy-Schwarz est alors vraie puisqu'elle stipule que  $0 \leq 0$ , et elle donne même une égalité.

Supposons à présent que  $A > 0$  : la fonction  $P$  est alors polynomiale de degré 2. Le fait que  $P$  ne change pas de signe sur  $\mathbb{R}$  se traduit en disant que

son discriminant est négatif ou nul (en effet, s'il était strictement positif,  $P$  admettrait deux racines réelles, donc changerait strictement de signe sur  $\mathbb{R}$ ) : ainsi, on a  $B^2 - 4AC \leq 0$ , soit

$$\left(2 \int_a^b fg\right)^2 - 4 \left(\int_a^b g^2\right) \left(\int_a^b f^2\right) \leq 0, \text{ d'où } 4 \left(\int_a^b fg\right)^2 \leq 4 \left(\int_a^b g^2\right) \left(\int_a^b f^2\right).$$

En divisant les deux termes de cette dernière inégalité par 4 et en passant à la racine carrée, on obtient bien l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

3. On a vu que l'inégalité de Cauchy-Schwarz était une égalité dans le cas où  $g$  est nulle sur  $[a, b]$ . Supposons désormais que ce ne soit pas le cas : d'après la réponse à la question précédente, l'inégalité est alors une égalité si et seulement si le discriminant de  $P$  est nul. Cette condition équivaut à l'existence d'une racine réelle de  $P$ , c'est-à-dire à l'existence de  $\lambda \in \mathbb{R}$  tel que l'on ait  $\int_a^b (f + \lambda g)^2 = 0$ . Or  $(f + \lambda g)^2$  est continue et positive quel que soit  $\lambda$ , donc on a  $\int_a^b (f + \lambda g)^2 = 0$  si et seulement si  $(f + \lambda g)^2$  est nulle sur  $[a, b]$ , c'est-à-dire si  $f + \lambda g$  l'est.

Ainsi, on a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz si et seulement si  $g$  est nulle sur  $[a, b]$  ou s'il existe  $\lambda \in \mathbb{R}$  tel que  $f = -\lambda g$  : en d'autres termes, l'égalité est réalisée si et seulement si les fonctions  $f$  et  $g$  sont proportionnelles (sur  $[a, b]$ ).

### Correction de l'exercice 26.

- On a  $W_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \frac{\pi}{2}$  et  $W_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) dt = [-\cos(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$ .
- Soit  $n \geq 2$ . On écrit

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) \sin^{n-1}(t) dt$$

puis on réalise une intégration par parties en dérivant la fonction  $\sin^{n-1}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et en primitivant la fonction continue  $\sin$  pour obtenir

$$\begin{aligned} W_n &= \left[-\cos(t) \sin^{n-1}(t)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) \cos(t) \sin^{n-2}(t) dt \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2(t)) \sin^{n-2}(t) dt \quad \text{par l'égalité fondamentale de la trigonométrie} \\ &= (n-1) \left( \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2}(t) dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) dt \right) \quad \text{par linéarité de l'intégrale} \\ &= (n-1) (W_{n-2} - W_n). \end{aligned}$$

Ainsi, on a  $nW_n = (n-1)W_{n-2}$ , soit  $W_n = \frac{n-1}{n}W_{n-2}$ .

- La propriété à démontrer peut s'établir par récurrence grâce au résultat de la

question précédente, ou plus informellement en écrivant que si  $k \in \mathbb{N}$  alors

$$\begin{aligned} W_{2k} &= \frac{2k-1}{2k} W_{2k-2} = \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2k-3}{2k-2} W_{2k-4} \\ &= \dots = \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2k-3}{2k-2} \dots \frac{1}{2} W_0 \\ &= \left( \prod_{i=1}^k \frac{2i-1}{2i} \right) \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

et

$$\prod_{i=1}^k \frac{2i-1}{2i} = \frac{\prod_{j=1}^{2k} j}{\left( \prod_{i=1}^k 2i \right)^2} = \frac{(2k)!}{\left( 2^k \prod_{i=1}^k i \right)^2} = \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2},$$

et de même pour le calcul de  $W_{2k+1}$ .

4. (a) Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on peut écrire par linéarité de l'intégrale que

$$W_{n+1} - W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^{n+1}(t) - \sin^n(t)) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(t) - 1) \sin^n(t) dt$$

d'où, comme  $\sin \leq 1$  et comme  $\sin^n(t) \geq 0$  pour tout  $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , l'inégalité  $W_{n+1} - W_n \leq 0$ . Ainsi,  $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bien décroissante.

- (b) La suite  $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est strictement positive en tant que suite d'intégrales de fonctions continues positives non nulles. Comme elle est décroissante, on peut écrire pour tout  $n \in \mathbb{N}$  l'encadrement

$$\frac{W_{n+2}}{W_n} \leq \frac{W_{n+1}}{W_n} \leq 1, \quad \text{soit} \quad \frac{n+1}{n+2} \leq \frac{W_{n+1}}{W_n} \leq 1$$

d'après le résultat de la question 2. Or  $\frac{n+1}{n+2} \rightarrow 1$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ , donc  $\frac{W_{n+1}}{W_n} \rightarrow 1$  par le théorème des gendarmes : ainsi, on a bien  $W_{n+1} \sim W_n$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ .

- (c) Si  $n \in \mathbb{N}$  est pair, on écrit  $n = 2k$  avec  $k \in \mathbb{N}$ , et on a alors

$$\begin{aligned} W_n W_{n+1} &= W_{2k} W_{2k+1} = \frac{\pi}{2} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \cdot \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!} \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{(2k)!}{(2k+1)!} = \frac{\pi}{2(2k+1)} = \frac{\pi}{2(n+1)} \end{aligned}$$

d'après la question 3.

Si  $n \in \mathbb{N}$  est impair, on écrit  $n = 2k+1$  avec  $k \in \mathbb{N}$ , et on a alors, toujours d'après la question 3 :

$$\begin{aligned} W_n W_{n+1} &= W_{2k+1} W_{2k+2} = \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!} \cdot \frac{\pi}{2} \frac{(2k+2)!}{(2^{k+1}(k+1)!)^2} \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2k+2}{(2(k+1))^2} = \frac{\pi}{2(2k+2)} = \frac{\pi}{2(n+1)}. \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on a  $W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)}$ . Or en utilisant la question précédente, on trouve

$$W_n W_{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} W_n^2 \quad \text{donc} \quad W_n^2 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi}{2(n+1)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi}{2n}.$$

En composant cet équivalent par la fonction racine carrée (ce qui est toujours licite!), on a donc  $W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ , ce qu'il fallait démontrer.

**Correction de l'exercice 27.** La fonction  $f$  étant continue sur  $[a, b]$ , elle y admet un minimum  $m$  et un maximum  $M$  d'après le théorème des bornes atteintes. D'après l'inégalité de la moyenne, le réel  $y := \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$  est donc un élément de  $[m, M]$ ; or l'image  $f([a, b])$  est égale à  $[m, M]$  d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc il existe  $c \in [a, b]$  tel que  $f(c) = y$ , d'où le résultat à démontrer. On peut proposer une démonstration alternative à l'aide du théorème des accroissements finis : d'après le théorème fondamental de l'analyse, comme  $f$  est continue sur  $[a, b]$ , la fonction

$$F : z \mapsto \int_a^z f(x) dx$$

est dérivable sur  $[a, b]$  (au sens de la dérivabilité à droite en  $a$  et de la dérivabilité à gauche en  $b$ ), de dérivée  $f$ . Elle est donc continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ ; en lui appliquant le théorème des accroissements finis, on obtient l'existence d'un  $c \in ]a, b[$  tel que  $F(b) - F(a) = F'(c)(b-a)$ , soit  $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$ . On obtient le résultat en divisant cette égalité par la quantité  $b-a \neq 0$ .

**Correction de l'exercice 28.**

1. Soit  $k \in \mathbb{N}$ . Comme  $f$  est décroissante, pour tout  $t \in [k, k+1]$  on a l'encadrement  $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$ . En intégrant cette double inégalité sur  $[k, k+1]$ , on obtient

$$\int_k^{k+1} f(k+1) dt \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq \int_k^{k+1} f(k) dt,$$

soit

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k).$$

2. En sommant la double inégalité démontrée dans la question précédente pour  $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ , on a

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(k+1) \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} f(t) dt \leq \sum_{k=0}^{n-1} f(k).$$


En réécrivant la somme de gauche grâce à un changement d'indice et la quantité centrale grâce à la relation de Chasles, on obtient

$$\sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_0^n f(t) dt \leq \sum_{k=0}^{n-1} f(k),$$

ce qu'il fallait démontrer.



3. L'inégalité établie exprime le fait que l'intégrale de  $f$  sur  $[0, n]$  peut être encadrée par l'aire totale de rectangles situés sous la courbe de  $f$  et celle de rectangles recouvrant cette courbe définis, comme sur la figure suivante :



### Correction de l'exercice 29.

1. La fonction  $f$  étant croissante, un raisonnement similaire à celui développé dans l'exercice 28 (encadrement de  $f$  sur les intervalles  $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$ , intégration de l'inégalité obtenue sur  $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$  puis sommation des inégalités résultantes pour  $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ ) permet d'écrire l'encadrement suivant :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right),$$

que l'on peut réécrire à l'aide de la relation  $\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) + f(1) - f(0)$  sous la forme

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_0^1 f(x) dx + \frac{f(1) - f(0)}{n}.$$

On obtient alors la limite attendue grâce au théorème des gendarmes.

2. Supposons  $f$  décroissante. En appliquant le résultat précédent à la fonction croissante  $g := -f$ , on obtient

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = -\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 f(x) dx,$$

donc le résultat reste valable pour  $f$ .

3. (a) En écrivant  $v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$  pour tout  $n \geq 1$ , on peut appliquer le résultat de la question précédente à la fonction  $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$  (continue et décroissante sur  $[0, 1]$ ) pour obtenir

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan(x)]_0^1 = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}.$$

- (b) En écrivant  $s_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{\sqrt{4 - \left(\frac{k}{n}\right)^2}}$  pour tout  $n \geq 1$ , en appliquant le résultat de la question précédente à la fonction  $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$  (continue sur  $[0, 1]$  et croissante sur cet intervalle comme produit des fonctions positives et croissantes  $x \mapsto x$  et  $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ ) et en reconnaissant une forme  $\frac{u'}{\sqrt{u}} = u' u^{-\frac{1}{2}}$ , on obtient

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx = [-\sqrt{4-x^2}]_0^1 = 2 - \sqrt{3}.$$

- (c) En écrivant  $\ln(w_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2\right)$  pour tout  $n \geq 1$ , on peut appliquer le résultat de la question précédente à la fonction  $x \mapsto \ln(1+x^2)$  (continue et croissante sur  $[0, 1]$ ) pour obtenir

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \ln(1+x^2) dx.$$

On calcule cette intégrale par intégration par parties, en dérivant la fonction  $x \mapsto \ln(1+x^2)$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et en primitivant la fonction continue  $x \mapsto 1$ , ce qui donne

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(1+x^2) dx &= [x \ln(1+x^2)]_0^1 - \int_0^1 \frac{2x^2}{1+x^2} dx \\ &= \ln(2) - \int_0^1 \left(2 - \frac{2}{1+x^2}\right) dx \\ &= \ln(2) - [2x - 2 \arctan(x)]_0^1 \\ &= \ln(2) - 2 + 2 \arctan\left(\frac{\pi}{4}\right) = \ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Ainsi, on a  $w_n = \exp(\ln(w_n)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp\left(\ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}\right) = 2e^{-2+\frac{\pi}{2}}$  par continuité de la fonction exponentielle.

### Correction de l'exercice 30.

1. La fonction  $g$  étant continue sur  $[a, b]$ , elle y admet un minimum et un maximum d'après le théorème des bornes atteintes ; on note respectivement  $m$  et  $M$  ces bornes. Comme  $f$  est positive, on a  $mf(t) \leq f(t)g(t) \leq Mf(t)$  pour tout  $t \in [a, b]$ . En intégrant cet encadrement sur  $[a, b]$ , on obtient

$$m \int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b f(t)g(t) dt \leq M \int_a^b f(t) dt. \quad (1)$$

Si  $\int_a^b f(t) dt = 0$ , comme  $f$  est continue et positive sur  $[a, b]$ , elle nulle sur cet intervalle ; l'égalité recherchée est alors vraie quel que soit  $c \in [a, b]$  puisque toutes les intégrales considérées sont nulles.

Supposons à présent que l'on ait  $\int_a^b f(t) dt > 0$ . L'encadrement (1) donne alors

$$m \leq \frac{\int_a^b f(t)g(t) dt}{\int_a^b f(t) dt} \leq M, \quad \text{soit} \quad y := \frac{\int_a^b f(t)g(t) dt}{\int_a^b f(t) dt} \in [m, M].$$

Or  $g([a, b]) = [m, M]$  d'après le théorème des valeurs intermédiaires puisque  $g$  est continue ; ainsi, il existe  $c \in [a, b]$  tel que  $g(c) = y$ , ce qui donne l'égalité attendue.

2. Supposons  $g$  positive et décroissante ; pour tout  $t \in [a, b]$ , on a alors l'encadrement  $0 \leq g(t) \leq g(a)$ , et donc  $g(t)f(t) \leq g(a)f(t)$ . En intégrant cette inégalité sur  $[a, b]$ , on obtient

$$0 \leq \int_a^b f(t)g(t) dt \leq g(a) \int_a^b f(t) dt.$$

Le réel  $z := \int_a^b f(t)g(t) dt$  est donc un élément de l'intervalle  $[0, g(a) \int_a^b f]$ . Considérons à présent la fonction  $\psi : x \mapsto g(a) \int_a^x f$  ; d'après le théorème fondamental de l'analyse,  $\psi$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a, b]$  et vérifie  $\psi' = f \geq 0$ . Elle prend par ailleurs la valeur 0 en  $a$  et la valeur  $g(a) \int_a^b f$  en  $b$ . D'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle visite donc sur  $[a, b]$  toutes les valeurs de l'intervalle  $[0, g(a) \int_a^b f]$ . C'est le cas notamment pour la valeur  $z$ . En d'autres termes :

$$\exists d \in [a, b] : \underbrace{g(a) \int_a^d f(t) dt}_{\psi(d)} = \underbrace{\int_a^d f(t)g(t) dt}_z,$$

ce qu'il fallait démontrer.

### Correction de l'exercice 31.

1. Soient  $x, y \in \mathbb{R}$ . On réalise une intégration par parties en dérivant la fonction  $t \mapsto y - t$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et en primitivant la fonction continue  $h''$  pour obtenir

$$\int_x^y (y-t)h''(t)dt = [(y-t)h'(t)]_x^y - \int_x^y (-h'(t))dt = -(y-x)h'(x) + h(y) - h(x),$$

ce qui, après réarrangement des termes, donne l'égalité à démontrer.

2. Par hypothèse, on a  $h''(x) > 0$ . La fonction  $h''$  étant continue, il existe  $\alpha > 0$  tel que pour tout  $t \in [x - \alpha, x + \alpha]$  on ait  $h''(t) > \frac{h''(x)}{2}$ . Pour tout  $y \in ]x, x + \alpha]$ , on a alors, en utilisant la croissance de l'intégrale et le fait que  $y - t \geq 0$  pour tout  $t \in [x, y]$  :

$$\int_x^y (y-t)h''(t)dt \geq \int_x^y (y-t)\frac{h''(x)}{2}dt = \frac{h''(x)}{2} \left[ -\frac{(y-t)^2}{2} \right]_x^y = \frac{h''(x)}{4}(y-x)^2 > 0.$$

Pour tout  $y \in [x - \alpha, x[$ , on a de même

$$\begin{aligned} \int_x^y (y-t)h''(t)dt &= \int_y^x (t-y)h''(t)dt \geq \int_y^x (t-y)\frac{h''(x)}{2}dt \\ &= \frac{h''(x)}{2} \left[ \frac{(t-y)^2}{2} \right]_y^x = \frac{h''(x)}{4}(x-y)^2 > 0, \end{aligned}$$

toujours par croissance de l'intégrale (après avoir remis les bornes de l'intégrale dans l'ordre croissant !) et car  $t - y \geq 0$  pour tout  $t \in [y, x]$ . Ainsi, on a bien :

$$\forall y \in [x - \alpha, x + \alpha] : y \neq x, \quad \int_x^y (y-t)h''(t)dt > 0.$$

3. On démontre l'équivalence attendue par double implication.

Si  $h$  est une fonction affine, il existe  $\gamma, \delta \in \mathbb{R}$  tels que  $h(y) = \gamma y + \delta$  pour tout  $y \in \mathbb{R}$ . Dans ce cas, si  $x \in \mathbb{R}$  et  $a > 0$ , on a

$$\begin{aligned} \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} h(y)dy &= \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} (\gamma y + \delta) dy = \frac{1}{2a} \left[ \gamma \frac{y^2}{2} + \delta y \right]_{x-a}^{x+a} \\ &= \frac{1}{2a} \left( \gamma \frac{(x+a)^2}{2} + \delta(x+a) - \gamma \frac{(x-a)^2}{2} - \delta(x-a) \right) \\ &= \frac{1}{2a} (2a\gamma x + 2a\delta) = \gamma x + \delta = h(x). \end{aligned}$$

Réciproquement, supposons que  $h$  vérifie la propriété suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \forall a > 0, \quad h(x) = \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} h(y) dy.$$

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . D'après la question 1 et par linéarité de l'intégrale, on peut écrire que pour tout  $a > 0$  on a

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} \left( h(x) + (y-x)h'(x) + \int_x^y (y-t)h''(t)dt \right) dy \\ &= \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} h(x)dy + \frac{1}{2a} h'(x) \int_{x-a}^{x+a} (y-x)dy + \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} \left( \int_x^y (y-t)h''(t)dt \right) dy \\ &= \frac{1}{2a} \cdot 2ah(x) + \frac{1}{2a} h'(x) \cdot 0 + \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} \left( \int_x^y (y-t)h''(t)dt \right) dy, \end{aligned}$$

d'où, après élimination des termes  $h(x)$  des deux côtés de l'équation :

$$\frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} \left( \int_x^y (y-t)h''(t)dt \right) dy = 0. \quad (2)$$

Supposons à présent que  $h''(x) > 0$ . Il existe d'après la question précédente une valeur de  $\alpha > 0$  telle que la quantité  $p(y) := \int_x^y (y-t)h''(t)dt$  soit strictement positive pour tout  $y \in [x-\alpha, x+\alpha]$ . Or  $p : y \mapsto p(y)$  définit une fonction continue d'après le théorème fondamental de l'analyse, donc l'intégrale de  $p$  sur  $[x-\alpha, x+\alpha]$  est strictement positive, ce qui contredit la relation (2) censée être valable pour tout  $a > 0$  (et donc pour  $a = \alpha$ ).

Si  $h''(x) < 0$ , on montre comme dans la question 2 que pour un certain  $\alpha > 0$  on a  $p(y) < 0$  pour tout  $y \in [x-\alpha, x+\alpha]$ , d'où l'on déduit par le même argument que ci-dessus que l'intégrale de  $p$  sur  $[x-\alpha, x+\alpha]$  est strictement négative, ce qui contredit à nouveau (2).

Ainsi, on a  $h''(x) = 0$ . Comme nous avons considéré  $x$  quelconque dans  $\mathbb{R}$ , on a  $h'' = 0$  : comme  $\mathbb{R}$  est un intervalle on en déduit que la fonction  $h'$  est constante, puis que  $h$  est une fonction affine, ce qui clôt la preuve.

### Correction de l'exercice 32.

1. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Pour tout  $\theta \in [-\pi, \pi]$ , on a les inégalités  $|\cos(n\theta)| \leq 1$  et  $5 + 4\cos(\theta) \geq 5 - 4 = 1$  donc  $\frac{|\cos(n\theta)|}{|5-4\cos(\theta)|} \leq \frac{1}{1} = 1$ . Ainsi, on peut écrire

$$\begin{aligned} |I_n| &\leq \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{\cos(n\theta)}{5 + 4\cos(\theta)} \right| d\theta \quad \text{par l'inégalité triangulaire} \\ &\leq \int_{-\pi}^{\pi} 1 d\theta \quad \text{par croissance de l'intégrale} \\ &= 2\pi, \end{aligned}$$

d'où la majoration attendue.

2. Par linéarité de l'intégrale, on a

$$\begin{aligned} I_1 + \frac{5}{4}I_0 &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(\theta)}{5 + 4\cos(\theta)} d\theta + \frac{5}{4} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{5 + 4\cos(\theta)} d\theta \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(\theta) + \frac{5}{4}}{5 + 4\cos(\theta)} d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{4} d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

3. Fixons  $n \in \mathbb{N}$ . Pour tout  $\theta \in [-\pi, \pi]$ , on a

$$\begin{aligned} \cos(n\theta) + \cos((n+2)\theta) &= \cos(n\theta) + \cos(n\theta)\cos(2\theta) - \sin(n\theta)\sin(2\theta) \\ &= \cos(n\theta) + \cos(n\theta)(2\cos^2(\theta) - 1) - \sin(n\theta)2\sin(\theta)\cos(\theta) \\ &= 2\cos(\theta)(\cos(n\theta)\cos(\theta) - \sin(n\theta)\sin(\theta)) \\ &= 2\cos(\theta)\cos((n+1)\theta). \end{aligned}$$

Par linéarité de l'intégrale, on a donc

$$\begin{aligned} I_n + I_{n+2} &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(n\theta)}{5 + 4\cos(\theta)} d\theta + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos((n+2)\theta)}{5 + 4\cos(\theta)} d\theta \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(n\theta) + \cos((n+2)\theta)}{5 + 4\cos(\theta)} d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{2\cos(\theta)\cos((n+1)\theta)}{5 + 4\cos(\theta)} d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\pi}^{\pi} \left( \frac{\left(\frac{1}{2}(5 + 4 \cos(\theta)) - \frac{5}{2}\right) \cos((n+1)\theta)}{5 + 4 \cos(\theta)} \right) d\theta \\
&= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos((n+1)\theta) d\theta - \frac{5}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos((n+1)\theta)}{5 + 4 \cos(\theta)} d\theta \\
&= \frac{1}{2} \left[ \frac{\sin((n+1)\theta)}{n+1} \right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{5}{2} I_{n+1} = -\frac{5}{2} I_{n+1},
\end{aligned}$$

ce qu'il fallait démontrer.

4. La suite  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  satisfait la relation de récurrence linéaire double  $I_{n+2} = -\frac{5}{2}I_{n+1} - I_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  d'après la question précédente. L'équation caractéristique associée  $x^2 = -\frac{5}{2}x - 1$  admettant  $-2$  et  $-\frac{1}{2}$  pour solutions, il existe  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tels que l'on ait :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad I_n = \alpha \left(-\frac{1}{2}\right)^n + \beta(-2)^n.$$

Comme  $\left|-\frac{1}{2}\right| < 1$ , on a  $\left(-\frac{1}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ , donc si  $\beta \neq 0$ , on peut écrire que  $|I_n| \sim |\beta| \cdot 2^n \rightarrow +\infty$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ . Or cela est impossible d'après la question 1, donc  $\beta = 0$ . La relation  $I_1 + \frac{5}{4}I_0 = \frac{\pi}{2}$  déterminée dans la question 2 donne

$$-\frac{1}{2}\alpha + \frac{5}{4}\alpha = \frac{\pi}{2} \quad \text{soit} \quad \frac{3}{4}\alpha = \frac{\pi}{2} \quad \text{donc} \quad \alpha = \frac{2\pi}{3}.$$

Ainsi, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad I_n = \frac{2\pi}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n.$$

### Correction de l'exercice 33.

1. Pour tout  $x > 0$ , la fonction  $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t}$  est continue sur  $[x, 3x]$ , donc  $f(x)$  est bien défini. Ainsi,  $f$  est bien définie sur  $]0, +\infty[$ .
2. En notant  $F$  une primitive de la fonction continue  $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t}$  sur l'intervalle  $]0, +\infty[$ , on a :

$$\forall x \in ]0, +\infty[, \quad f(x) = F(3x) - F(x).$$

Ainsi,  $f$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  en tant que combinaison de fonctions dérivables, et on a :

$$\begin{aligned}
\forall x \in ]0, +\infty[, \quad f'(x) &= 3F'(3x) - F'(x) = 3f(3x) - f(x) \\
&= 3 \frac{e^{-3x}}{3x} - \frac{e^{-x}}{x} = \frac{e^{-3x} - e^{-x}}{x}.
\end{aligned}$$

3. Soit  $x > 0$ . Pour tout  $t \in [x, 3x]$ , on peut écrire  $\frac{e^{-3x}}{t} \leq \frac{e^{-t}}{t} \leq \frac{e^{-x}}{t}$  puisque la fonction  $t \mapsto e^{-t}$  est décroissante sur  $[x, 3x]$ . En intégrant cette inégalité sur  $[x, 3x]$ , on obtient

$$\int_x^{3x} \frac{e^{-3x}}{t} dt \leq f(x) \leq \int_x^{3x} \frac{e^{-x}}{t} dt, \quad \text{soit} \quad e^{-3x} \int_x^{3x} \frac{dt}{t} \leq f(x) \leq e^{-x} \int_x^{3x} \frac{dt}{t}.$$

Or  $\int_x^{3x} \frac{dt}{t} = [\ln(t)]_x^{3x} = \ln(3x) - \ln(x) = \ln(3)$ , donc on a

$$e^{-3x} \ln(3) \leq f(x) \leq e^{-x} \ln(3).$$

Cet encadrement étant valable pour tout  $x > 0$ , on en déduit que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \ln(3)$  d'après le théorème des gendarmes, si bien que  $f$  est prolongeable par continuité en 0, en une fonction

$$\begin{aligned} \tilde{f}: \mathbb{R}_+ &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x > 0 \\ \ln(3) & \text{si } x = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Pour étudier la dérivabilité de ce prolongement en 0, on écrit que pour tout  $x > 0$ , la fonction  $\tilde{f}$  est continue sur  $[0, x]$  et dérivable sur  $]0, x[$ , donc il existe d'après le théorème des accroissements finis un  $c_x \in ]0, x[$  tel que

$$\frac{\tilde{f}(x) - \tilde{f}(0)}{x - 0} = \tilde{f}'(c_x) = f'(c_x) = \frac{e^{-3c_x} - e^{-c_x}}{c_x}.$$

Lorsque  $x \rightarrow 0^+$ , on a  $c_x \rightarrow 0^+$  puisque  $c_x$  est un élément de  $]0, x[$  quel que soit  $x$ ; on peut alors écrire, grâce au développement limité d'ordre 1 de la fonction exponentielle en 0, que lorsque  $x \rightarrow 0$  on a <sup>3</sup>

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{f}(x) - \tilde{f}(0)}{x - 0} &= \frac{e^{-3c_x} - e^{-c_x}}{c_x} = \frac{1 - 3c_x + o(c_x) - (1 - c_x + o(c_x))}{c_x} \\ &= \frac{-2c_x + o(c_x)}{c_x} = -2 + o(1) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -2. \end{aligned}$$

Ainsi, le taux d'accroissement de  $\tilde{f}$  en 0 admet une limite finie égale à  $-2$ : la fonction  $\tilde{f}$  est donc dérivable à droite en 0 et vérifie  $\tilde{f}'(0) = -2$ .

4. Si  $x > 0$ , on peut réaliser une intégration par parties en dérivant la fonction  $t \mapsto \frac{1}{t}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et en primitivant la fonction continue  $t \mapsto e^{-t}$  pour obtenir

$$f(x) = \left[ \frac{1}{t} \cdot (-e^{-t}) \right]_x^{3x} - \int_x^{3x} \frac{e^{-t}}{t^2} dt = \frac{e^{-x}}{x} - \frac{e^{-3x}}{x} - \int_x^{3x} \frac{e^{-t}}{t^2} dt.$$

Or la croissance de l'intégrale permet d'écrire

$$0 \leq \int_x^{3x} \frac{e^{-t}}{t^2} dt \leq \int_x^{3x} \frac{e^{-t}}{x^2} dx = \frac{1}{x^2} [-e^{-t}]_x^{3x} = \frac{1}{x^2} (e^{-x} - e^{-3x})$$

pour tout  $x > 0$ , mais lorsque  $x \rightarrow +\infty$  on a

$$\frac{1}{x^2} (e^{-x} - e^{-3x}) \sim \frac{e^{-x}}{x^2} = o\left(\frac{e^{-x}}{x}\right)$$

---

3. La stratégie consistant à évaluer la limite d'un taux d'accroissement difficile à étudier à l'aide du théorème des accroissements finis a déjà été utilisée dans la démonstration du théorème de la limite de la dérivée (exercice 71 du chapitre sur la dérivation).

donc

$$f(x) = \frac{e^{-x}}{x} - \frac{e^{-3x}}{x} - \int_x^{3x} \frac{e^{-t}}{t^2} dt = \frac{e^{-x}}{x} - o\left(\frac{e^{-x}}{x}\right) - o\left(\frac{e^{-x}}{x}\right) \sim \frac{e^{-x}}{x},$$

ce qu'il fallait démontrer.

### Correction de l'exercice 34.

1. La fonction  $g$  est dérivable sur  $[0, 1]$  en tant que produit de fonctions dérivables, et pour tout  $x \in [0, 1]$  on a  $g'(x) = f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} = e^{-x}(f'(x) - f(x))$ , et donc  $f'(x) - f(x) = e^x g'(x)$ .
2. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On cherche des coefficients  $a, b, c \in \mathbb{R}$  tels que la fonction polynomiale  $g_n : x \mapsto ax^2 + bx + c$  vérifie

$$g_n(0) = 0, \quad g_n(1) = e^{-1} \quad \text{et} \quad g_n\left(\frac{1}{2}\right) = ne^{-1}.$$

Ces trois conditions se réécrivent

$$\begin{cases} c &= 0 \\ a + b + c &= e^{-1} \\ \frac{a}{4} + \frac{b}{2} + c &= ne^{-1} \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} c &= 0 \\ a + b &= e^{-1} \\ a + 2b &= 4ne^{-1} \end{cases}$$

soit encore, grâce à l'opération  $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$  :

$$\begin{cases} c &= 0 \\ a + b &= e^{-1} \\ b &= (4n - 1)e^{-1}, \end{cases} \quad \text{et donc} \quad \begin{cases} a &= (2 - 4n)e^{-1} \\ b &= (4n - 1)e^{-1} \\ c &= 0. \end{cases}$$

La fonction polynomiale  $g_n$  recherchée est ainsi

$$g_n : x \mapsto (2 - 4n)e^{-1}x^2 + (4n - 1)e^{-1}x.$$

3. Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , la fonction  $g_n$  est associée à la fonction  $f_n$  (au sens donné dans l'énoncé), donc

$$\int_0^1 |f_n - f'_n| = \int_0^1 |f'_n(x) - f_n(x)| dx = \int_0^1 |e^x g'_n(x)| dx$$

d'après la question <sup>4</sup> 1, d'où

$$\int_0^1 |f_n - f'_n| = \int_0^1 e^x |g'_n(x)| dx.$$

En minorant <sup>5</sup> la quantité  $e^x$  par 1 pour tout  $x \in [0, 1]$ , on peut écrire par croissance de l'intégrale :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \int_0^1 |f_n - f'_n| \geq \int_0^1 |g'_n(x)| dx.$$

---

4. Notons qu'il n'était pas nécessaire de voir que  $g_n$  était associé à  $f_n$  et qu'un calcul direct aurait suffi à retrouver le résultat démontré ici.

5. On pourrait aussi calculer l'intégrale de  $|f_n - f'_n|$  explicitement, en la découpant en deux grâce à la relation de Chasles pour faire disparaître la valeur absolue, puis en réalisant une intégration par parties.



Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , l'étude du signe de la quantité

$$g'_n(x) = ((4 - 8n)x + 4n - 1)e^{-1}$$

montre que celle-ci est positive si  $x \leq \frac{4n-1}{8n-4}$  et négative si  $x \geq \frac{4n-1}{8n-4}$ , si bien que

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f_n - f'_n| &\geq \int_0^{\frac{4n-1}{8n-4}} g'_n(x) dx + \int_{\frac{4n-1}{8n-4}}^1 (-g'_n(x)) dx \\ &\geq \int_{\frac{4n-1}{8n-4}}^1 (-g'_n(x)) dx \\ &\geq \int_{\frac{1}{2}}^1 (-g'_n(x)) dx, \end{aligned}$$

où la dernière inégalité provient du fait que  $-g'_n(x) \geq 0$  sur l'intervalle d'intégration et du fait que  $\frac{4n-1}{8n-4} \leq \frac{1}{2}$  (donc restreindre l'intervalle d'intégration diminue la valeur de l'intégrale). On trouve alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \int_0^1 |f_n - f'_n| \geq [-g_n(x)]_{\frac{1}{2}}^1 = g_n\left(\frac{1}{2}\right) - g_n(1) = (n-1)e^{-1},$$

d'où  $\int_0^1 |f_n - f'_n| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$  par comparaison.

Or pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $f_n \in E$  puisque  $f_n$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, 1]$  comme produit de fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  et puisque  $f_n(0) = g_n(0)e^0 = 0$  et  $f_n(1) = e^1 g_n(1) = 1$ . On en déduit que l'ensemble  $I$ , qui contient notamment tous les réels  $\int_0^1 |f_n - f'_n|$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , n'est pas majoré.

4. Soit  $f \in E$  et soit  $g$  la fonction associée. On a

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f - f'| &= \int_0^1 e^x |g'(x)| dx \quad \text{comme dans la question précédente} \\ &\geq \int_0^1 |g'(x)| dx \quad \text{par croissance de l'intégrale} \\ &\geq \left| \int_0^1 g'(x) dx \right| \quad \text{par l'inégalité triangulaire} \\ &= \left| [g(x)]_0^1 \right| = |g(1) - g(0)| = |f(1)e^{-1} - f(0)e^0| = e^{-1}, \end{aligned}$$

donc  $I$  est bien minoré par  $e^{-1}$ .

5. Soit  $t \in ]0, 1[$ . La fonction  $f_t$  est clairement de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, t[$  et sur  $]t, 1]$  comme combinaison de fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$ . Il reste à montrer qu'elle est dérivable en  $t$  et que sa dérivée y est continue.

Pour tout  $x \in [0, t]$ , le nombre dérivé en  $x$  de la fonction  $f_t$  est donné par

$$\begin{aligned} f'_t(x) &= \frac{-xe^{x-1} + (2t-x)e^{x-1} + (2t-x)xe^{x-1}}{t^2} \\ &= \frac{(-x + 2t - x + 2tx - x^2)e^{x-1}}{t^2}. \end{aligned}$$

Cette formule s'applique aussi à la dérivée à gauche de  $f_t$  en  $t$  :

$$(f'_t)_g(t) = \frac{(-t + 2t - t + 2t^2 - t^2)e^{t-1}}{t^2} = e^{t-1}. \quad (3)$$

Par ailleurs, l'égalité  $f_t(x) = e^{x-1}$  valable pour  $x \in ]t, 1]$  est aussi valable pour  $x = t$  car  $f_t(t) = e^{t-1}$ , si bien que  $f_t$  coïncide sur  $[t, 1]$  avec la fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  donnée par  $x \mapsto e^{x-1}$ . Elle admet donc une dérivée sur  $[t, 1]$  donnée par :

$$\forall x \in ]t, 1], \quad f'_t(x) = e^{x-1}$$

ainsi qu'une dérivée à droite en  $t$  donnée par

$$(f'_t)_d(t) = e^{t-1}. \quad (4)$$

Les relations (3) et (4) indiquent que  $f_t$  est dérivable en  $t$  et que  $f'_t(t) = e^{t-1}$ .

Comme on sait déjà que  $f'_t$  est continue sur  $[0, t[$  et continue à gauche en  $t$  (puisque  $f_t$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, t]$ ) et qu'elle est continue à droite en  $t$  et continue sur  $]t, 1]$  (puisque  $f_t$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[t, 1]$ ), on en déduit que  $f'_t$  est continue sur  $[0, 1]$ , donc  $f_t$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, 1]$ .

Il est par ailleurs clair que  $f_t(0) = 0$  et  $f_t(1) = 1$ , donc on a bien  $f_t \in E$ .

6. Soit  $t \in ]0, 1[$ . On a d'après la relation de Chasles

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f_t - f'_t| &= \int_0^t \left| \frac{(2t - x)xe^{x-1}}{t^2} - \frac{(-x + 2t - x + 2tx - x^2)e^{x-1}}{t^2} \right| dx + \int_t^1 |e^{x-1} - e^{x-1}| dx \\ &= \frac{1}{t^2} \int_0^t |(2t - x)x - (-x + 2t - x + 2tx - x^2)| e^{x-1} dx \\ &= \frac{1}{t^2} \int_0^t |2t - 2x| e^{x-1} dx \\ &= \frac{1}{t^2} \int_0^t 2(t - x) e^{x-1} dx. \end{aligned}$$

On réalise le calcul de cette dernière intégrale grâce à une intégration par parties, en dérivant la fonction  $x \mapsto 2(t - x)$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et en primitivant la fonction continue  $x \mapsto e^{x-1}$  :

$$\begin{aligned} \int_0^t 2(t - x)e^{x-1} dx &= \left[ 2(t - x)e^{x-1} \right]_0^t + \int_0^t 2e^{x-1} dx \\ &= -2te^{-1} + \left[ 2e^{x-1} \right]_0^t = 2e^{-1} (e^t - 1 - t). \end{aligned}$$

On trouve finalement

$$\int_0^1 |f_t - f'_t| = 2e^{-1} \frac{e^t - 1 - t}{t^2}.$$

La limite de cette quantité lorsque  $t \rightarrow 0^+$  est obtenue en réalisant un développement limité de  $\exp$  à l'ordre 2 en 0 :

$$\begin{aligned} 2e^{-1} \frac{e^t - 1 - t}{t^2} &= 2e^{-1} \frac{1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2) - 1 - t}{t^2} \\ &= 2e^{-1} \left( \frac{1}{2} + o(1) \right) \xrightarrow[t > 0]{t \rightarrow 0} 2e^{-1} \frac{1}{2} = e^{-1}. \end{aligned}$$

7. L'ensemble  $I$  est minoré (par 0 trivialement, et par  $e^{-1}$  d'après la question 4) et non vide ; il admet donc une borne inférieure. On sait d'après la question 4 que  $\inf(I) \geq e^{-1}$ . Or on a montré dans la question 6 que

$$\lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \int_0^1 |f_t - f'_t| = e^{-1},$$

et la question 5 donne  $f_t \in E$  pour tout  $t \in [0, 1]$ , si bien que  $\inf(I)$  ne peut être strictement supérieur à  $e^{-1}$ . On a donc  $\inf(I) = e^{-1}$ , ce qu'il fallait démontrer.

**Correction de l'exercice 35.** Lalala

**Correction de l'exercice 36.** Lalala

**Correction de l'exercice 37.** Lalala

**Correction de l'exercice 38.** Lalala