

Grande feuille d'exercices corrigés

Physique-Chimie – Première Spécialité

Plusieurs chapitres – raisonnements, problèmes, compréhension fine

Objectif

Ce document a été conçu pour :

- faire travailler plusieurs chapitres importants de la spécialité ;
- tester la compréhension réelle des notions, pas seulement l'application d'une recette ;
- proposer des exercices variés : questions de cours, calculs, interprétations, problèmes ouverts ;
- placer le corrigé juste après chaque exercice pour que l'élève puisse comparer son raisonnement.

Table des matières

1	Chapitre 1 – Structure de la matière, polarité, interactions	1
1.1	Exercice 1 – Liaisons polaires ou molécule polaire ?	1
1.2	Exercice 2 – Solubilité et raisonnement microscopique	2
1.3	Problème 1 – Pourquoi l'eau et l'huile se séparent-elles ?	3
2	Chapitre 2 – Transformations chimiques, quantité de matière, réactif limitant	4
2.1	Exercice 3 – Identifier le réactif limitant	4
2.2	Exercice 4 – Raisonner sans tableau automatique	5
2.3	Problème 2 – Une réaction n'est pas juste une formule	6
3	Chapitre 3 – Solutions, concentration, dilution	7
3.1	Exercice 5 – Préparer une solution diluée	7
3.2	Exercice 6 – Dissolution ou dilution ?	8
4	Chapitre 4 – Électricité, puissance, énergie	9
4.1	Exercice 7 – Comprendre la puissance électrique	9
4.2	Exercice 8 – Batterie et autonomie	10
4.3	Problème 3 – Dimensionner un usage quotidien	11
5	Chapitre 5 – Mouvement, forces, énergie mécanique	12
5.1	Exercice 9 – Identifier les forces	12
5.2	Exercice 10 – Énergie mécanique et frottements	13
5.3	Problème 4 – Freinage d'un vélo	14
6	Chapitre 6 – Ondes, signaux, lumière	15
6.1	Exercice 11 – Grandeurs caractéristiques d'une onde	15
6.2	Exercice 12 – Couleur, absorption, perception	16

6.3	Problème 5 – Un signal périodique et son interprétation	17
7	Deux problèmes transversaux	18
7.1	Problème transversal 1 – Du microscopique au macroscopique	18
7.2	Problème transversal 2 – Concevoir une expérience utile	19
8	Conclusion	20

1. Chapitre 1 – Structure de la matière, polarité, interactions

1.1. Exercice 1 – Liaisons polaires ou molécule polaire ?

Énoncé

On considère les molécules suivantes :



On admet les géométries suivantes :

- H_2O : coudée ;
- CO_2 : linéaire ;
- CH_4 : tétraédrique symétrique ;
- NH_3 : pyramidale.

- 1) Dire quelles liaisons sont polaires.
- 2) Dire quelles molécules sont polaires.
- 3) Expliquer pourquoi une molécule peut contenir des liaisons polaires tout en étant apolaire.
- 4) Comparer le comportement attendu de H_2O et CO_2 vis-à-vis de l'eau.

Corrigé**1) Liaisons polaires**

Une liaison est polaire lorsqu'il existe une différence notable d'électronégativité entre les deux atomes liés.

- Dans H_2O , les liaisons O–H sont polaires.
- Dans CO_2 , les liaisons C=O sont polaires.
- Dans CH_4 , les liaisons C–H sont très peu polaires ; à ce niveau on les considère souvent comme non polaires ou très faiblement polaires.
- Dans NH_3 , les liaisons N–H sont polaires.

2) Molécules polaires

- H_2O est polaire : géométrie coudée, les effets des deux liaisons ne se compensent pas.
- CO_2 est apolaire : les deux liaisons C=O sont opposées et se compensent.
- CH_4 est apolaire : géométrie symétrique.
- NH_3 est polaire : géométrie pyramidale, pas de compensation.

3) Pourquoi des liaisons polaires ne suffisent-elles pas ?

La polarité globale dépend :

- de la polarité de chaque liaison ;
- de la géométrie de la molécule.

Si les effets des liaisons se compensent vectoriellement, la molécule peut être globalement apolaire.

4) Comparaison H_2O / CO_2

L'eau est polaire et peut former des interactions fortes avec d'autres espèces polaires ou ioniques. Le dioxyde de carbone est apolaire dans son ensemble ; ses interactions avec l'eau sont moins favorables. On s'attend donc à ce que l'eau interagisse bien plus fortement avec elle-même qu'avec CO_2 .

Bilan

La phrase clé à retenir est :

Liaison polaire $\neq$ forcément molécule polaire.

1.2. Exercice 2 – Solubilité et raisonnement microscopique**Énoncé**

On souhaite prévoir qualitativement la solubilité dans l'eau des espèces suivantes :

NaCl , I_2 , éthanol, huile

On rappelle que :

- l'eau est un solvant polaire ;
 - l'éthanol possède un groupe O–H ;
 - l'huile est constituée majoritairement d'espèces apolaires.
- 1) Classer ces espèces selon leur aptitude à se mélanger à l'eau.
 - 2) Justifier chaque réponse en termes d'interactions microscopiques.
 - 3) Expliquer pourquoi la règle "le semblable dissout le semblable" ne doit pas être récitée sans réflexion.

Corrigé**1) Classement qualitatif**

- NaCl : très soluble.
- Éthanol : très soluble ou miscible.
- I₂ : peu soluble.
- Huile : non miscible ou très peu miscible.

2) Justification

- NaCl : solide ionique ; l'eau peut hydrater les ions Na⁺ et Cl⁻.
- Éthanol : la présence du groupe O–H permet des interactions favorables avec l'eau, notamment des liaisons hydrogène.
- I₂ : molécule apolaire ; les interactions avec l'eau sont peu favorables.
- Huile : espèces majoritairement apolaires, donc très mauvaises interactions avec l'eau.

3) Pourquoi la règle est-elle insuffisante seule ?

La règle est utile comme idée directrice, mais elle ne vaut que si on la traduit physiquement :

- quelles interactions faut-il rompre ?
- quelles interactions nouvelles se forment ?
- ces interactions nouvelles compensent-elles les anciennes ?

Méthode / idée de fond

Comprendre la dissolution, ce n'est pas apprendre une phrase par coeur ; c'est comparer des interactions.

1.3. Problème 1 – Pourquoi l'eau et l'huile se séparent-elles ?**Énoncé**

On mélange vigoureusement de l'eau et de l'huile dans un flacon transparent. Pendant quelques secondes, on observe une dispersion trouble, puis deux phases distinctes réapparaissent.

- 1) Expliquer pourquoi l'agitation permet temporairement de former une dispersion.
- 2) Expliquer pourquoi cette dispersion n'est pas stable.
- 3) Montrer comment cette expérience mobilise simultanément les notions de polarité, cohésion et miscibilité.

Corrigé**a) Effet de l'agitation**

L'agitation apporte de l'énergie mécanique et fragmente un liquide en fines gouttelettes dispersées dans l'autre. On force donc provisoirement un état plus mélangé.

b) Pourquoi la dispersion disparaît-elle ?

Les interactions eau-eau sont fortes car l'eau est polaire et peut former des liaisons hydrogène. Les interactions huile-huile sont plus favorables que les interactions eau-huile. Le système revient donc vers l'état où chaque liquide interagit préférentiellement avec lui-même.

c) Lien avec les notions du cours

- **Polarité** : eau polaire, huile apolaire.
- **Cohésion** : chaque liquide conserve une cohésion interne.
- **Miscibilité** : les interactions croisées eau-huile ne sont pas assez favorables pour stabiliser durablement un mélange homogène.

Bilan


Un mélange homogène ne dépend pas seulement de l'action de mélanger ; il dépend surtout des interactions réellement possibles entre les espèces.

2. Chapitre 2 – Transformations chimiques, quantité de matière, réactif limitant

2.1. Exercice 3 – Identifier le réactif limitant

Énoncé

On fait réagir du fer avec du dioxygène pour former de l'oxyde de fer(III), selon l'équation :




On dispose initialement de :

$$n(\text{Fe}) = 0.80 \text{ mol}, \quad n(\text{O}_2) = 0.45 \text{ mol}$$

- 1) Déterminer le réactif limitant.
- 2) Calculer l'avancement maximal.
- 3) Déterminer la quantité de matière finale de Fe_2O_3 .
- 4) Calculer la quantité de matière du réactif en excès restant à la fin.

Corrigé

On note x l'avancement.

**1) Réactif limitant**

Les contraintes sont :

$$x \leq \frac{0.80}{4} = 0.20$$

et

$$x \leq \frac{0.45}{3} = 0.15$$

La plus petite valeur est 0.15 mol. Donc :

$$x_{\max} = 0.15 \text{ mol}$$

Le dioxygène est le réactif limitant.

2) Avancement maximal

$$x_{\max} = 0.15 \text{ mol}$$

3) Quantité de matière finale de Fe_2O_3

Le coefficient stoechiométrique du produit vaut 2, donc :

$$n_f(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 2x_{\max} = 2 \times 0.15 = 0.30 \text{ mol}$$

4) Réactif en excès restant

Pour le fer :


$$n_f(\text{Fe}) = 0.80 - 4x_{\max} = 0.80 - 4 \times 0.15 = 0.80 - 0.60 = 0.20 \text{ mol}$$

Point de vigilance

L'erreur classique consiste à comparer directement 0.80 et 0.45, ce qui n'a pas de sens sans tenir compte des coefficients de l'équation-bilan.

2.2. Exercice 4 – Raisonner sans tableau automatique**Énoncé**

Le méthane brûle dans le dioxygène selon :



On dispose de :

$$n(\text{CH}_4) = 0.50 \text{ mol}, \quad n(\text{O}_2) = 1.50 \text{ mol}$$

Sans faire de tableau d'avancement complet au départ :

- 1) dire si le méthane peut être entièrement consommé ;
- 2) préciser quel réactif est en excès ;
- 3) calculer les quantités de matière finales des produits ;
- 4) vérifier ensuite la cohérence du raisonnement.

Corrigé**1) Le méthane peut-il être entièrement consommé ?**

Pour consommer 0.50 mol de méthane, il faut :

$$n(\text{O}_2)_{\text{nécessaire}} = 2 \times 0.50 = 1.00 \text{ mol}$$

Or on dispose de 1.50 mol de dioxygène. Donc le méthane peut être totalement consommé.

2) Réactif en excès

Le dioxygène est en excès.

3) Quantités finales des produits

Si tout le méthane réagit :

$$n_f(\text{CO}_2) = 0.50 \text{ mol}$$

car le coefficient stoechiométrique est 1.

Et :

$$n_f(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 0.50 = 1.00 \text{ mol}$$

Dioxygène restant :

$$n_f(\text{O}_2) = 1.50 - 1.00 = 0.50 \text{ mol}$$

4) Vérification

Le raisonnement est cohérent car :


- le méthane a bien disparu ;
- le dioxygène reste en quantité positive ;
- les quantités de produits suivent l'équation-bilan.

Méthode / idée de fond

Savoir faire un tableau est utile. Mais comprendre avant tout les proportions stoechiométriques est encore plus important.

2.3. Problème 2 – Une réaction n'est pas juste une formule**Énoncé**


Dans un laboratoire, on souhaite produire du dihydrogène par réaction entre un métal et un acide. On fait réagir du zinc avec une solution aqueuse acide selon :



On introduit :

$$n(\text{Zn}) = 0.12 \text{ mol}, \quad n(\text{H}^+) = 0.18 \text{ mol}$$

- 1) Déterminer le réactif limitant.
- 2) Calculer la quantité de matière de dihydrogène formée.
- 3) Calculer la quantité de matière de l'espèce en excès restante.
- 4) Expliquer pourquoi cette réaction permet de transformer une espèce ionique dissoute en gaz observable.

Corrigé**1) Réactif limitant**

Si tout le zinc réagit, il faut :

$$n(\text{H}^+)_{\text{nécessaire}} = 2 \times 0.12 = 0.24 \text{ mol}$$

Or on ne dispose que de 0.18 mol de H^+ . Donc H^+ est le réactif limitant.

2) Quantité de matière de dihydrogène formée

Pour 2 mol de H^+ , on forme 1 mol de H_2 . Donc :

$$n(\text{H}_2) = \frac{0.18}{2} = 0.09 \text{ mol}$$

3) Zinc restant

Le zinc consommé vaut :

$$n(\text{Zn})_{\text{consommé}} = 0.09 \text{ mol}$$

car le coefficient du zinc est 1 pour 1 mol de H_2 .

Donc :

$$n_f(\text{Zn}) = 0.12 - 0.09 = 0.03 \text{ mol}$$

4) Sens physique de la réaction

Cette transformation convertit des ions H^+ , invisibles en solution, en molécules de dihydrogène H_2 , qui peuvent former des bulles et devenir observables à notre échelle. La réaction illustre donc comment une évolution microscopique se traduit par un effet macroscopique visible.

Bilan

Une équation chimique ne sert pas seulement à calculer : elle raconte une transformation réelle de la matière.

3. Chapitre 3 – Solutions, concentration, dilution

3.1. Exercice 5 – Préparer une solution diluée

Énoncé

On dispose d'une solution mère de sulfate de cuivre de concentration :

$$C_m = 0.50 \text{ mol L}^{-1}$$

On veut préparer un volume :

$$V_f = 100.0 \text{ mL}$$

de solution fille de concentration :

$$C_f = 0.080 \text{ mol L}^{-1}$$

- 1) Calculer le volume de solution mère à prélever.
- 2) Décrire la préparation expérimentale.
- 3) Expliquer pourquoi la quantité de soluté prélevée est conservée lors de la dilution.

Corrigé**1) Calcul du volume prélevé**

On utilise :

$$C_m V_p = C_f V_f$$

avec V_p le volume prélevé.

$$V_p = \frac{C_f V_f}{C_m}$$

En prenant $V_f = 0.1000 \text{ L}$:

$$V_p = \frac{0.080 \times 0.1000}{0.50} = 0.0160 \text{ L} = 16.0 \text{ mL}$$

2) Préparation

- Prélever 16.0 mL de solution mère à l'aide d'une pipette graduée ou d'une pipette jaugée adaptée.
- Introduire ce volume dans une fiole jaugée de 100.0 mL.
- Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
- Boucher, puis homogénéiser.

3) Pourquoi la quantité de soluté est-elle conservée ?

Lors d'une dilution, on ajoute du solvant mais on ne retire ni ne crée de soluté. La quantité de matière de soluté dissous prélevée au départ est donc la même dans la solution fille finale.

Point de vigilance

Une dilution diminue la concentration, pas la quantité de matière de soluté présente dans le volume transféré.

3.2. Exercice 6 – Dissolution ou dilution ?**Énoncé**

Pour chacune des situations suivantes, préciser s'il s'agit d'une dissolution ou d'une dilution, puis expliquer la différence de sens physique.

- a) On introduit 5.0 g de chlorure de sodium solide dans de l'eau.
- b) On prélève 10.0 mL d'une solution de glucose concentrée puis on ajoute de l'eau jusqu'à 100.0 mL.
- c) On met un morceau de sucre dans un café chaud.

Puis répondre :

- 1) Quelle grandeur est conservée lors d'une dilution ?
- 2) Quelle grandeur augmente lors d'une dilution ?
- 3) Pourquoi les deux opérations ne doivent-elles pas être confondues ?

Corrigé**Identification**

- a) Dissolution : on part d'un soluté solide et on le disperse dans un solvant.
- b) Dilution : on part déjà d'une solution et on ajoute du solvant pour diminuer sa concentration.
- c) Dissolution : le sucre solide se dissout dans le café.

1) Grandeur conservée lors d'une dilution

La quantité de matière de soluté contenue dans le prélèvement est conservée.

2) Grandeur qui augmente lors d'une dilution

Le volume total de solution augmente.

3) Pourquoi ne pas confondre ?

Dans une dissolution, on introduit du soluté dans un solvant. Dans une dilution, on possède déjà une solution et on change seulement sa concentration en ajoutant du solvant.

Bilan

Dissolution $\neq$ Dilution

La première crée la solution à partir d'un soluté ; la seconde modifie une solution déjà préparée.

4. Chapitre 4 – Électricité, puissance, énergie

4.1. Exercice 7 – Comprendre la puissance électrique

Énoncé

Un appareil électrique fonctionne sous une tension de 230 V et est parcouru par un courant d'intensité 3.0 A.

- 1) Calculer sa puissance électrique.
- 2) Calculer l'énergie électrique reçue en 15 min.
- 3) Expliquer la différence entre puissance et énergie.
- 4) Un élève dit : "plus la puissance est grande, plus l'énergie est grande". Expliquer pourquoi cette phrase est incomplète.

Corrigé**1) Puissance**

$$P = UI = 230 \times 3.0 = 690 \text{ W}$$

2) Énergie reçue en 15 min

$$E = P\Delta t$$

avec :

$$\Delta t = 15 \text{ min} = 15 \times 60 = 900 \text{ s}$$

Donc :

$$E = 690 \times 900 = 621\,000 \text{ J}$$

3) Différence entre puissance et énergie

- La puissance mesure le débit de transfert d'énergie.
- L'énergie mesure la quantité totale transférée sur une durée.

4) Pourquoi la phrase est-elle incomplète ?

À durée fixée, une puissance plus grande implique une énergie plus grande. Mais l'énergie dépend aussi du temps de fonctionnement. Un appareil peu puissant qui fonctionne longtemps peut transférer plus d'énergie qu'un appareil très puissant utilisé brièvement.

Méthode / idée de fond

La bonne phrase est :

$$E = P \times \Delta t$$

Il faut donc toujours penser simultanément à la puissance et à la durée.

4.2. Exercice 8 – Batterie et autonomie**Énoncé**

Une batterie d'énergie disponible

$$E_{\text{bat}} = 540 \text{ kJ}$$

alimente un dispositif électrique de puissance moyenne

$$P = 45 \text{ W}$$

- 1) Estimer la durée de fonctionnement.
- 2) Exprimer le résultat en secondes puis en heures.
- 3) Expliquer pourquoi, dans un vrai système, cette durée est souvent surestimée par ce calcul simple.

Corrigé**1) Durée de fonctionnement**

On utilise :

$$E = P\Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{E}{P}$$

Avec :

$$E = 540 \text{ kJ} = 540\,000 \text{ J}$$

Donc :

$$\Delta t = \frac{540\,000}{45} = 12\,000 \text{ s}$$

2) En heures

$$\Delta t = \frac{12\,000}{3600} \approx 3.33 \text{ h}$$

Soit environ :

$$3 \text{ h } 20 \text{ min}$$

3) Pourquoi ce calcul surestime-t-il souvent ?

Dans un système réel :

- toute l'énergie stockée n'est pas toujours récupérable ;
- il existe des pertes ;
- la puissance n'est pas forcément constante ;
- le rendement n'est pas parfait.

Point de vigilance

Les calculs idéaux sont indispensables pour raisonner, mais un système réel comporte presque toujours des pertes.

4.3. Problème 3 – Dimensionner un usage quotidien**Énoncé**

Un élève souhaite alimenter une petite lampe LED pour lire le soir en camping. La lampe fonctionne avec une puissance moyenne de 6.0 W et doit fonctionner 2.5 h chaque soir pendant 4 jours.

On dispose de deux batteries :

- batterie A : énergie disponible 180 kJ ;
- batterie B : énergie disponible 260 kJ.

- 1) Calculer l'énergie totale nécessaire.
- 2) Dire quelle batterie choisir.
- 3) Expliquer pourquoi un léger écart entre énergie calculée et énergie disponible peut être problématique en pratique.

Corrigé**a) Énergie nécessaire**

Durée totale :

$$\Delta t = 4 \times 2.5 = 10 \text{ h}$$

En secondes :

$$\Delta t = 10 \times 3600 = 36\,000 \text{ s}$$

Énergie requise :

$$E = P\Delta t = 6.0 \times 36\,000 = 216\,000 \text{ J} = 216 \text{ kJ}$$

b) Choix de la batterie

- Batterie A : 180 kJ, insuffisante.
- Batterie B : 260 kJ, suffisante.

On choisit la batterie B.

c) Pourquoi un faible écart peut-il poser problème ?

Parce qu'en pratique :

- le rendement n'est pas parfait ;
- la puissance peut varier ;
- une batterie ne délivre pas toujours exactement son énergie nominale ;
- il est prudent de garder une marge.

Bilan

Dimensionner un système, ce n'est pas seulement faire un calcul exact : c'est aussi prévoir les écarts du réel.

5. Chapitre 5 – Mouvement, forces, énergie mécanique

5.1. Exercice 9 – Identifier les forces

Énoncé

Une caisse est tirée à vitesse constante sur un sol horizontal par une corde. On modélise la caisse comme un point matériel.

- 1) Faire l'inventaire des forces appliquées à la caisse.
- 2) Dire lesquelles sont des forces de contact et lesquelles sont des forces à distance.
- 3) Expliquer pourquoi la vitesse constante donne une information importante sur le bilan des forces.
- 4) Peut-on conclure que les forces qui s'exercent sont nulles ? Justifier.

Corrigé**a) Forces appliquées**

- le poids $\vec{P}$, dû à l'attraction terrestre ;
- la réaction du sol ;
- la force de traction exercée par la corde ;
- éventuellement une force de frottement du sol sur la caisse.

b) Contact ou distance

- Poids : force à distance.
- Réaction du sol : force de contact.
- Traction : force de contact.
- Frottement : force de contact.

c) Rôle de la vitesse constante

Si la vitesse est constante, l'accélération est nulle. On en déduit que la résultante des forces est nulle.

d) Les forces sont-elles nulles ?

Non. Les forces peuvent exister tout en se compensant. Vitesse constante signifie :

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

et non pas que chaque force est nulle.

Point de vigilance

Erreur classique : confondre “résultante nulle” et “absence de forces”.

5.2. Exercice 10 – Énergie mécanique et frottements**Énoncé**

Une bille descend une pente puis arrive sur une portion horizontale rugueuse. On observe qu'après la descente, sa vitesse diminue progressivement sur la partie horizontale jusqu'à s'annuler.

- 1) Expliquer qualitativement l'évolution de l'énergie potentielle de pesanteur pendant la descente.
- 2) Expliquer pourquoi la vitesse augmente d'abord.
- 3) Expliquer ensuite pourquoi la vitesse diminue sur la partie horizontale.
- 4) Dire si l'énergie mécanique du système bille-Terre se conserve sur toute la trajectoire.

Corrigé**1) Pendant la descente**

L'altitude diminue, donc l'énergie potentielle de pesanteur diminue.

2) Pourquoi la vitesse augmente-t-elle ?

Une partie de l'énergie potentielle perdue se transforme en énergie cinétique. La bille accélère donc au cours de la descente.

3) Pourquoi la vitesse diminue-t-elle ensuite ?

Sur la partie horizontale rugueuse, les frottements dissipent de l'énergie. L'énergie cinétique diminue donc progressivement jusqu'à devenir nulle.

4) Conservation de l'énergie mécanique ?

Elle n'est pas conservée sur toute la trajectoire si des frottements interviennent. Sur la portion où les frottements sont négligeables, on peut considérer qu'elle se conserve approximativement. Sur la partie rugueuse, elle décroît.

Méthode / idée de fond

Quand on parle d'énergie mécanique, la vraie question est toujours :

les frottements sont-ils négligeables ou non ?

5.3. Problème 4 – Freinage d'un vélo**Énoncé**

Un cycliste roule à vitesse non nulle sur une route horizontale. Il cesse de pédaler, puis freine progressivement jusqu'à l'arrêt.

- 1) Décrire l'évolution de son énergie cinétique.
- 2) Expliquer où "va" cette énergie.
- 3) Pourquoi est-il faux de dire que l'énergie a disparu ?
- 4) En quoi cette situation permet-elle de comprendre l'idée de dissipation ?

Corrigé**1) Évolution de l'énergie cinétique**

L'énergie cinétique diminue au cours du ralentissement, puis devient nulle lorsque le vélo s'arrête.

2) Où va cette énergie ?

Elle est transférée vers d'autres formes :

- échauffement des freins ;
- échauffement des pneus et de la route ;
- agitation thermique de l'air ;
- éventuellement un peu de son.

3) Pourquoi ne disparaît-elle pas ?

L'énergie ne disparaît pas : elle est transformée et transférée. Elle devient simplement moins facilement récupérable pour produire à nouveau le mouvement initial.

4) Compréhension de la dissipation

La dissipation correspond au fait qu'une énergie mécanique organisée se transforme en formes plus dispersées, en particulier en énergie thermique.

Bilan

Dire qu'une énergie est dissipée ne signifie pas qu'elle est détruite ; cela signifie qu'elle est transférée sous une forme moins exploitable pour le mouvement étudié.

6. Chapitre 6 – Ondes, signaux, lumière

6.1. Exercice 11 – Grandeurs caractéristiques d'une onde

Énoncé

Une onde progressive périodique se propage à la célérité

$$v = 340 \text{ m s}^{-1}$$

et a pour fréquence

$$f = 680 \text{ Hz}$$

- 1) Calculer sa période.
- 2) Calculer sa longueur d'onde.
- 3) Expliquer le sens physique de la longueur d'onde.
- 4) Dire ce qui change si la fréquence double alors que la célérité reste la même.

Corrigé**1) Période**

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{680} \approx 1.47 \times 10^{-3} \text{ s}$$

2) Longueur d'onde

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{680} = 0.50 \text{ m}$$

3) Sens physique

La longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une période. C'est aussi la distance entre deux points successifs vibrant en phase.

4) Si la fréquence double

Si f double et v reste constante, alors :

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

donc la longueur d'onde est divisée par 2.

Point de vigilance

À célérité fixée :

$$\lambda \propto \frac{1}{f}$$

Fréquence et longueur d'onde varient en sens inverse.

6.2. Exercice 12 – Couleur, absorption, perception**Énoncé**

On éclaire un objet avec de la lumière blanche. L'objet paraît rouge.

- 1) Que peut-on dire qualitativement des radiations qu'il diffuse ou transmet ?
- 2) Que devient la partie non rouge de la lumière reçue ?
- 3) Pourquoi un même objet peut-il paraître différent selon l'éclairage ?
- 4) Expliquer en quoi cette question mobilise un raisonnement physique, et pas seulement une connaissance de vocabulaire.

Corrigé**1) Radiations diffusées ou transmises**

Si l'objet paraît rouge, cela signifie qu'il renvoie préférentiellement vers l'oeil les radiations rouges.

2) Partie non rouge

Les autres radiations sont majoritairement absorbées ou beaucoup moins diffusées/transmises.

3) Pourquoi l'apparence dépend-elle de l'éclairage ?

Parce que l'objet ne peut renvoyer que les radiations qu'il reçoit. Si la lumière incidente ne contient pas de rouge, un objet rouge ne pourra pas apparaître rouge de la même façon.

4) Pourquoi est-ce un vrai raisonnement physique ?

Il faut articuler :

- la composition spectrale de la lumière incidente ;
- l'interaction lumière-matière ;
- la lumière effectivement reçue par l'oeil.

Ce n'est donc pas une simple phrase à apprendre.

Bilan

La couleur perçue n'est pas une propriété isolée de l'objet ; elle dépend aussi de la lumière qui l'éclaire.

6.3. Problème 5 – Un signal périodique et son interprétation**Énoncé**

On enregistre un signal périodique à l'oscilloscope. On observe que le motif élémentaire se répète toutes les 4.0 ms.

- 1) Déterminer la période.
- 2) Calculer la fréquence.
- 3) Expliquer pourquoi augmenter la fréquence change la sensation de hauteur d'un son.
- 4) Un élève affirme : "plus l'amplitude est grande, plus le son est aigu". Discuter cette affirmation.

Corrigé**1) Période**

Le motif se répète toutes les 4.0 ms, donc :

$$T = 4.0 \times 10^{-3} \text{ s}$$

2) Fréquence

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4.0 \times 10^{-3}} = 250 \text{ Hz}$$

3) Hauteur du son

La hauteur d'un son est liée à sa fréquence :

- fréquence plus grande $\Rightarrow$ son plus aigu ;
- fréquence plus petite $\Rightarrow$ son plus grave.

4) Discussion de l'affirmation

L'affirmation est fausse. L'amplitude est liée à l'intensité perçue, donc au caractère plus fort ou plus faible du son. La hauteur dépend de la fréquence, pas de l'amplitude.

Point de vigilance

Ne pas confondre :

- fréquence $\rightarrow$ hauteur ;
- amplitude $\rightarrow$ intensité.

7. Deux problèmes transversaux

7.1. Problème transversal 1 – Du microscopique au macroscopique

Énoncé

On compare deux liquides A et B de masses molaires voisines. Le liquide A est très miscible à l'eau et possède une température d'ébullition relativement élevée. Le liquide B est peu miscible à l'eau et s'évapore plus facilement.

On sait que A possède un groupe O–H, alors que B ne possède que des liaisons C–C et C–H.

- 1) Expliquer pourquoi A et B n'ont pas le même comportement face à l'eau.
- 2) Expliquer pourquoi leurs températures d'ébullition peuvent être différentes malgré des masses molaires voisines.
- 3) Montrer que la structure moléculaire permet de prévoir des propriétés macroscopiques.

Corrigé**1) Miscibilité avec l'eau**

Le liquide A possède un groupe O–H. Il peut interagir favorablement avec l'eau, notamment par liaison hydrogène. Le liquide B, composé seulement de liaisons C–C et C–H, est globalement apolaire et interagit mal avec l'eau.

2) Température d'ébullition

À masse molaire voisine, la différence ne vient pas principalement de la masse mais de la nature des interactions intermoléculaires :

- A : interactions plus fortes, notamment liaisons hydrogène possibles ;
- B : interactions plus faibles, essentiellement de Van der Waals.

Il faut donc plus d'énergie pour vaporiser A.

3) Structure et propriétés

La structure détermine :

- la polarité éventuelle ;
- les interactions possibles ;
- donc des propriétés comme la miscibilité et la température d'ébullition.

Bilan

La physique-chimie devient vraiment intelligible lorsqu'on sait relier :

structure → interactions → propriétés

7.2. Problème transversal 2 – Concevoir une expérience utile**Énoncé**

Un professeur veut faire comprendre à sa classe la différence entre :

- une dissolution ;
- une dilution ;
- une transformation chimique produisant un gaz.

Proposer pour chacun des trois cas une expérience simple de laboratoire ou de salle de classe, puis expliquer :

- 1) ce qu'on observe à l'échelle macroscopique ;
- 2) ce qu'on interprète à l'échelle microscopique ;
- 3) en quoi les trois situations sont fondamentalement différentes.

Corrigé**Exemple de dissolution**

On dissout du sel dans l'eau.

- Macroscopiquement : le solide “disparaît”.
- Microscopiquement : les ions se dispersent et sont hydratés.

Exemple de dilution

On ajoute de l'eau à une solution colorée de sulfate de cuivre.

- Macroscopiquement : la couleur devient moins intense.
- Microscopiquement : les espèces dissoutes sont plus dispersées, mais leur quantité dans le prélèvement est inchangée.

Exemple de transformation chimique avec gaz

On fait réagir du zinc avec une solution acide.

- Macroscopiquement : apparition de bulles.
- Microscopiquement : des espèces chimiques disparaissent et de nouvelles espèces apparaissent, notamment H_2 .

Différence fondamentale

- **Dissolution** : pas de nouvelle espèce chimique, seulement dispersion d'un soluté.
- **Dilution** : pas de nouvelle espèce chimique, seulement diminution de concentration.
- **Transformation chimique** : apparition et disparition d'espèces chimiques.

Bilan

Savoir distinguer ces trois situations est essentiel : elles peuvent parfois se ressembler visuellement, mais leur sens physique est profondément différent.

8. Conclusion

Objectif

Pour progresser vraiment en Première spé, il faut s'entraîner à faire cinq choses :

1. identifier les grandeurs pertinentes ;
2. relier les calculs au sens physique ;
3. distinguer ce qui relève de la structure, des interactions et des propriétés ;
4. verbaliser clairement un raisonnement ;
5. vérifier la cohérence d'un résultat.