A)
$$f(x) = \frac{x^{AA} - 8x^{5}}{x^{7} + 4x}$$

$$f(-x) = \frac{(-x)^{1/4} - 8(-x)^{5}}{(-x)^{5} + 4(-x)} = \frac{-x^{1/4} + 8x^{5}}{-x^{7} - 4x} = -\frac{x^{1/4} - 8x^{5}}{x^{7} + 4x}$$

$$\Rightarrow$$
 $f(-x) = -f(x)$

=> f ist ungerade.

b)
$$f(x) = x^5 \cdot x^k = x^{5+k}$$

f ist genau dann gevade, wenn der Exponent 5+k gevade ist, und genau dann ungevade, wenn 5+k ungevade ist. Somit gilt:

f ist gerade for alle ungeraden k. f ist ungerade for alle geraden k.

2) Ein soldies Polynom ist

$$f(x) = x^{420} + 69.$$

x420 ist gavantiert for alle XEIR größer oder gleich null, da der Exponent gerade ist. Es gitt also:

Wird diese Finktion non um 69 nach oben verschiden, ist der Wert for $x = 0^{420} + 69 = 69$ und damit positiv. Das Polynam f hat die geforderten Eigenschaften.

3) Beredining wit Horner-Schema:

x=-1 ist hier die offensichtlichste Nullstelle.

Daraus folgt: $f(x) = (x^3 + 3x^2 - 16x - 48)(x + 1)$

Hier ist was x=-3 eine Nullstelle. Also:

Somit ist
$$f(x) = (x^2 - 16)(x+1)(x+3)$$

Die restlichen Nullstellen lassen sich wie folgt ermitteln:

$$x^{2}-16=0$$
 1+16
 $x^{2}=16$ 1 $\sqrt{1}$
 $x=\pm 4$

Die Nullstellen lauten also {-1, -3, -4, 4}.

$$e^{\cot(4x-3)} = 1 | \ln \cos(4x-3)| = \ln(1)$$

 $\cot(4x-3) = 0$

Es gilt:

cot (a)=0 for
$$a_{K}=\frac{\pi}{2}+k\pi$$
 mit $K\in\mathbb{Z}$

x kann somit wie folgt ermittelt werden:

$$4x-3=\frac{17}{2}+k\pi$$
 1+3

$$4x = \frac{\pi + 6}{2} + k\pi$$
 1:4

$$\times = \frac{1}{4} \left(\frac{\pi+6}{2} + k\pi \right)$$

$$X = \frac{\pi + 6}{8} + \frac{k\pi}{4}$$

$$X = \frac{11+6+2k\pi}{8} = \frac{\pi(2k+1)+6}{8}$$

Als Lösingsmenge folgt: