

CAPITOLO 7

- 7.1 Retta tangente, derivata
- 7.2 Derivata destra e sinistra, punto angoloso e cuspide
- 7.3 Proprietà elementari della derivata
- 7.4 Derivate delle funzioni elementari
- 7.5 Calcolo delle derivate (ESERCIZI ESEMPIO SUL LIBRO)
- 7.6 Estremi locali e derivate (TEOREMI)
- 7.7 Teorema del valor medio e applicazioni (TEOREMI)
- 7.8 Derivate successive
- 7.9 Funzioni convesse e concave (GUARDA FOGLIO STUDIO DI FUNZIONI)
- 7.10 Studio di funzione (GUARDA FOGLIO STUDIO DI FUNZIONI)
- 7.11 Polinomio di Taylor
- 7.12 Applicazioni del teorema di Peano
- 7.13 Approssimazione di funzioni con polinomi di Taylor

LE DERIVATE $\rightarrow y = f(x)$ la derivata di $f(x)$ sarà $y' = f'(x)$


Definizione:

- La derivata di una funzione è il limite, se esiste ed è finito, per h che tende a 0 del rapporto incrementale.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{Dy}{Dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

Significato geometrico:

- Il significato geometrico della derivata è il coefficiente angolare della retta tangente



Perché calcoliamo le derivate?

- Conoscere l'andamento dei coefficienti angolari di una funzione ci aiuta. A capire dove la funzione è crescente e dove è decrescente. Inoltre ci consente di stabilire i punti di massimo e minimo della funzione che stiamo studiando.

Come le calcoliamo:

- Avendo $f(x)$ derivabile $\forall x \in A$ allora diremo che è derivabile in A e scriveremo $y = f'(x_0)$ e andremo a chiamarla derivata prima.

Derivata destra e sinistra, punto angoloso, cuspidi e flessi a tangente verticale




- Possiamo calcolarci i **punti di non derivabilità**, per farlo ci servirà calcolarci la derivata destra e sinistra.

$$f'_+(x_0) := \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \rightarrow \text{derivata destra}$$

$$f'_-(x_0) := \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \rightarrow \text{derivata sinistra}$$

- Esistono 3 tipi di punti di non derivabilità
 - **Punto angoloso** \rightarrow se i due limiti sono entrambi finiti ma assumono valori diversi
 - **Cuspide** \rightarrow se i due limiti sono entrambi infiniti, in particolar modo se sono infiniti di segno opposto (cioè uno $+\infty$ e l'altro $-\infty$)

- **Flesso a tangente verticale** → se i due limiti sono infiniti dello stesso segno (cioè entrambi $+\infty$ o entrambi $-\infty$)

Punti di non derivabilità	Grafico	Derivata
Flesso a tangente verticale		a) $f'_-(c) = f'_+(c) = +\infty$ b) $f'_-(c) = f'_+(c) = -\infty$
Cuspide	 <p>a. Verso il basso. b. Verso l'alto.</p>	a) $f'_-(c) = -\infty, \quad f'_+(c) = +\infty$ b) $f'_-(c) = +\infty, \quad f'_+(c) = -\infty$
Punto angoloso		$f'_-(c) \neq f'_+(c)$ a) entrambe finite b) una finita, l'altra infinita

Proprietà elementari della derivata

- $(f' \circ g')(x_0) = f'(g(x_0)) g'(x_0) \rightarrow$ derivata di una funzione composta
- $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \quad \text{dove } y_0 = f(x_0) \rightarrow$ derivata della funzione inversa

Derivate delle funzioni elementari

Chiamiamo $f(x) = y$ e $f'(x_0) = y'$

FUNZIONI	DERIVATE
$y = K$ <i>dove k è una costante</i>	$y' = 0$
$y = x^n$	$y' = n \text{ (per) } x^{n-1}$
$y = e^x$	$y' = e^x$
$y = a^x$	$y' = a^x \text{ (per) } \ln a$

$y = \ln x$	$y' = \frac{1}{x}$
$y = \log_a x$	$y' = \frac{1}{x \ln a}$
$y = \sqrt{x}$	$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$y = \sqrt[n]{x}$	$y' = \frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}}$
$y = \sin x$	$y' = \cos x$
$y = \cos x$	$y' = -\sin x$
$y = \tan x$	$y' = \frac{1}{\cos^2 x}$
$y = \cot x$	$y' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
$y = \arcsin x$	$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$y = \arccos x$	$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$y = \arctan x$	$y' = \frac{1}{1+x^2}$
$y = \operatorname{arccot} x$	$y' = -\frac{1}{1+x^2}$

Derivate successive

- Possiamo considerare f' come una semplice funzione da derivare (nuovamente) e si indica con il simbolo f'' e verrà chiamata derivata seconda.

$$f''(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}$$

- Possiamo anche calcolarci la derivata n-esima di f in x , o derivata di ordine $n+1$ in x , e si scrive...

$$f^{(n+1)}(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x+h) - f^{(n)}(x)}{h}$$