

Secondo parziale di Geometria (Ing. Meccanica) 20-12-2016-B

1) Trovare:

- a) l'equazione del cono \mathcal{L} che proietta la circonferenza $\mathcal{C} \equiv \begin{cases} x^2 + y^2 - 9 = 0 \\ z = 2 \end{cases}$ dal vertice $V(0, 0, 5)$,
- b) le equazioni, il centro e il raggio della circonferenza $\bar{\mathcal{C}}$ intersezione del cono \mathcal{L} con il piano di equazione $z = -1$.

2) Determinare gli eventuali valori di $\alpha \in \mathbf{R}$ per i quali

a) la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 8 & \alpha \end{pmatrix}$$

è diagonalizzabile,

b) A è invertibile e $|A^{-1}| < |A|$.

c) Posto $\alpha = 1$, esprimere A^3 come combinazione lineare di A^2, A, I .

3) Sia

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad (A \text{ è simmetrica})$$

a) Diagonalizzare A con una matrice ortogonale U .

b) Determinare la decomposizione spettrale del tensore T associato ad A .

c) Trovare $\alpha \in \mathbf{R}$ in modo che T sia ortogonale al tensore

$$S((x, y, z)) = (y + \alpha z, x + y, x + z).$$

d) Trovare il tensore emisimmetrico $E((x, y, z))$ in \mathbf{R}^3 di vettore assiale $\mathbf{v}_1 = T((1, 1, 1))$.

e) Dire se A è definita positiva e in caso affermativo calcolare determinante e traccia di \sqrt{A} .

N.B. Tutti i passaggi devono essere opportunamente giustificati.