

# ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Навършена възраст:	Имунизация против:	Ваксина	Начин на приложение:
През първите 24 часа след раждането *	Имунизация против хепатит Б (I прием)	Рекомбинантна хепатит Б ваксина <b>Енжерикс</b>	мускулно, 0,5 мл
От 48-ия час след раждането	Имунизация против туберкулоза	<b>БЦЖ</b>	вътрекожно, 0,1 мл
Втори месец	Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (I прием)**  Имунизация против пневмококи (I прием)	Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б <b>Hexacima</b>  Конюгирана пневмококова ваксина <b>Синфлорикс</b>	мускулно, 0,5 мл
Трети месец	Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (II прием)	Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б <b>Hexacima</b> . За получилите <b>Инфанрикс Хекса</b> е предвидена доза от същата ваксина.	мускулно, 0,5 мл
Четвърти месец	Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (III прием)  Имунизация против пневмококи (II прием)	Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б <b>Hexacima</b> . За получилите <b>Инфанрикс Хекса</b> е предвидена доза от същата ваксина.  Конюгирана пневмококова ваксина <b>Синфлорикс</b>	мускулно, 0,5 мл
Седми месец	Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави <b>проба Манту</b> (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират	<b>БЦЖ</b>	вътрекожно, 0,1 мл

Навършена възраст:	Имунизация против:	Ваксина	Начин на приложение:
Дванадесет месеца	Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след предишния прием (III прием)	Конюгирана пневмококова ваксина <b>Синфлорикс</b>	мускулно, 0,5 мл
Тринадесет месеца	Имунизация против морбили, паротит и рубеола	Триваксина морбили – паротит – рубеола <b>M-M-RVAXPRO</b>	подкожно или мускулно, 0,5 мл
Шестнадесет месеца (не по- рано от една година след III прием)	Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (IV прием)	Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б <b>Инфанрикс – IPV+HiB</b>	мускулно, 0,5 мл
Шест години	Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием)	Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина <b>Тетраксим</b>	мускулно, 0,5 мл
Седем години	Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна <b>проба</b> <b>Манту</b> )	<b>БЦЖ</b>	вътрекожно, 0,1 мл
Дванадесет години	Реимунизация против морбили паротит и рубеола  Реимунизация против тетанус, дифтерия и коклюш (VI прием)	Триваксина морбили – паротит – рубеола <b>M-M-RVAXPRO</b>  Комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) с намалено антигенно съдържание (Тдка) <b>Бустрикс</b> .	подкожно или мускулно, 0,5 мл  мускулно, 0,5 мл
Седемнадесет години	Реимунизация против тетанус и дифтерия	<b>ТетаДиф (Td)</b>	мускулно, 0,5 мл
От 25-ата година през 10 години	Реимунизация против тетанус и дифтерия	<b>ТетаДиф (Td)</b>	мускулно, 0,5 мл

\* Ако за хепатит Б ваксинация се използва само монопрепарат (Енжерикс), дозите са 3 – в първите 24 часа след раждането, на 1 месец и на 6 месечна възраст. Иначе от втората доза влиза в състава на многокомпонентна ваксина и дозите общо са 4.

\*\* Според последните промени в Наредба 15 за имунизациите, може да се прилагат различни марки и видове моноваксини или комбинирани многокомпонентни, като не се уточнява и колко на брой, стига общо да съдържат антигените, които се изискват за съответната възраст.

Ваксинациите над шестгодишна възраст се правят в календарната година на навършване на възрастта.

Ваксината срещу пневмококови инфекции на третия месец не се прилага при децата, родени след 31.12.2019 г.