COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°18- 2026
16 octubre 2026

Alerta de El Niño Costero[1]

EL NIÑO COSTERO SE EXTENDERÍA HASTA EL OTOÑO DE 2027

La Temperatura Superficial del Mar del Pacifico continúa presentando anomalías positivas con tendencia ascendente (Figura 1). Frente a la costa peruana (región Niño 1+2) es más probable que calentamiento del mar (El Niño costero) se mantenga con una magnitud de extraordinaria[2] hasta enero de 2027 (Figura 2), para luego disminuir a fuerte hasta inicios del otoño de 2027. Asimismo, en el Pacífico central (región Niño 3.4) la temperatura del mar se mantendría con una magnitud de muy fuerte[3] (Figura 2b) hasta febrero de 2027, reduciendo su magnitud hacia el otoño de dicho año.




Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical del 1 al 14 de octubre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

[1] https://enfen.imarpe.gob.pe/download/nota-tecnica-enfen-02-2026-sistema-de-alerta-ante-el-nino-costero-y-la-nina-costera/?
[2] https://enfen.imarpe.gob.pe/download/nota-tecnica-enfen-01-2024-definicion-operacional-de-los-eventos-el-nino-costero-y-la-nina-costera-en-el-peru/?wpdmdl=1905&refresh=6ab6d90a59c821790368010
[3] https://cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/roni/strengths/
[4] https://enfen.imarpe.gob.pe/download/nota-tecnica-enfen-01-2024-definicion-operacional-de-los-eventos-el-nino-costero-y-la-nina-costera-en-el-peru/?wpdmdl=1905&refresh=6ab8fccbae3281790508235
[5] https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/roni/pdf/roni-info-may-2026.pdf

Ante estos escenarios de calentamiento anómalo del mar, se prevén:



Lluvias: Para lo que resta del 2026[6], se irán incrementando las lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental, con posibles precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en el norte. En la sierra sur y la Amazonía, las precipitaciones continuarían de normal a inferior.
Para el verano de 2027[7], lluvias sobre lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental; y de normal a inferior en la sierra sur, centro oriental y la región amazónica central y sur.



Caudales: Superiores a lo normal[8], principalmente, desde noviembre en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque y desde diciembre los ríos Rímac y Chillón. En el sur, en la región Ica los caudales serian de normal a superior, mientras que en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna se presentarían caudales con valores normales a inferiores.
Para la Amazonía, selva norte, caudales normales; mientras que, en el centro y sur menores a lo normal, como los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota. Por otro lado, los ríos tributarios del lago Titicaca se prevé que presenten caudales por debajo de lo normal; en tal sentido, el nivel del lago Titicaca continuará por debajo de su normal.



Temperatura del Aire: Continúan valores muy superiores a sus normales climáticos en toda la costa peruana, con posibles nuevos récords, hasta el próximo verano[6].
Las altas temperaturas anómalas y el incremento y/o déficit de las precipitaciones deberán de ser consideradas para las posibles afectaciones en los diferentes cultivos.



Pesquero: La anchoveta se observa mayormente en su fase juvenil, muy pegada a la costa y profundizada. Se espera que continúe una buena disponibilidad de bonito, pez sierra y samasa cerca de la costa centro y sur; asimismo, otras especies como perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla, entre otras, a lo largo de toda la costa.



Embalses: Los principales embalses del país se encuentran al 58 % de la capacidad hidráulica nacional, descendiendo sus volúmenes de forma muy notoria dentro de lo previsto para esta época del año, a excepción de los embalses de Tinajones (Lambayeque) y Paucarani (Tacna), que están en niveles muy bajos, para la época. Por otro lado, bajo el posible escenario de déficit de precipitaciones para los próximos meses en la sierra, centro y sur, se presentarán racionamientos en el abastecimiento de agua para los distintos usos.

Se exhorta a los tomadores de decisiones considerar los estudios de escenarios de riesgo[9] actualizados, tomando como base los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para la reducción del riesgo de desastres y la preparación ante peligros inminentes.

Se insta a las autoridades y a la ciudadanía a consultar los canales oficiales del ENFEN y de sus entidades técnico-científicas adscritas. Se pone a disposición de los tres niveles de gobierno el Visor[10] INDECI, una herramienta de soporte técnico clave para la gestión de emergencias.

Esta Comisión mantiene el monitoreo continuo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras para actualizar sus perspectivas. El próximo Comunicado Oficial se emitirá el jueves 30 de octubre de 2026.

Comisión Multisectorial encargada
del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño

[6] https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02262SENA-76.pdf
[7] https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02261SENA-25.pdf
[8] https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02694SENA-74.pdf
[9] https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/22787
[10] https://geo.indeci.gob.pe/visorindeci/