

## 0.1 Ausgleichsrechnung

- Datenpunkte mit gewissen Streuung durch einfache Funktion annähern
- Mehr Gleichungen als unbekannte (Mehr Datenpunkte als Parameter)

### 0.1.1 Polynominterpolation

Gesucht:  $P_n(x)$  welche  $n+1$  Stützpunkte interpoliert Jeder Stützpunkt gibt lin.Gleichung für die Bestimmung der Koeffizienten.

Grad  $n$  so wählen, dass lin.Gleichungssystem gleich viele Gleichungen wie unbekannte Koeffizienten hat.

$$P_n(x_0) = a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = y_0$$

$$P_n(x_1) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = y_1$$

.

.

.

$$P_n(x_n) = a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = y_n$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} a_0 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ y_n \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{bmatrix}} \right\} \text{Vandermonde - Matrix = Schlechtkonditioniert. } \text{Abn} \geq 20 \text{ numerisch instabil}$$

#### Lagrange Interpolationsformel:

Lagrangeform von  $P_n(x)$ :

$$P(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x)y_i$$

LagrangePolynome =  $l_i(x)$ :

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

#### Stückweise Interpolation:

Interpolationspolynom erster Ordnung:  $n = 1$

Stützpunkte so wählen:  $x_{j-1}$  und  $x_{j+1}$ , somit 2 Werte:  $n = 1$

#### Grösse des Fehlers an Stelle $x$ wenn:

$y_i$  Funktionswerte (genügend oft stetig differenzierbare Funktion)

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{|(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)|}{(n+1)!}$$

Max der  $(n+1)$ -ten Ableitung der  $f(x)$  Intervall  $[x_0, x_n]$  kennen, Fehlerabschätzung nur dann möglich.

### 0.1.2 Spline-Interpolation

Bedingungen für  $S_i$ :

1.  $S_i(x_i) = y_i, S_{i+1}(x_{i+1}) = y_{i+1}, \dots$  Interpolation
2.  $S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1}), S_{i+1}(x_{i+2}) = S_{i+2}(x_{i+2}), \dots$  Stetiger Übergang

3.  $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1}), S'_{i+1}(x_{i+2}) = S'_{i+2}, \dots$  Keine Knicke
4.  $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1}), S''_{i+1}(x_{i+2}) = S''_{i+2}, \dots$  Gleiche Krümmung
5. Mindestens den Grad 3 ... Kubische Splines

3 Intervalle, 4 Stützpunkte:

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], [x_2, x_3]$$

**Ansatz:**

$$S_0 = a_0 + b_0(x - x_0) + c_0(x - x_0)^2 + d_0(x - x_0)^3, x \in [x_0, x_1]$$

$$S_1 = a_1 + b_1(x - x_1) + c_1(x - x_1)^2 + d_1(x - x_1)^3, x \in [x_1, x_2]$$

$$S_2 = a_2 + b_2(x - x_2) + c_2(x - x_2)^2 + d_2(x - x_2)^3, x \in [x_2, x_3]$$

$3 * 4 = 12$  Koeffizienten  $\implies$  12 Bedingungen

**1. Interpolation der Stützpunkte:**

$$1. S_0(x_0) = y_0$$

$$2. S_1(x_1) = y_1$$

$$3. S_2(x_2) = y_2$$

$$4. S_3(x_3) = y_3$$

**2. Stetiger Übergang an Stellen  $x_1$  und  $x_2$ :**

$$5. S_0(x_1) = S_1(x_1)$$

$$6. S_1(x_2) = S_2(x_2)$$

**3. Erste Ableitung an Übergangstellen übereinstimmen:**

$$7. S'_0(x_1) = S'_1(x_1)$$

$$8. S'_1(x_2) = S'_2(x_2)$$

**4. Zweite Ableitung an Übergangstellen übereinstimmen:**

$$9. S''_0(x_1) = S''_1(x_1)$$

$$10. S''_1(x_2) = S''_2(x_2)$$

$= 10 \text{ Bedingungen}$

Die weiteren 2 Bedingungen können frei gewählt werden.

Diese beziehen sich häufig auf Randstellen  $x_0$  und  $x_3$ .

**Beispiele:**

**Natürliche kubische Splinefunktion:**

Mit möglichen Wendepunkt im Anfangs und Endpunkt.

$$\left. \begin{array}{l} S'''_0(x_0) = 0 \\ S'''_2(x_3) = 0 \end{array} \right\}$$

**Periodische kubische Splinefunktion:**

Wenn man Periode  $p = x_3 - x_0$  hat und damit  $y_0$  bzw.  $S_0(x_0) = S_2(x_3)$  gilt

$$\left. \begin{array}{l} S'_0(x_0) = S'_2(x_3) \\ S''_0(x_0) = S''_2(x_3) \end{array} \right\}$$

**mit not-a-knot Bedingung kubische Splinefunktion:**

s.d. Auch dritte Ableitung in  $x_1, x_2$  noch stetig ist. ( $x_1, x_2$  keine echten Knoten)

$$\left. \begin{array}{l} S'''_0(x_1) = S'''_1(x_1) \\ S'''_1(x_2) = S'''_2(x_2) \end{array} \right\}$$

### Algorithmus: natürliche kubische Splinefunktion

$$S_i = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Koeffizienten  $a_i, b_i, c_i, d_i$  berechnen:

1.  $a_i = y_i$
2.  $h_i = x_{i+1} - x_i$
3.  $c_0 = 0, c_n = 0$  !!! (für periodisch( $s_1 = s_0$ ), für not a knot( $d_0 = d_1, d_{n-2} = d_{n-1}$ ))
4. Berechnung der Koeffizienten  $c_1, c_2, c_3, \dots, c_{n-1}$

- $i = 1$ :

$$2(h_0 + h_1) c_1 + h_1 c_2 = 3 \frac{y_2 - y_1}{h_1} - 3 \frac{y_1 - y_0}{h_0}$$

- falls  $n \geq 4$  dann für  $i = 2, \dots, n-2$

$$h_{i-1} c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i) c_i + h_i c_{i+1} = 3 \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - 3 \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}}$$

- $i = n - 1$ :

$$2(h_{n-2} + h_{n-1}) c_{n-2} + h_{n-1} c_{n-1} = 3 \frac{y_n - y_{n-1}}{h_{n-1}} - 3 \frac{y_{n-1} - y_{n-2}}{h_{n-2}}$$

$$5. b_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{3} (c_{i+1} + 2c_i)$$

$$6. d_i = \frac{1}{3h_i} (c_{i+1} - c_i)$$

Ergibt das Gleichungssystem  $A \cdot c = z$

- $A$  ist immer invertierbar
- Numerische Lsg. durch Gauss-Algorithmus
- System ist gut konditioniert
- Pivotsuche nicht erforderlich

$i = 0, \dots, n-1$

$$A = \begin{bmatrix} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{bmatrix} = z = \begin{bmatrix} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{bmatrix}$$

### 0.1.3 Lineare Ausgleichsprobleme

Ausgleichsgerade:  $f(x) = ax + b$ : gesucht:  $F = af_1 + bf_2 \mid a, b \in \mathbb{R}$  Basisfunktion:  $f_1(x) = x$  und  $f_2(x) = 1$

#### 1 Form Fehlerfunktional:

$$E(f)(a, b) := \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$$

minimal = partiellen Ableitung nach  $a, b$  müssen verschwinden

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n y_i \end{bmatrix}$$

Nach a,b auflösen

**Allgemeine Definition:**

Gegeben:

n-Wertepaare:  $(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$

Basisfunktionen:  $(f_1, \dots, f_m)[a, b]$

Ansatzfunktionen:  $f := \lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_m f_m$

Lineares Ausgleichproblem mit Fehlerfunktional:

$$E(f) = \|y - f(x)\|_2^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \sum_{j=1}^m \lambda_j * f_j * (x_i))^2 = \|y - A\lambda\|_2^2$$

Fehlergleichungssystem:  $A\lambda = y$

$$A = \begin{bmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \dots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \dots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_n) & f_2(x_n) & \dots & f_m(x_n) \end{bmatrix} * y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix}$$

Normalgleichungen:  $\frac{\partial E(f)(\lambda_1, \dots, \lambda_m)}{\partial \lambda_j}$

Normalgleichungssystem:  $A^T A \lambda = A^T y$

**Lösung:**  $\lambda$  beinhaltet gesuchte Parameter des linearen Ausgleichproblems

Verfahren am Besten mit QR-Zerlegung