Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Lista zadań nr 7. Tydzień rozpoczynający się 20. kwietnia

1. Wykazać, że dla rozkładu Cauchy'ego wartość oczekiwana nie istnieje.

$$f(x) = \frac{1}{\pi \cdot (1 + x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- 2. Zmienne losowe X_1, X_2, \dots, X_n są niezależne i mają ten sam rozkład. Dodatkowo, $\mathrm{E}(X_i) \neq 0$. Znaleźć wartość oczekiwaną zmiennej $Y_k = \frac{\sum_{j=1}^k X_j}{\sum_{i=1}^n X_i}$.
- 3. Załóżmy, że istnieje $E(X^2)$. Udowodnić, że istnieje też E(X).
- 4. Dystrybuanta zmiennej losowej X to $F_X(x) = 1 \frac{9}{x^2}$, dla $x \in [3, \infty)$. Znaleźć wartość oczekiwaną i wariancję tej zmiennej.
- 5. Dane są niezależne zmienne losowe X, Y o rozkładzie U[0,1]. Niech x, y będą wylosowanymi wartościami zmiennych X, Y. Odcinek [0,1] podzielony jest zatem na trzy części (być może jedna część ma długość 0). Jakie jest prawdopodobieństwo, że z tych trzech części można utworzyć trójkąt?

[Do zadań 6–7] Niech (X_1,X_2) będzie dwuwymiarową zmienną losową o gęstości $f(x_1,x_2)=C\cdot x^2y^2$, dla $0< x_1^2+x_2^2<1$.

- 6. Znaleźć wartość stałej C.
- 7. Znaleźć wartość oczekiwaną $E(X_1)$.
- 8. Zmienna (X_1, X_2) ma gęstość postaci $f(x_1, x_2) = \frac{1}{\pi}$, dla $0 < x_1^2 + x_2^2 < 1$. Niech $X_1 = Y_1 \cos Y_2$, $X_2 = Y_1 \sin Y_2$, gdzie $0 < Y_1 < 1$, $0 \le Y_2 \le 2\pi$. Znaleźć gęstość $g(y_1, y_2)$ zmiennej (Y_1, Y_2) . Sprawdzić czy zmienne Y_1, Y_2 są niezależne.
- 9. Dana jest *n*-wymiarowa zmienna losowa $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T$. Zmienną $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)^T$ określamy następująco:

$$Y_1 = \bar{\mathbf{X}}, \quad Y_k = X_k - \bar{\mathbf{X}} \quad \text{dla } k = 2, \dots, n.$$

Znaleźć wartość Jacobianu

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial x_2}{\partial y_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \frac{\partial x_n}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{vmatrix}.$$

[Do zadań 10–11] Boki prostokąta są niezależnymi zmiennymi losowymi X_1 i X_2 o rozkładzie U[1,2]. $Y_1=2X_1+2X_2\;$ jest obwodem tego prostokąta, $Y_2=X_1X_2\;$ oznacza pole tego prostokąta.

- 10. **E1** Znaleźć wartości oczekiwane i wariancje zmiennych Y_1, Y_2 . (Odp.: 6, 2 /3 dla $Y_1, ^9$ /4, 55 /144 dla Y_2).
- 11. **E1** Obliczyć wartość współczynnika korelacji ρ zmiennych Y_1, Y_2 . (Odp.: $3\sqrt{330}/55$).