


SYMMETRISCHE KRYPTOGRAPHIE



KURZSCHRIBWEISE:

$$K(N) = C$$

VERSCHLÜSSELUNG

$$K(C) = N$$

ENTSCHLÜSSELUNG

$$K(\underbrace{K(N)}_C) = N$$

BEI DER SYMMETRISCHEN KRYPTOGRAPHIE WIRD
ZUM VER- UND ENTSCHLÜSSELN DER SELBE
SCHLÜSSEL VERWENDET.

ASYMMETRISCHE KRYPTOGRAPHIE

SCHLÜSSELPAAR $K^{(1)}, K^{(2)}$

$$K^{(1)}(N) = C \quad \text{VERSCHÜSSELUNG}$$

$$K^{(2)}(C) = N \quad \text{ENTSCHÜSSELUNG}$$

$$K^{(2)}(N) = C$$

$$K^{(1)}(C) = N$$

$$K^{(2)}(K^{(1)}(N)) = N$$

$$K^{(1)}(K^{(2)}(N)) = N$$

$$K^{(2)}(K^{(2)}(N)) \neq N$$

$$K^{(1)}(K^{(1)}(N)) \neq N$$

WAS MIT $K^{(1)}$ VERSCHLÜSSELT WORDEN IST,
KANN NUR MIT $K^{(2)}$ WIEDER ENTSCHLÜSSELT
WERDEN.

WAS MIT $K^{(2)}$ VERSCHLÜSSELT WORDEN IST,
KANN NUR MIT $K^{(1)}$ WIEDER ENTSCHLÜSSELT
WERDEN.