



Comenzado el

lunes, 10 de noviembre de 2025, 21:51

Estado

Finalizado

Finalizado en

lunes, 10 de noviembre de 2025, 22:01

Tiempo empleado

9 minutos 33 segundos

Puntos

5,00/5,00

Calificación

10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre los modelos ARIMA?

- ☐ a. El término "I" se agrega cuando no se quiere diferenciar la serie de tiempo.
- ☐ b. El modelo ARIMA (p, d, q) solo es aplicable a series temporales con tendencia.
- ☐ c. Un modelo ARIMA(p,d,q) es estacionario por definición.
- ☒ d. El término "I" en ARIMA indica que el modelo incluye diferenciación para hacer la serie estacionaria. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El término "I" en ARIMA indica que el modelo incluye diferenciación para hacer la serie estacionaria.

Pregunta 2

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La diferencia entre la ACF y la PACF para s rezagos es:

- ☐ a. Que la primera aísla el efecto en la autocorrelación de los rezagos intermedios entre el periodo t y el $t+s$ y la segunda no.
- ☐ b. Que la primera se calcula únicamente para los modelos ARMA y la segunda para los ARIMA
- ☐ c. Que la primera se calcula únicamente para los modelos AR y la segunda para los MA
- ☒ d. Que la segunda aísla el efecto en la autocorrelación de los rezagos intermedios entre el periodo t y el $t+s$ y la primera no. ✓
- ☐ e. Que la primera se calcula únicamente para los modelos MA y la segunda para los AR

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Que la segunda aísla el efecto en la autocorrelación de los rezagos intermedios entre el periodo t y el $t+s$ y la primera no.

Pregunta 3

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para que un modelo $MA(q)$ sea invertible, las raíces del polinomio característico deben:

- ☒ a. Estar fuera del círculo unitario. ✓
- ☐ b. Ser iguales a cero.
- ☐ c. Ser todas reales y negativas.
- ☐ d. Ser todas positivas y mayores que 1.
- ☐ e. Ser menores a 1 en valor absoluto.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Estar fuera del círculo unitario.

Pregunta 4

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal diferencia entre los modelos ARMA (p, q) y ARIMA (p, d, q)?

- ☐ a. El modelo ARIMA incluye términos estacionales mientras que el modelo ARMA no.
- ☐ b. El modelo ARIMA es una versión simplificada del modelo ARMA.
- ☐ c. El modelo ARMA se utiliza solo para series temporales con tendencia, mientras que el modelo ARIMA se utiliza para series sin tendencia.
- ☒ d. El modelo ARIMA puede manejar series con tendencia a través de la diferenciación, mientras que el modelo ARMA se aplica principalmente a series estacionarias. ✓
- ☐ e. El modelo ARMA incorpora tanto componentes autorregresivos como de media móvil, mientras que el modelo ARIMA solo incluye componentes de media móvil.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El modelo ARIMA puede manejar series con tendencia a través de la diferenciación, mientras que el modelo ARMA se aplica principalmente a series estacionarias.

Pregunta 5

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre un modelo AR(p) se puede afirmar:

- ☐ a. Siempre se puede convertir en un modelo MA
- ☒ b. En algunas ocasiones puede ser estacionario y en otras no ✓
- ☐ c. Siempre será estacionario
- ☐ d. Siempre tiene una tendencia
- ☐ e. Siempre tendrá estacionalidad

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

En algunas ocasiones puede ser estacionario y en otras no

[Finalizar revisión](#)