

Observações:

1. Leia toda a questão antes de responder;
2. Use caneta esferográfica azul ou preta;
3. Rasura e uso de corretivo anulam a questão;

4. Resposta a lápis perde o direito de revisão;
Sigla NRA (Nenhuma das Respostas Anteriores)

Questão 1: Quando é necessário se desenvolver vias aéreas ao paciente com obstrução da mesma, o procedimento de emergência é a cricotiretomia. Nesse, qual estrutura é incisida?

- a) Cartilagem tireoide
- b) Cartilagem cricóide
- c) Membrana cricotireoide
- d) Membrana tireo-hioide
- e) Cartilagem traqueal

Questão 2: A ATM está inserida em uma região de complexa anatomia. Abaixo estão listados alguns dos limites anatômicos da ATM, assinale a alternativa incorreta?

- a) Lateral – pele, nervo facial, artéria transversa da face
- b) Medial – maxila e nervo infra orbitário
- c) Anterior – músculo pterigóideo lateral
- d) Superior – fossa média do crânio

Questão 3: Qual o trajeto do dueto-parotídeo?

- a) Passa sobre o músculo bucinador e na porção anterior dele penetra no masseter tendo sua abertura perto do primeiro molar inferior.
- b) Passa sobre o músculo pterigoide medial e na porção anterior dele penetra no bucinador tendo sua abertura perto do canino superior.
- c) Passa sobre o músculo masseter e na porção anterior dele penetra no bucinador tendo sua abertura perto do primeiro molar superior.
- d) Passa sobre o músculo Milo hioide tendo sua abertura abaixo da língua perto dos incisivos inferiores.
- e) Passa sobre o músculo digástrico tendo sua abertura abaixo da língua perto dos caninos inferiores.

Questão 4: O movimento de adução do bulbo do olho é realizado por qual músculo sendo inervado por qual erro?

- a) Reto medial e abducante
- b) Reto inferior e troclear
- c) Reto medial e oculomotor
- d) Reto lateral e abducente
- e) Oblíquo superior e troclear

Questão 5: Os nervos motores puros são os que movimentam os músculos dentre eles dos olhos e da língua por exemplo, os sensitivos (puros) destinam-se aos órgão dos sentidos e por isso são

chamados sensoriais e ainda existem os mistos que são motores e sensitivos. São exemplos de nervos mistos.

- a) Facial, trigêmeo e vago
- b) Acessório, vago e vestibulococlear
- c) Olfatório, abducente e glossofaríngeo
- d) Hipoglosso, trigêmeo e facial
- e) Troclear, óptico e facial.

Questão 6: A inervação sensitiva da face é realizada pelo trigêmeo através de seus ramos que emergem na face são ramos do oftálmico, maxilar e mandibular respectivamente:

- a) Auriculotemporal, nasal e infraorbital
- b) Troclear, infraorbital e alveolar inferior
- c) Supraorbital, bucal e infratroclear
- d) Supratroclear, zigomaticomaxilar e mentual
- e) Ciliar, alveolar superior anterior e labial inferior

Questão 7: Na região do hilo hepático, existe uma pequena estrutura, parte de um lóbulo hepático, que separa duas vias importantes. Qual o nome dessa estrutura?

- a) Ligamento redondo do fígado
- b) Lóbulo quadrado
- c) Processo caudado
- d) Fissura do ligamento venoso

Questão 8: O apêndice ileocecal é vascularizado pela artéria apendicular que é ramo da artéria íleo cólica. Qual é a origem da artéria íleo-cólica?

- a) Mesentérica superior
- b) Mesentérica inferior
- c) Artéria cólica esquerda
- d) Artéria cólica esquerda
- e) Artéria cólica direita

Questão 9: Nome do tecido fibroso, firme e espesso que envolve os corpos cavernosos do pênis?

- a) Dartos
- b) Albugínea
- c) Túnica espermática
- d) Bulbo cavernoso

Questão 10: Quanto ao relacionamento topográfico pancreático e incorreto afirmar:

- a) Cabeça pancreática _____ papila duodenal
- b) Colo pancreático _____ vasos mesentéricos
- c) Cauda pancreática _____ baço
- d) Corpo pancreático _____ vesícula biliar

Questão 11: Assinale a alternativa correta sobre a trompa de falópio?

- a) Situa-se anteriormente em relação ao ligamento redondo
- b) Emerge bilateralmente corpo uterino
- c) A artéria ovariana acompanha todo o seu trajeto
- d) O seu istmo está em contato com o ligamento útero sacro.

Questão 12: Assinale a alternativa verdadeira a respeito do intestino delgado?

- a) O jejum é mais comprido do que o íleo
- b) O íleo é mais vascularizado
- c) No íleo terminal existe rica concentração de pregas mucosas
- d) O jejum é mais espesso.

Questão 13: Assinale a alternativa verdadeira a respeito da vesícula biliar.

- a) O ducto cístico se anastomosa no dueto hepático direito
- b) A artéria cística é ramo da artéria hepática direita
- c) A inervação da vesícula biliar é exclusiva do nervo vago
- d) O esfíncter caledoniano está na junção colédoco cístico

Questão 14: A camada muscular intrínseca do DORSO com suas fibras oblíquas curtas, triangulares e mais espessas na região lombar, localizadas próximo as articulações, são altamente adequadas à manutenção direta da estabilidade segmentar estrutural e movimentos exclusivos da coluna vertebral. Estendem-se do SACRO podendo chegar até a região cervical. Por outro lado, a camada externa contém principalmente os músculos longos superficiais, multiarticulares. O texto acima sublinhado refere-se a:

- a) Músculo Longuíssimo
- b) Músculo Rotador Maior
- c) Músculo Semiespinal
- d) Músculo Multifídeo

Questão 15: As curvaturas da coluna vertebral proporcionam flexibilidade adicional (resiliência com absorção de choque). A lordose cervical torna-se bem evidente quando um lactente começa a levantar (estender) a cabeça de choque). A lordose lombar torna-se aparente quando crianças de 1 a 2 anos começam a assumir a postura vertical, ficar de pé e caminhar o componente anatômico que define a lordose nas curvaturas secundárias é?

- a) Corpo Vertebral
- b) Ligamento Amarelo
- c) Músculo Ereter da Espinha
- d) Disco Intervertebral

Questão 16: A estrutura anatômica encontrada na porção distal do interstício muscular psoas maior e ilíaco na região da parede abdominal posterior é:

- a) Ureter
- b) Baço
- c) Píloro
- d) Colo Descendente

Questão 17: As relações anatômicas da face anterior do rim esquerdo é exceto?

- a) Cauda do Pâncreas
- b) Baço
- c) Píloro
- d) Colo descendente

Questão 18: No interior do seio renal encontra-se, exceto?

- a) Cálice Maior
- b) Papila Renal
- c) Pelve Renal
- d) Artéria Renal

Questão 19: Durante a avaliação clínica do membro inferior o paciente não apresentou pulsação arterial no dorso do pé. Dentre as alternativas abaixo marque a opção em que o comprometimento vascular não interfere na pulsação da artéria dorsal do pé.

- a) Artéria Tibial Posterior
- b) Artéria Poplítea
- c) Artéria Tibial Anterior
- d) Artéria Femoral

Questão 20: A posição da artéria na fossa poplítea e no trígono femoral respectivamente é?

- a) Medial e Lateral
- b) Intermedia e Lateral
- c) Medial e Intermedia
- d) Lateral e Intermedia

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO ANATOMIA VASCULAR

1. O Seio coronário drena:
☐ no átrio esquerdo
☐ no ventrículo direito
☐ no átrio direito
2. Três vasos se originam no arco da aorta:
☐ tronco braquiocefálico direito, artéria, carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda
☐ tronco braquiocefálico , artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda
☐ tronco braquiocefálico comum, artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita
3. A artéria vertebral tem origem na:
☐ artéria carótida comum
☐ Artéria subclávia
☐ Artéria aorta
4. São limites da artéria axilar:
☐ margem inferior da primeira costela e margem superior do músculo redondo maior
☐ margem lateral da primeira costela e margem inferior do músculo redondo menor
☐ Margem lateral da primeira costela e margem inferior do músculo redondo maior
5. São limites da artéria braquial:
☐ margem inferior do redondo menor e fossa cubital
☐ margem inferior de redondo maior e fossa cubital
☐ margem inferior do peitoral menor e flexura cubital
6. São ramos da artéria braquial profunda:
☐ colateral radial e colateral ulnar
☐ colateral radial e colateral média
☐ colateral média e colateral ulnar
7. As artérias interósseas anteriores posteriores são ramos da:
☐ artéria radial
☐ artéria braquial
☐ artéria ulnar
8. O sulco Deltopeitoral é preenchido pela veia:
☐ veia deltopeitoral
☐ veia cefálica
☐ veia basílica
9. O arco palmar superficial é formado por:
☐ continuação da artéria radial e ramo superficial da artéria ulnar
☐ ramo terminal da artéria radial e ramo profundo da artéria ulnar

- ☐ ramo palmar superficial da artéria radial e continuação da artéria ulnar
10. A perfusão arterial da mão quanto a contribuição radial e ulnar é avaliada pela tese de:
- ☐ Adsom
 - ☐ Phallem
 - ☐ Allen
11. A artéria circunflexa do úmero tem origem na:
- ☐ primeira porção da artéria axilar
 - ☐ segunda porção da artéria axilar
 - ☐ terceira porção da artéria axilar
12. São artérias originárias da íliaca interna:
- ☐ obturatória, glútea inferior, circunflexa superficial do ílio e vesical
 - ☐ pudenda interna, glútea superior, uterina, vesical, obturaria
 - ☐ pudenda externa, glútea inferior, vesical, obturatória
13. As artérias circunflexa lateral e medial da coxa são ramos da:
- ☐ artéria femoral
 - ☐ artéria femoral profunda
 - ☐ artéria femoral descendente
14. São ramos da artéria circunflexa lateral
- ☐ superior, médio e inferior
 - ☐ ascendente, transverso e descendente
 - ☐ direito, esquerdo e mediano
15. A artéria tibial posterior é acompanhada no seu trajeto descendente por:
- ☐ um nervo tibial posterior e duas veia tibiais
 - ☐ um nervo tibial e duas veias tibiais posteriores
 - ☐ um nervo tibial posterior e uma veia tibial posterior
16. Limite inferior da artéria femoral e início da artéria poplítea:
- ☐ hiato do adutor longo
 - ☐ hiato do adutor magno
 - ☐ hiato do adutor curto
17. Fratura da cabeça da fíbula com desvio é passível de lesão da:
- ☐ artéria fibular
 - ☐ artéria tibial anterior
 - ☐ artéria tibial posterior
18. As artérias metatarsais dorsais são originárias da:
- ☐ artéria dorsal do pé
 - ☐ artéria plantar profunda
 - ☐ artéria arqueada
19. Ducto arterioso é uma comunicação entre
- ☐ tronco pulmonar e aorta

- ☐ aorta e artéria pulmonar
 - ☐ veia pulmonar e cava superior
20. O forame oval comunica no feto:
- ☐ átrio esquerdo e ventrículo esquerdo
 - ☐ átrio esquerdo e átrio direito
 - ☐ átrio direito e ventrículo direito
21. O ligamento redondo do fígado é um remanescente do (a):
- ☐ artéria umbilical
 - ☐ ducto venoso
 - ☐ veia umbilical
22. A artéria cística é ramo da:
- ☐ artéria hepática comum
 - ☐ artéria hepática direita
 - ☐ artéria de colédoco
23. A artéria apendicular é ramo da:
- ☐ cecal posterior
 - ☐ cecal anterior
 - ☐ cólica direita
 - ☒ ileocolóco
24. A artéria ovariana (ovárica) é ramo da:
- ☐ aorta
 - ☐ uterina
 - ☐ ilíaca interna
25. A próstata é irrigada pelas artérias:
- ☐ vesical inferior e retal média
 - ☐ vesical inferior e retal superior
 - ☐ vesical superior e retal média
26. O tronco celíaco possui as seguintes divisões:
- ☐ hepática esquerda, gástrica comum e esplênica
 - ☐ hepática comum, gástrica esquerda e esplênica
 - ☐ hepática comum, gástrica esquerda e pancreática
27. Marque verdadeiro ou falso. A veia renal esquerda normalmente é:
- ☐ anterior a aorta
 - ☐ menor que a renal direita
 - ☐ anterior a artéria mesentérica superior
28. A veia porta é formada pela união das veias:
- ☐ esplênica e hepática comum
 - ☐ mesentéricas superior e gástrica esquerda
 - ☐ mesentérica superior e esplênica

29. Quanto a veia safena magna
- ☐ possui trajeto ascendente lateral e drena na veia poplítea
 - ☐ possui trajeto ascendente medial e drena na veia poplítea
 - ☐ possui trajeto ascendente medial e drena na veia poplítea
30. Quanto a veia ázigo
- ☐ localizada no lado lateral e drena na cava superior
 - ☐ localizada no lado medial drena na cava inferior
 - ☐ localizada no lado medial e drena na cava superior
31. A artéria umbilical é:
- ☐ ramo da íliaca comum
 - ☐ ramo da íliaca interna
 - ☐ ramo da íliaca externa
32. As veias hepáticas drenam para
- ☐ veia porta
 - ☐ veia cava inferior
 - ☐ veia esplênica
33. A veia axilar é formada pela união das veias:
- ☐ braquial e cefálica
 - ☐ braquial e basílica
 - ☐ cefálica e basílica
34. As artérias intercostais
- ☐ percorrem a margem inferior do arco costal
 - ☐ percorrem a margem superior do arco costal
 - ☐ percorrem a margem interna do arco costal
35. O bloqueio anestésico do nervo femoral pode ser feito
- ☐ inferiormente ao ponto de pulsação da artéria femoral
 - ☐ lateralmente ao ponto de pulsação da artéria femoral
 - ☐ medialmente ao ponto de pulsação da artéria femoral
36. As artérias testiculares (ovarianas) direita e esquerda nascem
- ☐ direita na aorta e esquerda na renal esquerda
 - ☐ direita e esquerda na aorta
 - ☐ direita na artéria renal direita e esquerda na artéria renal esquerda.
37. Marque Verdadeiro ou Falso para os itens abaixo:
- ☐ a veia testicular direita drena na cava inferior
 - ☐ a veia ovariana esquerda drena na veia renal esquerda
 - ☐ a veia supra renal esquerda drena na veia renal esquerda
 - ☐ a veia supra renal direita drena na veia cava inferior
 - ☐ a veia esquerda drena na veia renal esquerda

QUESTIONÁRIO

1. Qual detalhe anatômico está localizado no osso temporal?
 - a) linha temporal superior
 - b) forame redondo
 - c) meato acústico externo
 - d) lâmina cribiforme
 - e) lâmina orbital
2. A área localizada imediatamente posterior ao dente superior mais distal é denominada.
 - a) triângulo retromolar
 - b) processo retro-articular
 - c) Lâmina cribiforme
 - d) Túber da maxila
 - e) Hámulo pterigóideo
3. Além do osso zigomático, qual dos ossos a seguir apresenta um processo que contribui para a formação do arco zigomático?
 - a) Osso temporal
 - b) Maxila
 - c) Osso esfenóide
 - d) Osso palatino
4. Qual o nome da articulação entre os ossos parietal e occipital?
 - a) Sutura coronal
 - b) Sutura escamosa
 - c) Sutura sagital
 - d) Sutura lambdóide
5. Qual das estruturas a seguir constitui uma articulação?
 - a) Côndilo occipitais e atlas
 - b) Côndilo occipitais e axis
 - c) Fossa-mandibular e crista temporal
 - d) Fossa mandibular e processo coronóide
6. Qual dos detalhes a seguir se localiza na face lateral da mandíbula?
 - a) Língua
 - b) Fóvea submandibular
 - c) Linha oblíqua
 - d) Forame da mandíbula
7. O ápice da órbita está formado pela asa menor do esfenóide e:
 - a) O osso etmoide
 - b) O osso frontal
 - c) A maxila
 - d) O osso palatino

- e) O osso lacrimal
8. Qual estrutura anatômica é formada pelas maxilas?
- a) Espinha geniana
 - b) Sutura palatina mediana
 - c) Trígono retromolar
 - d) Hámulo pterigoideo
 - e) Fissura orbital inferior
9. Qual estrutura está situada na fossa infra temporal?
- a) Músculo masseter
 - b) Gânglio pterigopalatino
 - c) Artéria alveolar superior posterior
 - d) Nervo maxilar
10. A saliência curva anteriormente e medial à borda anterior do ramo da mandíbula que se destaca do processo coronóide é denominada:
- a) Incisura da mandíbula
 - b) Crista temporal
 - c) Fossa temporal
 - d) Fossa infratemporal
11. Qual detalhe a seguir serve como referência para se localizar o osso hióide?
- a) O nível da primeira vértebra cervical
 - b) A região superior e anterior à cartilagem tireóidea
 - c) A articulação com as cartilagens da laringe
 - d) A proeminência laríngea (“pomo de Adão”), posterior e inferiormente situada
12. Que estrutura forma o soalho do seio maxilar?
- a) O processo alveolar da maxila
 - b) A face anterior da maxila
 - c) A face infratemporal da maxila
 - d) A parede lateral da cavidade nasal
13. Qual processo está situado inferior e medialmente ao meato acústico externo?
- a) Processo pterigoide
 - b) Processo estiloide
 - c) Processo mastoide
 - d) Hámulo pterigóide
14. Os espaços entre as conchas nasais na parede lateral da cavidade nasal são denominados:
- a) Óstios
 - b) Ductos
 - c) Meatos
 - d)
15. Qual dos osso e seus respectivos processos a seguir formam o palato ósseo?

- b. Processo maxilares das maxilas e lâminas horizontais dos ossos palatinos
- c. Processos palatinos das maxilas e lâminas maxilares dos ossos palatinos
- d. Lâminas horizontais dos ossos palatinos e processos palatino das maxilas
- e. Lâmina maxilares dos ossos palatinos e processos horizontais das maxilas

16. Qual par de nervo craniano está relacionado ao forame estilomastóideo.

- a) Quinto par
- b) Sétimo par
- c) Nono par
- d) Décimo par
- e) Décimo primeiro par

17. Qual dos ossos do crânio a seguir é um osso par?

- a) Esfenoide
- b) Etmoide
- c) Occipital
- d) Vômer
- e) Parietal

18. Qual lâmina é perfurada para permitir a passagem dos filetes do nervo olfatório?

- a) Lâmina medial do osso etnóide
- b) Lâmina lateral do osso esfenoide
- c) Lâmina perpendicular do osso estnóide
- d) Lâmina cribiforme do osso etnóide

19. Qual dos osso a seguir é considerado como pertencente ao crânio?

- a) Vômer
- b) Maxila
- c) Esfenoide
- d) Zigomático
- e) Mandíbula

20. Em qual parte do osso temporal está localizada a articulação temporomandibular?

- a) Parte escamosa
- b) Parte timpânica
- c) Parte petrosa
- d) Parte mastoidea

21. Qual é o osso ímpar localizado n alinha mediana do crânio?

- a) Temporal
- b) Zigomático
- c) Esfenoide
- d) Conc inferior

22. Qual das alternativas apresenta uma abertura óssea curta e geralmente de contorno oval ou arredondado?

- a) Fossa
- b) Forame
- c) Fissura
- d) Perfuração

23. Qual dos ossos a seguir participa da formação do forame jugular juntamente com a incisura jugular do osso temporal?
- a) Occipital
 - b) **Procuberância** mental
 - c) Parcial
 - d) Esfenoide
24. Qual das estruturas a seguir é uma leve ranhura determinada pela fusão das metades direita e esquerda da mandíbula?
- a) Linha milo-hióidea
 - b) Protuberância mental
 - c) Sínfese da mandíbula
 - d) Linha oblíquo externa

Marque V para verdadeiras e F para Falsas. Justifique as falsas (Questões 1-7):

1. () As vértebras TXI e TXII articulam-se posteriormente com as cabeças de suas próprias costelas, porém, não possuem fôveas costais nos processos transversos e tem somente uma fôvea costal completa em cada lado de seus corpos.

2. () Os vasos que irrigam a parte torácica consistem principalmente artérias intercostais posteriores (se originam de aorta) e anteriores (se originam das artérias torácicas internas, por sua vez, originam-se do tronco costovervical).

3. () Cada pulmão tem uma forma piramidal, apresentando três faces: mediastinal, costal e diafragmática; e **quatro** margens: apical, anterior, posterior e inferior (diafragmática).

4. () A traquéia é um tubo inflexível, formada por cartilagens em forma de “C” que se estende da parte inferior do pescoço até o nível vertebral T4/T5, onde se bifurca em brônquios principais direito e esquerdo. Cada brônquio principal entra no hilo para o interior do respectivo pulmão. O brônquio principal direito é mais largo e assume um trajeto mais vertical através da raiz e do hilo do que o brônquio principal esquerdo.

5. () Os pulmões se localizam num espaço potencial entre as pleuras denominado cavidade pleural. Assim, a superfície do pulmão é coberta por pleura visceral, enquanto a parede torácica interna é revestida pela pleura parietal que consiste em 4 partes (parte costal, mediastinal, diafragmática e cúpula pleural).

6. () Os rins com sua forma de grão de feijão estão localizados em posição retroperitorical na parede posterior do abdome. Na face posterior o rim esquerdo está relacionado com alguns músculos como o diafragma, psoas maior, quadrado lombar e

transverso do abdome. Porém, o rim direito, posteriormente não se relaciona com o diafragma.

7. () durante a respiração, as dimensões do tórax sofrem alterações. Os movimentos de alça de balde e braço de bomba alteram os diâmetros látero-lateral e antero-posterior da caixa torácica. Enquanto a elevação e depressão do diafragma alteram significativamente as dimensões verticais do tórax. A depressão das cúpulas resulta quando as fibras musculares do diafragma se contraem e ocorre elevação das cúpulas quando o diafragma relaxa.

Questões 8, 9 e 10 (Marcar X)

8. Das estruturas abaixo, qual cruza a linha mediana anteriormente a aorta abdominal e posteriormente a artéria mesentérica superior, podendo ser comprimida por um aneurisma em qualquer destes dois vasos?

- a) Veia renal direita
- b) Artéria renal direita
- c) Veia renal esquerda
- d) Artéria renal esquerda

9. Assinale a alternativa que mostra a estrutura não faz a irrigação e/ou não envia ramos que irrigam a caixa torácica.

- a) Aorta torácica
- b) Artéria intercostal posterior
- c) Tronco costocervical
- d) Veia intercostal posterior

10. Assinale as alternativas:

- I. A uretra masculina é mais longa e possui 2 curvaturas durante a ereção peniana.
- II. Após a junção ureter pélvica os ureteres tem um trajeto descendente e retroperitoncal, até entrar na cavidade pélvica e continuar sua jornada até a bexiga urinária.
- III. Durante o trajeto do ureter, há 3 pontos de estreitamento que são chamados de pontos de constrição.
- IV. A porção superior do uruter é vascularizada por ramos da artéria renal.

Marque a opção correta:

- a) () apenas I está correta
- b) () apenas I e II estão incorretas
- c) () apenas I, II e IV estão incorretas
- d) () Todas estão incorretas

“Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança”.

Nas dez questões abaixo, favor assinalar a alternativa incorreta:

1)

- a) O pâncreas é um órgão totalmente retro peritoneal
- b) O pâncreas está dividido em cabeça, colo, corpo e cauda
- c) O duodeno é um órgão totalmente retro peritoneal
- d) A flexura duodeno inicia-se logo após o esfíncter pilórico

2)

- a) A papila maior do duodeno encontra-se na 1ª porção duodenal
- b) O duodeno possui pregas circulares e paralelas
- c) O duodeno inicia-se logo após o esfíncter pilórico
- d) O duodeno termina quando se inicia o mesentério do intestino delgado.

3)

- a) Pósterio inferiormente ao ligamento coronário do fígado encontramos a “zona nua”
- b) A cápsula de Glisson não faz parte do peritônio visceral
- c) O fígado possui 4 lobos anatômicos
- d) O ligamento falciforme divide o lobo direito do esquerdo.

4)

- a) A veia cava inferior ocupa uma fossa na parte esquerda da área nua do fígado
- b) A face visceral do fígado relaciona-se com a flexura cólica esquerda
- c) A cauda do lobo caudado separa a veia porta da veia cava inferior
- d) A vesícula biliar situa-se no lobo quadrado.

5)

- a) O suprimento sanguíneo do fígado é duplo: 30% pela artéria hepática, 70% pela veia porta
- b) Os linfonodos da área desnuda do fígado penetram no ducto torácico
- c) O fígado recebe uma importante inervação vagal
- d) No colo da vesícula biliar encontramos a saída do ducto cístico.

6)

- a) O ducto cístico possui a sua luz lisa e retificada para escoar facilmente a bile
- b) O colédoco possui uma porção retro duodenal
- c) O ducto cístico possui 2 a 4 cm de comprimento
- d) A artéria cística geralmente é ramo da artéria hepática direita.

7)

- a) O ducto colédoco possui de 8 a 10 cm de comprimento
- b) O esfíncter coledocociano controla a passagem de bile para o duodeno
- c) O ducto colédoco junta-se com o ducto pancreático para formar a ampola hepática pancreática
- d) O lobo funcional direito irá formar o ducto colédoco direito

8)

- a) O jejuno possui + ou – 2,5m de comprimento
- b) O mesentérico do intestino delgado termina a nível da segunda vértebra lombar
- c) O ângulo hepático é mais caudal que o ângulo esplênico
- d) O jejum é mais espessa do que o íleo.

9)

- a) O intestino delgado é vascularizado somente pela mesentérica superior
- b) A veia porta é formada pela mesentérica superior + esplênica + gástrica esquerda
- c) São características do intestino grosso Haustros tênias, apêndices eplipoteos
- d) O apêndice ileocecal é também considerado apêndice epiplóico.

10)

- a) O ceco não é suprido pela artéria íleo cólica
- b) O apêndice íleo cecal é suprido pela artéria apendicular
- c) O apêndice possui um mesmo cuja forma é triangular
- d) O colo sigmoide possui um mesentérico.

1) A cavidade de uma articulação sinovial pode ser examinada, inserindo-se uma cânula e um pequeno telescópio (artroscópio) no seu interior. Este procedimento cirúrgico (artroscopia) permite o cirurgião ortopédico examinar articulações em busca de anormalidades. Com base no texto acima e nos conhecimentos anatômicos a exploração da cavidade articular do ombro permite a visualização das seguintes estruturas anatômicas, exceto:

- a) Cabeça umeral
- b) Bolsa subdeltóidea
- c) Cartilagem articular
- d) Cavidade glenoidal
- e) Membrana sinovial

2) A eletromiografia (EMG), o estímulo elétrico dos músculos é um método de testar a ação dos músculos. O examinador coloca os eletrodos de superfície sobre um músculo e pede a pessoa para realizar certos movimentos. De acordo com o texto acima durante a realização do movimento ocorre distintos tipos de contrações musculares, exceto.

- a) Excêntrica
- b) Isométrica
- c) Concêntrica
- d) Isotônica

3) As fraturas por avulsão do tubérculo maior do úmero são relativamente comuns, especialmente em pessoas de meia-idade e idosas. Normalmente resultam de uma queda sobre a extremidade do ombro – o acrômio. Os tendões afetados pela avulsão do tubérculo maior no úmero correspondem aos músculos, exceto:

- a) Musc supraespinal
- b) Musc Redondo Menor
- c) Musc Subescapular
- d) Musc Infraespinal

4) O coração ligeiramente maior que um punho cerrado, é uma bomba muscular dupla e auto-reguladora, cujas partes trabalham em harmonia para impedir o sangue para todas as partes do corpo. Todas as alternativas estão incorretas, exceto?

- a) () Na face diafragmática do coração encontra-se a maior porção do ventrículo esquerdo, a aurícula esquerda e o ápice do coração formado pelo ventrículo direito.
- b) () A base do coração é formada pelo átrio esquerdo e uma pequena parte do átrio direito e veias cavas inferior e superior e aurícula direita.
- c) () O miocárdio do átrio direito é mais espesso que o miocárdio do átrio esquerdo
- d) () O seio coronário desemboca no átrio direito e drena o sangue proveniente do epicárdio e miocárdio.

5) Usando um mediastinoscópio, cirurgiões podem ver muito do mediastino e conduzir procedimentos cirúrgicos menores. Eles inserem este instrumento iluminado tubular através de uma pequena incisão na raiz do pescoço, imediatamente acima do manúbrio do esterno e próximo da incisura jugular. Durante a mediastinais para determinar se células cancerígenas disseminaram-se por metástase para linfonodos a partir de um carcinoma broncogênico, por

exemplo. O mediastino também pode ser explorado e biópsias obtidas removendo-se parte de uma cartilagem costal. Com relação ao mediastino assinale a afirmativa correta:

- a) Em indivíduos posicionados de pé o arco da aorta é seccionado transversalmente pelo plano transversal do tórax que corta o ângulo do esterno anteriormente e o disco intervertebral das vértebras T4 e T5 posteriormente.
 - b) O mediastino médio contém o coração e os grandes vasos e limitado pelo plano transversal do tórax que corta o ângulo transversalmente abaixo do ângulo do esterno e o disco intervertebral das vértebras T5 e T6.
 - c) O esôfago passa verticalmente pelo mediastino médio imediatamente posterior a base do coração formada pelo átrio direito.
 - d) A valva atrioventricular direita ou mitral é auscultada no mediastino posterior situado anterior a coluna torácica e imediatamente posterior a base cardíaca.
- 6) Todas as alternativas estão corretas, exceto?
- a) O seio coronário é a principal veia do coração, ela recebe as veias cardíacas para, magna e média e desemboca no átrio esquerdo.
 - b) Os primeiros ramos da artéria aorta são as artérias coronárias direita e esquerda que se distribuem pela superfície cardíaca e anastomosam-se no ápice cardíaco através das artérias interventriculares anterior e posterior.
 - c) No sulco coronário direito a artéria coronária direita bifurca-se em artéria circunflexa e marginal direita e continua seu trajeto na face posterior do coração como artéria interventricular posterior.
 - d) O ápice do coração é formado pelo ventrículo esquerdo, situa-se posterior ao 5º espaço intercostal esquerdo nos adultos, local onde ocorre a pulsação máxima do coração “batimento apical”.
- 7) Na luxação do ombro onde mais 25% de lesão óssea da cavidade glenoidal estão indicadas intervenções abertas com transferência e fixação de enxertos ósseos, classificamente do processo coracoide (eminência óssea da escápula). No processo coracoide da escápula estão inseridos os músculos:
- a) Musc. Coracobraquial e Musc braquial
 - b) Musc. Bíceps braquial porção curta e Musc. Peitoral Maior
 - c) Musc. Coracobraquial e Musc Deltoide
 - d) Musc. Peitoral menor e Musc bíceps braquial porção curta
- 8) Por causa da proeminência e acessibilidade das veias superficiais do membro superior, elas são comumente usadas para retirar sangue ou injetar uma solução. Estas veias podem estar engastadas no tecido subcutânea (gordura), ficando difícil vê-las; contudo, aplicando-se um torniquete no braço, o retorno venoso é obstruído e as veias dilatam-se e normalmente são visíveis ou palpáveis. As veias superficiais citadas abaixo são inutilizadas na venopunção, exceto:
- a) Veia intermédia do cotovelo
 - b) Veia braquial
 - c) Veia basílica
 - d) Veia cefálica
- 9) Os músculos retos do abdome tem como as suas origens as regiões dos rebordos costais. Cite qual dos elementos anatômicos mencionados não faz parte desta afirmação:
- a) Processo xifoide

- b) 5ª costela
 - c) 7ª costela
 - d) 8ª costela
- 10) Dos músculos citados; qual deles não se insere na linha Alba:
- a) Reto do abdome
 - b) Transverso
 - c) Oblíquo interno
 - d) Oblíquo externo
- 11) A parede interna do estômago é rídea em pregas exceto na região do:
- a) Antro
 - b) Fundo
 - c) Corpo anterior
 - d) Corpo posterior
- 12) Na borda livre do pequeno intestino, logo abaixo do ligamento hepatoduodenal, possui um orifício que comunica:
- a) A retro cavidade dos momentos com a cavidade peritoneal
 - b) O espaço subfrenico direito com a cavidade abdominal
 - c) O tronco celíaco com fundo gástrico
 - d) Não existe o tal orifício
- 13) A face esplênica Antero interna não se relaciona
- a) Com o estômago
 - b) Com o diafragma
 - c) Com o cólon
 - d) Com o hilo esplênico parte anterior
- 14) Cite o nome dos vasos sanguíneos que comunicam o fundo gástrico com o baço:
- a) Vasos esplênciso
 - b) Vasos tortuosos
 - c) Vasos curtos
 - d) Vasos compridos
- 15) Qual a drenagem venosa do esôfago abdominal que está relacionada a hemorragia digestiva alta nas doenças que cursa com hipertensão portal?
- a) Veia tireoidiana
 - b) Veia esofagiana media
 - c) Veia frênica
 - d) Veia gástrica esquerda
- 16) O revestimento esofágico é realizado por qual estrutura abaixo mencionada?
- a) Musculatura circular
 - b) Musculatura longitudinal
 - c) Túnica adventícia
 - d) Cinta de Willis
- 17) Qual dos seguintes ossos não forma a órbita:
- a) Frontal
 - b) Maxila

- c) Etmoide
 - d) Temporal
- 18) Quais são os limites superiores, medial e inferior do seio maxilar respectivamente:
- a) Fossa craniana, órbita e cavidade nasal
 - b) Fossa craniana, cavidade nasal e dentes maxilares
 - c) Cavidade nasal, dentes maxilares e dentes mandibulares
 - d) Órbita, seio etmoidal e cavidade nasal
- 19) São exemplos de músculos de mastigação que auxiliam na elevação e no abaixamento da mandíbula respectivamente:
- a) Pterigoideo medial e digástrico
 - b) Pterigoideo lateral e pterigoideo medial
 - c) Temporal e masseter
 - d) Pterigódeo do ângulo da boca e abaixador do ângulo da boca
- 20) Qual músculo deprime o osso hióide, mas quando o osso hióide está fixado, eleva a laringe.
- a) Omo-hióideo
 - b) Tireo-hióideo
 - c) Esterno-hióideo
 - d) Digástrico
 - e) Esternotireóideo
- 21) A artéria alveolar inferior é ramo da artéria:
- a) Facial
 - b) Maxilar
 - c) Lingual
 - d) Carótida interna
 - e) Transversa da face
- 22) A tromboflebite de seio cavernoso é uma infecção grave que pode evoluir a partir de uma infecção odontogênica. Qual veia é responsável para essa disseminação.
- a) Veia facial
 - b) Veia infraorbitária
 - c) Veia jugular externa
 - d) Veia lingual
 - e) Veia oftálmica superior

Prova B

- 1) A cavidade de uma articulação sinovial pode ser examinada, inserindo-se uma cânula e um pequeno telescópio (artroscópio) no seu interior. Este procedimento cirúrgico (astroscoopia) permite o cirurgião ortopédico examinar articulações em busca de anormalidades. Com base no texto acima e nos conhecimentos anatômicos a exploração da cavidade articular do ombro permite a visualização das seguintes estruturas anatômicas, exceto:
 - a) Cabeça umeral
 - b) Bolsa subdeltóidea
 - c) Cartilagem articular
 - d) Cavidade glenoidal
 - e) Membrana sinovial
- 2) A eletromiografia (EMG), o estímulo elétrico dos músculos é um método de testar a ação dos músculos. O examinador coloca os eletrodos de superfície sobre um músculo e pede a pessoa para realizar certos movimentos. De acordo com o texto acima durante a realização do movimento ocorrem distintos tipos de contrações musculares, exceto:
 - a) Excêntrica
 - b) Isométrica
 - c) Concêntrica
 - d) Isotônica
- 3) As fraturas por avulsão do tubérculo maior do úmero são relativamente comuns, especialmente em pessoas de meia idade e idosas. Normalmente resultam de uma queda sobre a extremidade do ombro – o acrômio. Os tendões afetados pelo avulsão do tubérculo maior do úmero correspondem aos músculos, exceto:
 - a) Musc. Supraespinal
 - b) Musc. Redondo menor
 - c) Musc. Sbescapular
 - d) Musc. Infraespinal
- 4) O coração ligeiramente maior que um punho cerrado, é uma bomba muscular dupla e auto-reguladora, cujas partes trabalham em harmonia para impelir o sangue para todas as partes do corpo. Todas as alternativas estão incorretas, exceto?
 - a) () na face diafragmática do coração encontra-se a maior porção do ventrículo esquerdo, a aurícula esquerda e o ápice do coração formado pelo ventrículo direito.
 - b) () A base do coração é formada pelo átrio esquerdo e uma pequena parte do átrio direito e veias cava inferior e superior e aurícula direita.
 - c) () O miocárdio do átrio direito é mais espesso que o miocárdio do átrio esquerdo
 - d) O seio coroário desemboca no átrio direito e drena o sangue proveniente do epicárdio e miocárdio.
- 5) Usando um mediastinoscópio, cirurgiões podem ver muito do mediastino e conduzir procedimentos cirúrgicos menores eles inserem este instrumento iluminado tubular através de uma pequena incisão na raiz do pescoço, imediatamente acima do manúbrio do esterno e próximo da incisura jugular, durante a mediastinoscopia, cirurgiões

podem ser ou fazer biópsias dos linfonodos mediastinais para determinar se células cancerígenas disseminaram-se por metástase para linfonodos a partir de um carcinoma broncogênico, por exemplo. O mediastino também pode ser explorado e biópsias obtidas removendo-se parte de uma cartilagem costal. Com relação ao mediastino assinale a afirmativa correta:

- a) Em indivíduos posicionados de pé o arco da aorta é seccionado transversalmente pelo plano transversal do tórax que corta a aorta no ângulo do esterno anteriormente e o disco intervertebral das vértebras T4 e T6 posteriormente.
 - b) O mediastino médio contém o coração e os grandes vasos e é limitado pelo plano transversal do tórax que corta transversalmente abaixo do ângulo do esterno e o disco intervertebral das vértebras T5 e T6.
 - c) O esôfago passa verticalmente pelo mediastino médio imediatamente posterior à base do coração formada pelo átrio direito.
 - d) A valva atrioventricular direita ou mitral é auscultada no mediastino posterior situado anterior à coluna torácica e imediatamente posterior à base cardíaca.
- 6) Todas as alternativas estão corretas exceto:
- a) O seio coronário é a principal veia do coração, ela recebe as veias cardíacas **parda**, magna e média e desemboca no átrio esquerdo.
 - b) Os primeiros ramos da artéria aorta são as artérias coronárias direita e esquerda que se distribuem pela superfície cardíaca e **anastomosam-se** no ápice cardíaco através das artérias interventriculares posteriores.
 - c) O ápice do coração é formado pelo ventrículo esquerdo, situa-se posterior ao 5º espaço intercostal esquerdo nos adultos local onde ocorre a pulsação máxima do coração “batimento apical”.
- 7) Na luxação do ombro onde mais 25% de lesão óssea da cavidade glenoidal estão indicadas intervenções abertas com transferência e fixação de enxertos ósseos, classicamente do processo coracoide (eminência óssea da escápula). No processo coracoide da escápula estão inseridos os músculos:
- a) Musc coracobraquial e Musc braquial
 - b) Musc bíceps braquial porção curta e Musc peitoral maior
 - c) Musc. Coracobraquial e Musc deltoide
 - d) Musc. Peitoral menor e Musc bíceps braquial porção curta
- 8) Por causa da proeminência e acessibilidade das veias superficiais do membro superior, elas são comumente usadas para retirar sangue ou injetar uma solução. Estas veias podem estar engastadas no tecido subcutâneo (gordura), ficando difícil vê-las; contudo, aplicando-se um torniquete no braço, o retorno venoso é obstruído e as veias dilatam-se e normalmente são visíveis ou palpáveis. As veias superficiais citadas abaixo são utilizadas na venopunção, exceto:
- a) Veia intermédia do cotovelo
 - b) Veia braquial
 - c) Veia basílica
 - d) Veia cefálica
- 9) Os músculos retos do abdome tem como as suas origens as regiões dos rebordos costais. Cite qual dos elementos anatômicos mencionados não faz parte desta afirmação:

- a) Processo Xifoide
 - b) 5ª costela
 - c) 7ª costela
 - d) 8ª costela
- 10) Dos músculos citados; qual deles não se insere na linha Alba:
- a) Reto do abdome
 - b) Transverso
 - c) Obliquo interno
 - d) Obliquo posterior
- 11) A parede interna do estômago é rica em pregas exceto na região do:
- a) Antro
 - b) Fundo
 - c) Corpo anterior
 - d) Corpo posterior
- 12) Na borda livre do pequeno omento, logo abaixo do ligamento hepatoduodenal, possui um orifício que comunica:
- a) A retro cavidade dos omentos com a cavidade peritoncelar
 - b) O espaço subfrenico direito com a cavidade abdominal
 - c) O tronco celíaco com o fundo gástrico
 - d) Não existe o tal orifício
- 13) A face esplênica Antero interna são se relaciona:
- a) Com o estômago
 - b) Com o diafragma
 - c) Com o cólon
 - d) Com o hilo esplênico parte interior
- 14) Cite o nome os vasos sanguíneos que comunicam o fundo gástrico com o baço:
- a) vasos esplênicos
 - b) Vãos tortuosos
 - c) Vasos curtos
 - d) Vasos compridos
- 15) Qual a drenagem venosa do esôfago abdominal que está relacionad a a hemorragia digestiva alta nas doenças que cursam com hipertensão portal?
- a) Veia tireoidiana
 - b) Veia esofagiana media
 - c) Veia frênica
 - d) Veia gástrica esquerda
- 16) O revestimento esofagiano é realizado por qual estrutura abaixo mencionada?
- a) Musculatura circular
 - b) Musculatura longitudinal
 - c) Túnica adventícia
 - d) Cinta de Willis

- 17) Qual dos seguintes ossos não forma a órbita:
- a) Frontal
 - b) Maxilar
 - c) Palatino
 - d) Etmoide
 - e) Temporal
- 18) Quais são os limites superior e inferior do seio maxilar respectivamente:
- a) Fossa craniana, órbita e cavidade nasal
 - b) Fossa craniana, cavidade nasal e órbita
 - c) Órbita, cavidade nasal e dentes maxilares
 - d) Cavidade nasal, dentes maxilares e dentes mandibulares
 - e) Órbita, seio etmoidal e cavidade nasal
- 19) São exemplos de músculos da mastigação que auxiliam na elevação e no abaixamento da mandíbula respectivamente:
- a) Pterigoideo medial e digástrico
 - b) Pterigoideo lateral e Pterigoideo medial
 - c) Temporal e masseter
 - d) Pterigoideo lateral e Zigomático maior
- 20) Qual músculo deprime o osso hióide mas quando o osso hióide está fixado, eleva a laringe:
- a) Omo –hióideo
 - b) Tíreo - hioideo
 - c) Esterno- hioideo
 - d) Digástrico
 - e) Esternotireóideo
- 21) A artéria alveolar inferior é ramo da artéria:
- a) Facial
 - b) Maxilar
 - c) Lingual
 - d) Carótida interna
 - e) Transversa da face
- 22) A tromboflebite de seio cavernoso é uma infecção grave que pode evoluir a partir de uma infecção odontogênica. Qual veia é responsável para essa disseminação:
- a) Veia facial
 - b) Veia infraorbitária
 - c) Veia jugular externa
 - d) Veia lingual
 - e) Veia oftálmica superior

32) Na região do abdome inferior, mais precisamente abaixo da linha Arqueada, quantas aponeuroses passam por cima do músculo reto do abdome.

- a) Apenas uma aponeurose
- b) Duas aponeuroses
- c) Três aponeuroses
- d) Quatro aponeuroses

33) Marque Verdadeiro ou Falso:

- () A aponeurose do músculo oblíquo externo forma o orifício inguinal interno.
- () A hérnia direita da parede abdominal (região inguinal) é causada por uma fraqueza do triângulo de Hesselbach.
- () Os vasos epigástricos inferiores ajudam a vascularizar o músculo reto do abdome.
- () O nervo íleo inguinal não entra no funículo espermático

- a) V V V F
- b) F V V F
- c) F F F V
- d) V V F F

34) Não é ponto de constrição esofágica:

- a) Cartilagem tireóidea
- b) Arco da aorta
- c) Brônquio principal esquerdo
- d) Diafragma

35) As duas principais estruturas que estabilizam o estômago em sua posição são:

- a) Ligamento gastro-hepático e esôfago
- b) Peloro e esôfago
- c) Ligamento gastro-hepático e diafragma
- d) Esôfago e tecido conjuntivo que une o fundo gástrico com a face inferior do diafragma

36) Pertence a estratificação do estômago. (Assinale a alternativa que contém erro (s))

- a) Músculo circular e oblíquo
- b) Músculo longitudinal e serosa
- c) Mucosa e submucosa
- d) Serosa adventícia

37) Forame de Winslow:

- a) É uma passagem que une o andar superior do abdome com a pelve
- b) É um orifício que comunica o mediastino com o abdome
- c) Situa-se logo abaixo da borda livre do ligamento gastro-hepático
- d) Situa-se entre o ligamento esplenofrênico e fundo gástrico

38) Assinale a alternativa correta:

- a) Face esplênica antero-interna se relaciona com o intestino grosso

- b) Face esplênica externa se relaciona com o fundo gástrico
- c) O hilo esplênico não ocorre subdivisão do tronco arterial
- d) Todas as alternativas estão incorretas

Prova composta de 4 páginas e 23 questões. Cada questão vale 2.2 as questões 13 e 23 valem 1.9 cada, total (50.0)

1. Durante a inspiração a cavidade torácica aumenta o seu volume qual dos diâmetros aumenta de comprimento?

- a) Craneocaudal
- b) Laterolateral
- c) Anteroposterior
- d) Questão A e B estão corretas
- e) Questão A, B e C estão corretas

2. Um paciente é solicitado a inspirar profundamente, pra em seguida expirar ao máximo. Todos os músculos seguintes contribuem para a expiração, EXCETO:

- a) Oblíquo externo do abdome
- b) Oblíquo interno do abdome
- c) Diafragma
- d) Reto do abdome
- e) Transverso do abdome

3. Suspeita-se que uma criança tenha aspirado um botão recoberto por metal. Na radiografia de tórax com era de esperar o objeto encontra-se alojado no lobo inferior do pulmão direito. Qual alternativa abaixo não é explicativa para o caso?

- a) O brônquio principal esquerdo é mais horizontal do que o direito
- b) O brônquio lobar inferior direito é quase a continuação da direção da traqueia
- c) O pulmão direito não possui bolo médio
- d) O brônquio principal direito apresenta diâmetro maior do que o esquerdo.

4. A laringe é composta por algumas cartilagens. Dentre as opções abaixo qual é ímpar?

- a) Tireóide
- b) Corniculada
- c) Cuneiforme
- d) Aritenoide
- e) Todas são pares

5. O pulmão pode ser dividido em lobos e os lobos são divididos em segmentos. Qual a alternativa apresenta os segmentos do lobo superior do pulmão esquerdo?

- a) Apical posterior, anterior, lateral e medial
- b) Basal, posterior, anterior, superior e inferior
- c) Apical, posterior, anterior, superior e inferior
- d) Apical, lateral, medial, superior e inferior

6. O paciente queixa para o doutor uma dor no pulmão. O médico ao explicar para o paciente que o seu pulmão não do estaria pensando em qual observação anatômica?

- a) A pleura visceral é extremamente sensível a dor
- b) Pleura visceral é insensível a dor
- c) A pleura parietal é insensível a dor

- d) A dor pulmonar é reflexa de uma área em isquemia, sendo assim esse paciente estaria enfartando.
7. O maior coletor do retorno venoso do coração é uma estrutura localizada na parede posterior do coração. Qual alternativa abaixo representa essa estrutura e o local de sua desembocadura?
- a) Seio venoso, átrio direito
 - b) Seio coronário, átrio direito
 - c) Seio cardíaco, átrio direito
 - d) Seio venoso, átrio esquerdo
8. Estudando a estratigrafia do coração, vemos que este órgão, de dentro para fora, é composta por endocárdio, miocárdio e pericárdio. Esse último é sinônimo de :
- a) Lâmina parietal do pericárdio fibroso
 - b) Lâmina visceral do pericárdio seroso
 - c) Lâmina serosa do pericárdio parietal
 - d) Lâmina fibrosa do pericárdio visceral
 - e) Duas respostas estão corretas
9. A cavidade pericárdica é um espaço potencial, que pode em alguns casos, ser ocupada por um líquido ou sangue levando a um quadro de tamponamento cardíaco. Onde a cavidade pericárdica está situada?
- a) Dentro do coração profundamente ao endocárdio
 - b) Entre o epicárdio e a lâmina parietal do pericárdio seroso
 - c) Entre o pericárdio seroso e o pericárdio fibroso
 - d) Entre o pericárdio fibroso e a pleura mediastínica
 - e) NRA
10. Quando nos deparamos com um quadro de infarto do miocárdio, estamos frente a uma situação em que as **artérias** coronarianas não estão suprimindo a necessidade do coração. Qual alternativa apresenta ramos de artéria coronária esquerda?
- a) Circunflexo e interventricular posterior
 - b) Marginal e interventricular posterior
 - c) Circunflexo e interventricular anterior
 - d) Todas as respostas estão erradas
11. Em condições normais independente da idade do indivíduo, qual a alternativa é uma afirmação verdadeira quanto às diferenças entre os ventrículos direito e esquerdo?
- a) Número de valvas é maior no ventrículo direito
 - b) No ventrículo direito corre sangue arterial e no esquerdo venoso
 - c) No ventrículo direito temos uma parede muscular mais delgada
 - d) Ao ventrículo direito temos músculos papilares anteriores e posteriores maiores que no esquerdo
12. Obedecendo a relação 1 para forame oval, 2 para ducto arterioso e 3 para ducto venoso, qual das alternativas abaixo apresenta a relação correta?
- a) Comunicação entre átrio direito e esquerdo

- b) Comunicação entre ventrículo direito e esquerdo
- c) Comunicação entre artéria pulmonar e artéria aorta
- d) Comunicação entre veia umbilical e veia cava inferior
- e) Comunicação entre artéria umbilical e veia cava inferior
- f) Comunicação entre veia pulmonar e artéria pulmonar

1-1, 2-6 e 3-5

1-1, 2-3 e 3-4

1-2, 2-4 e 3-3

1-2, 2-6 e 3-5

13. O primeiro som cardíaco (Tum) e o segundo som (ta) representam respectivamente:
- a) Fechamento das valvas semilunares e fechamento das valvas atrioventriculares
 - b) Abertura das valvas atrioventriculares e fechamento das valvas emilunares
 - c) Abertura das valvas atrioventriculares e abertura das valvas semilunares
 - d) Fechamento das valvas atrioventriculares e fechamento das valvas semilunares
 - e) Impacto do sangue na parede do átrio e impacto do sangue na parede do ventrículo
14. Considerando que o corpo humano possui cinco músculos na formação da parede anterior do abdome, cite quantos músculos não possuem a inserção na linha Alba.
- a) Apenas um músculo
 - b) Dois músculos
 - c) Três músculos
 - d) Quatro músculos
15. Na região do abdome inferior, mais precisamente abaixo da linha Arqueada, quantas aponeuroses passam por cima do músculo reto do abdome
- a) Apenas uma aponeurose
 - b) Duas aponeuroses
 - c) Três aponeuroses
 - d) Quatro aponeuroses
16. Marque Verdadeiro ou Falso:
- () A aponeurose do músculo oblíquo externo forma o orifício inguinal interno
 - () A Hérnia direita da parede abdominal (região inguinal) é causada por uma fraqueza do triângulo de **hesselbach**.
 - () Os vasos epigástricos inferiores ajudam a vascularizar o músculo reto do abdome.
 - () O nervo íleo inguinal não entra no funículo espermático.
- a) V V V F
 - b) F V V F
 - c) F F F V
 - d) V V F F
17. Não é ponto de constrição esofágica:
- a) Cartilagem tireóidea
 - b) Arco da aorta
 - c) Brônquio principal esquerdo
 - d) Diafragma

18. As duas principais estruturas que estabilizam o estômago em sua posição são:
- a) Ligamento gastro-hepático e esôfago
 - b) Píloro e esôfago
 - c) Ligamento gastro-hepático e diafragma
 - d) Esôfago e tecido conjuntivo que une o fundo gástrico com a face inferior do diafragma
19. Pertencem a estratificação do estômago: (Assinale a alternativa que contém erro (s)).
- a) Músculo circular e oblíquo
 - b) Músculo longitudinal e serosa
 - c) Mucosa e submucosa
 - d) Serosa e adventícia
20. Forame de Winslow:
- a) É uma passagem que une o andar
 - b) É um orifício que comunicação mediastino com o abdome
 - c) Situa-se logo abaixo da borda livre do ligamento gastro-hepático
 - d) Situa-se entre o ligamento esplenofrênico e fundo gástrico
21. Assinale a alternativa correta:
- a) Face esplênica antero-interna se relaciona com o intestino grosso
 - b) Face esplênica externa se relaciona com o fundo gástrico
 - c) Ligamento esplenopancreático
 - d) Ligamento esplenocólico
22. O principal ligamento do baço, o qual é seccionado no primeiro tempo de uma esplenectomia é o:
- a) Ligamento esplenorenal
 - b) Ligamento esplenofrênico
 - c) Ligamento esplenopancreático
 - d) Ligamento esplenocólico
23. O esôfago é um órgão que possui aproximadamente 25 cm. Atravessa três regiões importantes do corpo humano. Neste trajeto vertical, sempre anteriormente a coluna vertebral. Delimitar as vértebras do seu início e seu término.
- a) C5 – T10
 - b) C6 – T11
 - c) C7 – T12
 - d) C5 – T 11

Observações:

1. Leia toda a questão antes de responder;
 2. Use caneta esferográfica azul ou preta;
 3. Rasura e uso de corretivo anulam a questão;
 4. Resposta a lápis perde o direito de revisão;
- Sigla NRA (Nenhuma das Respostas Anteriores)

Questão 1: A ausência de movimento de flexão das articulações Inter Falangianas proximais do dedo indicador e médio refere-se comprometimento das seguintes estruturas anatômicas:

- a) Musc Flexor Longo do Polegar e Nervo Mediano
- b) Musc. Flexor Superficial dos dedos e Nervo Ulnar
- c) Musc. Flexor Profundo dos dedos e Nervo Mediano
- d) Musc. Lumbricais e Nervo Radial
- e) NRA

Questão 2: Nas alternativas abaixo encontra-se músculos da região hipotênar e da região tenar, exceto:

- a) Musc. Oponente do polegar
- b) Musc. Abductor do dedo mínimo
- c) Musc. Palmar curto
- d) Musc. Flexor curto do polegar

Questão 3: A estrutura vascular que percorre o sulco Deltopeitoral e penetra no triângulo clavipeitoral para desembocar na veia axilar, origina-se:

- a) Da veia intermédia do antebraço
- b) Metade lateral do arco venoso dorsal
- c) Veia braquial
- d) Veia Basílica
- e) NRA

Questão 4: Dentre as vísceras encontradas no mediastino está a artéria aorta na qual seu primeiro ramo é:

- a) Tronco braquiocefálico
- b) Artéria carótida comum esquerda
- c) Artéria subclávia esquerda
- d) Seio coronário
- e) Artérias coronárias

Questão 5: Assinale a alternativa correta:

- a) A artéria coronária esquerda do seio aórtico esquerdo apresenta um trajeto curto no sulco coronário esquerdo e logo bifurca-se em artéria interventricular anterior e ramo circunflexo. O ramo circunflexo contorna o sulco coronário até a base do coração onde anastomosa-se com a artéria interventricular posterior.

- b) O seio coronário é a veia mais volumosa do coração e recebe as veias cardíacas parva, magna e média percorre pelo sulco coronário direito e desemboca no átrio direito do coração.
- c) O miocárdio do átrio esquerdo é mais delgado do que o miocárdio do átrio direito
- d) Durante a sístole ventricular a valva mitral encontra-se fechada para evitar o refluxo sanguíneo do ventrículo direito para o átrio direito.
- e) A base do coração está voltada posteriormente em direção aos corpos das vértebras de T VI e TIX e está separada deles pelo pericárdio, esôfago, aorta e seio oblíquo.

Questão 6: Assinale a alternativa incorreta:

- a) Os segmentos lingulares superior e inferior do lobo superior esquerdo correspondem ao lobo médio do pulmão direito.
- b) No hilo do pulmão esquerdo encontra-se na sequência de superior para inferior, a artéria pulmonar, brônquio principal esquerdo e veia pulmonar.
- c) O brônquio principal direito é mais largo, mais curto e mais vertical do que o brônquio principal esquerdo por que entra diretamente no hilo pulmonar esquerdo.
- d) Os segmentos broncopulmonares são: cirurgicamente ressecáveis, as maiores subdivisões dos lobos e separados dos segmentos adjacentes por septos de tecido conectivo.
- e) NRA.

Questão 7: Assinale a alternativa incorreta:

- a) Os limites de abertura superior do tórax são: posteriormente encontra-se a primeira vértebra torácica, anterior manúbrio do esterno e as cartilagens costais e lateralmente os pares de primeiras costelas sendo que a abertura tem inclinação anterossuperior.
- b) O conteúdo da fossa cubital consiste em: tendão do músculo bíceps braquial, nervo mediano, nervo radial a artéria braquial e seus ramos terminais, as artérias radial e ulna.
- c) A irrigação arterial do tórax consiste em ramos provenientes da artéria axilar, artéria subclávia e parte torácica da aorta.
- d) O espaço retromamário consiste em um plano de tecido conectivo frouxo com pouca gordura que permite o movimento da mama sobre a fáscia peitoral.

Questão 8: Quanto a parede Anterior do canal inguinal, podemos afirmar:

- a) É a fáscia de Scarpa
- b) É o ligamento inguinal
- c) É a aponeurose do músculo oblíquo externo
- d) É a fâsciatransversal

Questão 9: É correto afirmar sobre o canal inguinal da mulher

- a) O nervo ílio inguinal percorre este canal
- b) O nervo pudendo externo entra no canal inguinal
- c) O anel inguinal interno é formado pelas fibras musculares do músculo oblíquo interno.

Questão 10: Na parede abdominal, região anterior, logo abaixo da linha arqueada, como estão organizadas as aponeuroses em relação ao músculo reto?

- a) Todas as aponeuroses passam anteriormente ao músculo reto
- b) Apenas uma aponeurose passa anteriormente ao músculo reto
- c) Duas aponeuroses passam anteriormente e uma posteriormente
- d) Todas passam posteriormente ao músculo reto

Questão 11: A região Antral do estômago está localizada:

- a) Abaixo de uma linha imaginária horizontal que passa pela incisura cardíaca
- b) Abaixo de uma linha imaginária horizontal que passa pela incisura angular
- c) Intimamente relacionada com o baço
- d) Logo abaixo do fundo gástrico.

Questão 12: Das afirmações abaixo, qual é a opção errada sobre a vascularização do estômago?

- a) Só pela artéria esplênica – pequena curvatura
- b) Pela artéria gastro duodenal – pequena curvatura
- c) Plenos vasos curtos e esplênica – grande curvatura
- d) Artéria gastroduodenal – fundo gástrico

Questão 13: o baço é vascularizado:

- a) Só pela artéria esplênica
- b) Pela artéria gastro duodenal
- c) Pelos vasos curtos e esplênica
- d) Pela artéria esplênica e artéria frênica

Questão 14: Das estruturas a seguir, qual a que não faz limite com a região anterior da cavidade celiaca?

- a) O ligamento gástrico hepático
- b) O estômago
- c) O ligamento gastro cólico
- d) O diafragma

Questão 15: A artéria meníngea média é ramo da maxilar e penetra no crânio através:

- a) Forame oval
- b) Forame redondo
- c) Forame espinhoso
- d) Forame estilomastóideo

Questão 16: A intubação submentual é uma alternativa para a traqueostomia em um trauma extenso de face. Qual a sequência de músculos visualizado em um acesso extra oral para confecção da passagem do tubo de intubação.

- a) Platíma, ventre anterior do digástrico, milohioídeo e genioíóideo
- b) Genioíóideo, milohioídeo, ventre anterior do digástrico e platíma
- c) Omoíóideo, platíma, ventre anterior do digástrico e milohioídeo
- d) Milohioídeo, ventre anterior do digástrico, platíma e genioíóideo
- e) Platíma, esternoíóideo e esternotireóideo

Questão 17: A respeito dos músculos da mastigação, qual apresenta origem no arco zigomático e processo maxilar do osso zigomático e inserção na face lateral do ramo da mandíbula:

- a) Pterigóideo lateral
- b) Pterigoideo medial
- c) Masseter
- d) Temporal
- e) Zigomático maior

Questão 18: O cadarçamento temporário da artéria carótida externa (CTACE) é um procedimento necessário para diminuir o sangramento transoperatório em exérese de tumor malignos de cavidade oral. Qual das artérias a seguir teria seu sangramento após o CTACE se fosse seccionada.

- a) Artéria temporal superficial
- b) Artéria maxilar
- c) Artéria tiróidea superior
- d) Artéria oftálmica
- e) Artéria lingual

Questão 19: A epistaxe (sangramento nasal) tem várias etiologias, entretanto, a anatomia vascular de cavidade nasal contribui para a sua ocorrência devido a quantidade de artérias e a presença do plexo de kiesselbach. Qual artéria não compõe esse plexo?

- a) Artéria esfenopalatina
- b) Artéria etmoidal posterior
- c) Artéria etmoidal anterior
- d) Artéria labial superior
- e) Artéria dorso nasal

Questão 20: As conchas nasais média e superior compõe o osso:

- a) Esfenoide
- b) Etmoide
- c) Maxila
- d) Vômer
- e) Palatino

Observações:

1. Leia toda a questão antes de responder;
2. Use caneta esferográfica azul ou preta;
3. Rasura e uso de corretivo anulam a questão;
4. Resposta a lápis perde o direito de revisão;

Questão 1: Qual a alternativa que possui o elemento que não passa por dentro funículo espermático?

- a) Nervo íleo inguinal
- b) Ducto deferente
- c) Artéria e veia testiculares
- d) Plexo pampiniforme

Questão 2: A respeito da estratificação do estômago; é composta por quantas camadas musculares:

- a) Duas
- b) Três
- c) Quatro
- d) Uma

Questão 3: Assinale a alternativa verdadeira:

- a) O pequeno omento emerge da grande curvatura gástrica
- b) Não há comunicação da cavidade peritoneal para a cavidade celíaca
- c) O peritônio reveste o fígado em quase toda sua totalidade
- d) O peritônio não reveste a porção posterior do estômago

Questão 4: Qual dos ligamentos esplênico é considerado o verdadeiro ligamento do baço que também é chamado de ligamento suspensor do baço?

- a) Esplenofrênico
- b) Esplenocólico
- c) Esplenorenal
- d) Gastroesplênico

Questão 5: A região inguinal possui um dispositivo anatômico de formato triangular, tendo como importância clínico-cirúrgica o local de acometimento das hérnias diretas. Os limites deste espaço correspondem a alternativa:

- a) Vasos epigástricos inferiores, linha Alba, ligamento inguinal
- b) Ligamento inguinal, borda lateral da bainha do reto e vasos epigástricos inferiores
- c) Vasos epigástricos inferiores, linha Alba, tubérculo púbico
- d) Vasos epigástricos inferiores, linha Alba, tubérculo púbico

Questão 6: Varizes esofagianas. Enfermidade grave que acomete muitos brasileiros; portadores de esquistossomose e alcoolismo crônico. Podemos explicar através do estudo anatômico o acometimento desta doença, pela drenagem esofágica. Qual o vaso sanguíneo que melhor explica esta fisiopatologia?

- a) Veia tireoideia inferior

- b) Veia ázigos
- c) Veia gástrica esquerda
- d) Veia hemiazigos

Questão 7: A face posterior interna esplênica se relaciona com qual órgão:

- a) Lobo esquerdo do fígado
- b) Cólon
- c) Estômago
- d) Rim

Questão 8: Com relação aos ossos envolvidos nas fraturas Le Fort, correlacione os tipos de fraturas (I, II e III) com a descrição das alternativas abaixo e assinale a alternativa que apresente a correção correta.

- a) A linha de fratura percorre o processo nasofrontal, maxilofrontal, paredes orbitárias, arco zigomático e processo pterigoide.
 - b) A linha de fratura percorre plano transmailar, acima dos ápices dos dentes e abaixo da junção zigomaticomaxilar e fratura ocorre a partir da ponte nasal, através do processo frontal da maxilar, osso lacrimal e assoalho da órbita, estendendo-se inferiormente da parede anterior do seio maxilar sob o zigoma e fratura do processo pterigoide.
-
- a) I-A, II-B e III-C
 - b) II-A, I-B e III-C
 - c) III-A, I-B e II-C
 - d) I-A, III-B e B-C
 - e) III-A, II-B e I-C
 - f) II-A, III-B e I-C

Questão 9: A artéria-facila tem um trajeto que passa pela face medial da mandíbula onde é encoberta pela glândula submandibular após isso, assume o trajeto oblíquo e superior na face passando lateralmente ao ângulo da boca e ao nariz após. No seu trajeto que se inicia após emergir da carótida externa, ela emite os seguintes ramos respectivamente.

- a) Artéria submentoniana, artéria palatina ascendente, artéria labial inferior, artéria labial superior e artéria angular.
- b) Artéria angular, artéria labial superior, artéria labial inferior, artéria submentoniana e artéria palatina ascendente.
- c) Artéria palatina ascendente, artéria submentoniana, artéria labial inferior, artéria labial superior e artéria angular.
- d) Artéria palatina ascendente, artéria submentoniana, artéria labial inferior, artéria labial inferior e artéria labial superior.

Questão 10: O músculo que tem como origem o Arco zigomático e processo maxilar do osso zigomático e a inserção Face lateral do ramo da mandíbula se trata:

- a) Temporal
- b) Pterigoideo medial
- c) Pterigoideo lateral
- d) Bucinador
- e) Masseter

Questão 11: Para que os músculos genioiúideo e ventre anterior do digástrico abaixe a mandíbula, é necessário que o osso hioide esteja fixado. Qual músculo promove essa fixação.

- a) Mílo-hióideo
- b) Omo-hióideo
- c) Esternotireóideo
- d) Esternocleidomastóideo
- e) Estilo-hióideo

Questão 12: A artéria meníngea média é ramo da artéria maxilar e penetra no crânio através do forame espinhoso. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

- a) Maxilar; oval
- b) Temporal profunda; espinhoso
- c) Maxilar; espinhoso
- d) Oftálmica; lacerado

Questão 13: sobre o complexo estimulante do coração assinale a afirmativa correta:

- a) O nó sinoatrial é uma pequena reunião de tecido nodal, tecido conectivo fibroelástico e fibras musculares especializadas, localizado próximo da porção superior do sulco terminal, é marca-passo do coração iniciando e controlando os impulsos para contração cardíaca./ O nó sinoatrial é suprido pela artéria do nó sinoatrial que origina-se a partir de um ramo ventricular da artéria coronária direita (60% das pessoas), mas muitas vezes se originam do ramo ventricular da artéria coronária esquerda (40% das pessoas).
- b) O fascículo atrioventricular (AV) a única ponte entre o miocárdio atrial e ventricular transmite o impulso (sina) proveniente do nó atrioventricular (AV) localizado na região anteroinferior do septo interatrial. O fascículo AV segue a partir do nó AV através do esqueleto fibroso do coração e desce com seu trajeto ao longo da parte membranácea do septo interatrial (SIS) e bifurca-se na junção da parte membranácea e parte muscular do septo interventricular (SIV) em ramos direito e esquerdo.
- c) A condução dos impulsos que geram o ciclo cardíaco pode ser resumida da seguinte forma: o nó sinoatrial (AS) gera o impulso que é propagado por condução miogênica para o nó atrioventricular que imediatamente transmite o impulso que é propagado por condução miogênica para o nó atrioventricular que imediatamente transmite o fascículo atrioventricular e em seguida aos seus ramos direito e esquerdo que seguem de cada lado do septo interventricular e suprem os ramos subendocárdicos para os músculos papilares e parede dos ventrículos.
- d) O esqueleto fibroso do coração forma um isolante elétrico, separando os impulsos conduzidos mioentericamente dos átrios e ventrículos, de forma que a contração dessas câmaras seja independente, e circulando e dando passagem à parte inicial do feixe átrio ventricular do complexo estimulante do coração.

Questão 14: Sobre a anatomia do coração assinale a alternativa incorreta:

- a) O ápice do coração situa-se posteriormente ao 5º espaço intercostal esquerdo em adultos, em geral a aproximadamente 9 cm (a largura de uma mão) do plano mediano região do ictus cordis. É formado pela parte inferolateral do ventrículo esquerdo.
- b) A base do coração é formada principalmente pelo átrio esquerdo, com menor contribuição do átrio. Está voltada posteriormente em direção aos corpos das vértebras TVI a TIX e estão separadas delas pelo paricárdio, seio transverso do pericárdio, esôfago e aorta.

- c) A parede das câmaras cardíacas possui três camadas de superficial para profundo: epicárdio, miocárdio e endocárdio, a camada profunda sua nutrição é por difusão, a camada superficial, o epicárdio, lamina externa formada pela lamina parietal do pericárdio seroso e em sua superfície recebe as artérias coronárias e são responsáveis pela nutrição, o miocárdio camada intermediária e mais espesso no ventrículo esquerdo.
- d) Enquanto atravessa o ventrículo esquerdo, a corrente sanguínea sofre duas mudanças de trajeto perpendiculares que, juntas, resultam em mudança de direção de 180°. Essas inversão de fluxo ocorre ao redor da válvula anterior da valva atrioventricular esquerda.

Questão 15: Sobre a anatomia do mediastino assinale a alternativa incorreta:

- a) O plano transversal do tórax, que atravessa o ângulo do esterno e a junção (disco IV) das vértebras T IV e TV limita o mediastino superior do mediastino inferior. Acima deste plano encontra-se o arco da aorta cujo primeiro ramo é o tronco Braquicefálico no mediastino superior.
- b) O coração encontra-se no mediastino médio e repousa sobre o centro tendineo do diafragma, o ramo ascendente da artéria aorta a partir do mediastino médio emerge do ventrículo esquerdo através dos seios árticos de onde nascem as artérias coronárias direita e esquerda.
- c) A artéria aorta é a principal aorta a partir do mediastino superior para o inferior e neste nível desvia-se para a esquerda e atravessa o hiato aórtico do diafragma no nível da vértebra.
- d) O mediastino posterior (a parte posterior do mediastino inferior) está localizado inferiormente ao plano transversal do tórax, anteriormente às vértebras TV-TXII, posteriormente ao pericárdio e ao diafragma e entre a pleura parietal dos dois pulmões.

Questão 16: Assinale a alternativa incorreta:

- a) Em mulheres nulíparas tendo em vista as variações no tamanho e formato das mamas, as papilas não servem como referência segura para localizar o 4º espaço intercostal.
- b) A base circular da mama ocupa dois terços sobre a fáscia do músculo peitoral maior e um terço sobre a fáscia do músculo Serrátil anterior e estende-se longitudinalmente a partir da segunda costela até a sexta costela e transversalmente a partir da margem lateral do esterno até a linha média auxiliar.
- c) A abertura inferior do tórax apresenta os seguintes limites anatômicos: posterior, corpo vertebral de T12, pósterolateral, 11ª e 12ª costelas, anterolaterais as cartilagens costais unidas das costelas VII a X e anterior a articulação xifosternal.
- d) A concentração dos músculos intercostais também aumenta um pouco a dimensão transversal do tórax, elevando a parte média (partes mais laterais) das costelas (principalmente as inferiores) – o movimento em alça de balde.

Questão 17: Das afirmativas acima todas são corretas, exceto?

- a) A irrigação arterial da parede torácica da artéria aorta, artéria subclávia e artéria axilar na qual podemos citar: artérias intercostais posteriores e subcostais (aorta), através das artérias torácica interna e intercostal suprema (subclávia) e através da artéria torácica superior e artéria torácica lateral (artéria axilar)
- b) As veias intercostais acompanhamos artérias e nervos intercostais internos e externos e sua organização de superior para inferior é veia, artérias coronárias internos e

externos e sua organização de superior para inferior é veia, artéria e nervos intercostais.

- c) A anastomose que ocorre no ápice de coração comunica as artérias coronárias direita e esquerda através da junção de seus ramos as artérias intervenculares posterior e anterior respectivamente.
- d) A drenagem de líquidos de cavidade pericárdia, pericardiocentese, é realizada através de introdução de uma agulha de grande calibre através do 5º a 6º. Espaço intercostal esquerdo, neste espaço a incisura cardíaca do pulmão esquerdo deixa o pericárdio exposto região chamada de área nua do pericárdio.

Questão 18: Assinale a alternativa correta:

- a) A coluna vertebral é constituída de 33 vertebbras distribuídas em cinco regiões, a três superiores possuem 24 vértebras que articulam-se somente através de articulações sinoviais planas e articulações cartilagíneas chamadas de sínfises vertebrais.
- b) A curvatura torácica é formada pela diferença de espessura dos discos intervertebrais enquanto a curvatura lombar é formada pela diferença de comprimento da parte anterior e posterior dos corpos vertebrais.
- c) O ligamento amarelo é o único ligamento que possuem propriedades elásticas localiza-se nos espaços entre as laminae vertebrais. Os ligamentos amarelos, fortes e elásticos, ajudam a preservar as curvaturas normais da coluna vertebral e auxiliam na extensão da coluna após a flexão.
- d) O ligamento longitudinal anterior é o único ligamento que limita a extensão da coluna vertebral os demais ligamentos limitam formas de flexão exceto longitudinal posterior que é suprido por terminações nociceptivas (de dor).

Questão 19: A região da coluna vertebral articulada onde a orientação das superfícies articulares intervertebrais posteriores (zigapofisárias) impedem o movimento de rotação é?

- a) Lombar
- b) Cervical
- c) Torácica
- d) Sacral

Questão 20: Sobre a anatomia das articulações sinoviais todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto?

- a) O componente da articulação sinovial responsável por reduzir o atrito entre as superfícies articulares cuja nutrição é deficiente é a cartilagem articular que é avascular e indolor. A área da cartilagem articular é diretamente proporcional a quantidade de movimento produzido na articulação.
- b) O raio x e a artroscopia são procedimentos médicos que permitem a exploração da cavidade articular nas articulações sinoviais. A cavidade articular da articulação esterno clavicular é dividida em duas pelo disco articular.
- c) A classificação dos seis tipos de articulações sinoviais adota critérios com formato das superfícies que se articulam o movimento permitidos nessas articulações. Na coluna vertebral o encontro das articulações zigapofisárias são sinoviais plana e estão relacionadas com a restrição ou limitação do movimento.
- d) Dois componentes que surgem para suprir as diferenças de tamanho das superfícies que se articulam mantendo melhor encaixe e proporcionando estabilidade a articular é o disco interarticular e a capsula articular.

Observações:

5. Leia toda a questão antes de responder;
6. Use caneta esferográfica azul ou preta;
7. Rasura e uso de corretivo anulam a questão;
8. Resposta a lápis perde o direito de revisão;

1. A veia jugular externa é formada por quais tributárias?
 - a) Auricular posterior e retromandibular
 - b) Auricular posterior e temporal superficial
 - c) Occipital e retromandibular
 - d) Occipital e temporal superficial
 - e) NDS
2. A linha de fratura segue das partes posteriores dos seis maxilares (cavidade na maxila) em sentido superomedial através dos forames infraorbitais, lacrimais, ou etmoides até a ponta do nariz. Assim, toda a parte central da face, inclusive o palato duro e os processos alveolares, é separada do restante do crânio. Essa é a descrição de qual tipo de fratura.
 - a) Le Fort II
 - b) Le Fort I
 - c) Lanelong
 - d) Le Fort III
 - e) NDA
3. Qual músculo é responsável pela sustentação e elevação do assoalho da boca:
 - a) Milo-hióideo
 - b) Digástrico - ventre anterior
 - c) Genioiódio
 - d) Genioglosso
 - e) Platima
4. A artéria meníngea média é ramo de qual artéria?
 - a) Temporal superficial
 - b) Temporal Profunda
 - c) Carótida Interna
 - d) Faríngea Ascendente
5. O limite inferior da parede abdominal anterior é reconhecido por uma linha imaginária que possui o seguinte trajeto:
 - a) Linha imaginária que une as duas espinhas ilíacas antero superiores.
 - b) Linha imaginária horizontal que passa pelo púbis
 - c) Linha arqueada
 - d) Linha imaginária que une cada espinha Ilíaca Antero superior à sínfise púbica
6. Na topografia da musculatura da parede abdominal anterior, situada abaixo da linha arqueada, podemos afirmar que:
 - a) A aponeurose do músculo oblíquo externo está posterior ao músculo reto do abdômen.

- b) A aponeurose do músculo oblíquo interno se divide em duas camadas sendo que uma passa anteriormente e outra posteriormente ao músculo reto do abdômen.
- c) A aponeurose do músculo transverso do abdômen está posterior ao músculo reto do abdômen
- d) Todas estão corretas.

7. As afirmações abaixo se referem a origem do músculo transverso do abdômen. Indique a alternativa falsa.

- a) Ligamento inguinal
- b) Processos costais das vértebras lombares
- c) Lábio interno da crista Iliaca
- d) Aponeurose toraco lombar

8. A respeito da hérnia inguinal direta. Podemos afirmar que:

- a) O saco hérniário tem origem medialmente aos vasos epigástricos
- b) São das mais frequentes
- c) Todas as alternativas estão incorretas

9. O esôfago possui uma vasta inervação. Cite a alternativa a qual o nervo não faz parte da inervação esofágica.

- a) Nervo laríngeo superior
- b) Nervo gástrico anterior
- c) Nervo gástrico posterior
- d) Nervos esplâncnicos maior e menor

10. A lesão deste nervo na região proximal ao cotovelo provoca perda de sensibilidade na porção lateral da região palmar, na face palmar do polegar, do 2º e 3º dedos e metade lateral do 4º dedo. É importante ressaltar que os músculos do braço não são afetados, entretanto a pronação do antebraço, flexão da mão e dos dedos e importantes movimentos do polegar são perdidos, pois os músculos do antebraço responsáveis por esta movimentação são inervados por este nervo. Marque a opção que possua o nervo descrito.

- a) Nervo axilar
- b) Nervo radial
- c) Nervo ulnar
- d) Nervo mediano
- e) Nervo musculocutâneo

11. As fraturas de ossos do carpo, mais frequentemente do escafoide, são comuns em indivíduos que caem sobre o punho estendido. Com base na anatomia dos ossos do corpo, assinale a alternativa que possua apenas ossos da fileira distal.

- a) Trapézio, trapezoide e piramidal
- b) Capitato, hamato e pisiforme
- c) Capitato, trapézio e trapezoide
- d) Escafoide, pisiforme e piramidal
- e) Hamato, pisiforme e escafoide

12. A deformidade em sinal da “tecla de piano” é característico da luxação acrômio-clavicular e está relacionado com a presença de ruptura de que estruturas abaixo?

- a) Ligamentos detoide e conoide

- b) Tendão do m. supraespinhal e ligamentos esterno claviculares
 - c) Ligamentos coracoclaviculares e ligamento acromioclavicular
 - d) Ligamentos deltoide e trapezoide
 - e) Ligamentos acromioclavicular e trapezoide
13. O intervalo triangular é um espaço localizado entre o corpo do úmero, músculo redondo maior e tríceps braquial cabeça longa, por onde passam estruturas importantes para anatomia clínica. De acordo com a abordagem na literatura, assinale a alternativa que possui estruturas que passam por este espaço
- I. Nervo radial
 - II. Nervo axilar
 - III. Artéria braquial profunda
 - IV. Vasos circunflexos posteriores do úmero
 - V. Artéria circunflexa da escápula
- (A) Apenas I e IV
(B) Apenas III e V
(C) Apenas I e III
(D) Apenas IV e V
(E) Apenas I e IV
14. Das alternativas abaixo, qual apresenta um ramo da artéria subclávia e outro ramo da segunda parte da artéria axilar, respectivamente.
- a) Artéria torácica interna e tronco costocervical
 - b) Artéria torácica lateral e artéria torácica superior
 - c) Tronco tireocervical e artéria toracoacromial
 - d) Artéria vertebral e artéria subescapular
 - e) Artéria torácica interna e artéria circunflexa da escápula
15. Acima do hilo pulmonar direito na face mediastinal encontra-se?
- a) Sulco do esôfago
 - b) Brônquio principal direito
 - c) Sulco do arco da veia ázigos
 - d) Artéria pulmonar direita
 - e) Veia pulmonar direita
16. A referência anatômica que localiza o limite inferior do mediastino superior é?
- a) Quarta vértebra torácica
 - b) Segunda cartilagem costal
 - c) Arco da aorta
 - d) Plano transversal do tórax
 - e) Artéria pulmonar
17. Nas opções abaixo marque a que representa um brônquio de terceira ordem ou terciário.
- a) Brônquio principal direito
 - b) Brônquio segmentar apical
 - c) Brônquio lobar superior
 - d) Bronquíolo

e) Brônquio intermédio

18. Sobre a base do coração podemos afirmar que:

- a) O aurícula direita ocupa maior área da base
- b) É representada pela face diafragmática do coração
- c) O átrio esquerdo ocupa maior área da base
- d) Localiza-se no mediastino posterior

19. A estrutura anatômica que percorre a metade posterior esquerda do sulco coronário é?

- a) Artéria coronária direita
- b) Artéria interventricular posterior
- c) Veia cardíaca parva
- d) Artéria interventricular anterior
- e) Seio coronário

20. No mediastino superior o plano respiratório corresponde ao:

- a) 5º plano
- b) 2º plano
- c) 4º plano
- d) 3º plano
- e) 1º plano