CBNMED
CBNA
ONF

Etude des habitats naturels du Parc National du Mercantour (Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence)

Typologie des habitats

Benoît OFFERHAUS
Jérémie VAN ES
Corinne FRACHON
Jean-Michel GENIS

Septembre 2012

Le Mercantour Parc National
Office National des Forêts
Fonds européen de Développement régional
alcotra Programme Alcotra 2007-2013
Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Région PACA
CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES
CONSEIL GÉNÉRAL ALPES DE HAUTE-PROVENCE

SOMMAIRE

1. Tableau typologique des habitats naturels..... 1

2. Fiches habitats 20

1. Tableau typologique des habitats naturels

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
Pelouses, prairies								
Végétation de pelouses et d'ourlets méditerranéens riches en graminées vivaces, sur sols basiques								
	1	Pelouse xérothermophile méditerranéenne à andropogonées	Saturejo graecae - Hyparrhenion hirtae O. Bolos 1962	34.634	Steppes à Andropogon	PR	6220	* Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea
	2	Pelouse mésoméditerranéenne à brachypode penné et herbe à bitume	Brachypodion phoenicoidis Br-Bl. ex Molinier 1934	34.36	Gazons à Brachypode de Phénicie	NC		
	73	Friche thermophile de pied de falaise calcaire mésoméditerranéenne	Phlomido lychnitidis-Brachypodion retusi G.Mateo 1983	34.51	Pelouses xériques de la Méditerranée occidentale	PR	6220	* Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea
Végétation pionnière de dalles rocheuses plus ou moins horizontales, supraméditerranéenne à montagnarde								
	Communautés calcicoles subatlantiques à médioeuropéennes, collinéennes à montagnardes, souvent riches en annuelles							
	3	Pelouse supraméditerranéenne à montagnarde sur dalle calcaire à annuelles	Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. & Th.Müll. in Th.Müll. 1961	34.11	Pelouses médio-européennes sur débris rocheux	PR	6110	*Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
	4	Pelouse de pied de paroi calcaire et balme thermophile à clypéole	Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. & Th.Müll. in Th.Müll. 1961	34.11	Pelouses médio-européennes sur débris rocheux	PR	6110	*Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
	240	Pelouse montagnarde à orpin blanc et brome des toits des clapiers d'épierrement	Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. & Th.Müll. in Th.Müll. 1961	34.11	Pelouses médio-européennes sur débris rocheux	PR	6110	*Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
	Communautés silicicoles montagnardes à alpines des Alpes							
	5	Pelouse de dalle siliceuse montagnarde à crassulacées	Sedo albi - Scleranthion biennis Br.-Bl. 1955	36.2	Communautés des affleurements et rochers désagrégés alpins	IC	8230	Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii
Pelouses à dominance d'hémicryptophytes, xérophiles à mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes, surtout sur substrats carbonatés ou basiques								
	Communautés mésoxérophiles, subatlantiques, sur sol profond ou marneux							
	6	Pelouse semi-sèche supraméditerranéenne à montagnarde à brome érigé sur sol profond	Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons.	34.3265	Mesobromion des Alpes sud-occidentales	IC	6210	Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)
	7	Pelouse basophile supraméditerranéenne à brome érigé riche en orchidées	Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons.	34.3265	Mesobromion des Alpes sud-occidentales	PR	6210	Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) - * Site d'Orchidées remarquables
	8	Pelouse montagnarde à subalpine thermophile à brachypode rupestre	Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons.	34.3265	Mesobromion des Alpes sud-occidentales	IC	6210	Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)
	241	Pelouse basophile montagnarde à brome érigé et sainfoin des montagnes	Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons.	34.3265	Mesobromion des Alpes sud-occidentales	IC	6210	Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)
	269	Pelouse mésoxérophile continentale à brome érigé et fétuque du Valais	Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons.	34.3265	Mesobromion des Alpes sud-occidentales	IC	6210	Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	9	Pelouse mésophile pâturée à seslérie argentée	Brometalia erecti Koch 1928	34.3	Pelouses perennes denses et steppes médio-européennes	NC		
	Communautés xérophiles à mésoxérophiles, supra- à oroméditerranéennes							
	10	Pelouse sèche sur alluvions à armoise champêtre	Ononidetalia striatae Braun-Blanq. 1950			NC		
	11	Pelouse marnicole rase à globulaire à feuilles en cœur	Ononidion cenisiae Barbero 1972			NC		
	12	Pelouse montagnarde thermophile à fétuque méditerranéenne et brachypode rupestre	Festuco amethystinae - Bromion erecti Barbero & Loisel 1972	34.3265	Mesobromion des Alpes sud-occidentales	IC	6210	Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) - * Site d'Orchidées remarquables
Végétation prairiale, mésohydrique à mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe								
	Communautés fauchées collinéennes à submontagnardes							
	13	Prairie collinéenne de fauche à avoine élevée	Arrhenatherion elatioris Koch 1926	38.22	Prairies de fauche des plaines médio-européennes	IC	6510	Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
	14	Prairie montagnarde à siléne fleur de Jupiter et trisète jaunâtre	Arrhenatherion elatioris Koch 1926	38.22	Prairies de fauche des plaines médio-européennes	IC	6510	Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
	Communautés fauchées montagnardes et subalpines							
	15	Prairie montagnarde d'adret à siléne fleur de Jupiter et fétuque méditerranéenne	Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. & Tüxen ex Marschall 1947	38.3	Prairies de fauche de montagne	IC	6520	Prairies de fauche de montagne
	16	Prairie montagnarde mésohydrique à trolle d'Europe, bistorte, et géranium des bois	Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. & Tüxen ex Marschall 1947	38.3	Prairies de fauche de montagne	IC	6520	Prairies de fauche de montagne
	Communautés subalpines eutrophes							
	17	Prairie subalpine eutrophe pâturée à pâturin des Alpes	Poion alpinae Gams ex Oberdorfer 1950	36.52	Pâturages à Liondent hispide	NC		
	communautés piétinées eutrophes							
	18	Pelouse piétinée des chemins forestiers à prunelle vulgaire et plantain majeur	Lolio perennis-Plantaginion majoris Sissingh 1969	87.2	zones rudérales	NC		
	19	Pelouse piétinée montagnarde des chemins forestiers à plantain majeur et gnaphale des forêts	Lolio perennis-Plantaginion majoris Sissingh 1969	87.2	zones rudérales	NC		
	242	étalé	Poion supinae Rivas Mart. & Géhu 1978	87.2	zones rudérales	NC		
Pelouses calcicoles nordiques et orophiles, montagnardes à alpines								
	Communautés méso-hygrophiles subalpines à alpines							
	20	Pelouse basophile subalpine à alpine mésohydrique des pentes faibles à fétuque violacée et trèfle de Thal	Caricion ferrugineae G. Braun-Blanquet & Br.-Bl. 1931	36.411	Pelouses mésophiles à laîche sempervirente	IC	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	21	Pelouse basophile subalpine mésohydrique des pentes faibles à alchémille	Caricion ferrugineae G. Braun-Blanquet & Br.-Bl. 1931	36.411	Pelouses mésophiles à laîche sempervirente	IC	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
	22	Pelouse subalpine calcicole mésohydrique à laîche toujours verte et sénéçon champêtre	Caricion ferrugineae G. Braun-Blanquet & Br.-Bl. 1931	36.411	Pelouses mésophiles à laîche sempervirente	IC	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
	243	Pelouse subalpine des pentes ébouleuses à laîche méridionale	Caricion ferrugineae G. Braun-Blanquet & Br.-Bl. 1931	36.41	Pelouses à laîche ferrugineuse et communautés apparentées	IC	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
	Communautés méso-xérophiles							
	23	de Parlatore, seslérie bleue, épervière tomenteuse	Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.43	Pelouses en gradins et en guirlandes	IC	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
	24	Pelouse rase subalpine d'adret à valériane tubéreuse et tulipe australe	Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.4	Pelouses calcicoles alpines et subalpines			
	25	Pelouse subalpine en gradins à seslérie bleue et avoine des montagnes	Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.43	Pelouses en gradins et en guirlandes	IC	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
	27	Pelouse calcicole subalpine des vires et crêtes rocheuses à laîche des rochers	Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.433	Tapis de laîches en coussinets	IC	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
	244	Pelouse basophile alpine en gradins à fétuque à quatre fleurs	Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.432	Pelouses à Avoine et Seslérie des Alpes méridionales	IC	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
	245	Pelouse basophile alpine des crêtes à laîche des rochers	Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.433	Tapis de laîches en coussinets	IC	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
	26	Pelouse mésophile supraméditerranéenne à montagnarde à seslérie bleue des vires et pentes rocheuses calcaires d'ubac	Seslerion elegantissimae (Vanden Berghen 1963) Barbero, Loisel & Quézel 1972	36.431	Versants à Seslérie et Laîches sempervirentes	NC		
	Communautés mésoxérophiles à xérophiles, thermophiles							
	28	Pelouse calcicole montagnarde à anthyllide des montagnes et globulaire à feuilles en coeur	Ononidion cenisiae Barbero 1972	34.7	Pelouses méditerraneo-montagnardes	NC		
	29	Pelouse calcicole subalpine des crêtes et croupes rocheuses à androsace velue	Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.43	Pelouses en gradins et en guirlandes	IC	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
	30	Pelouse basophile oroméditerranéenne à avoine toujours verte ou avoine de Parlatore	Ononidion cenisiae Barbero 1972	36.432	Pelouses à Avoine et Seslérie des Alpes méridionales	IC	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
	31	Pelouse écorchée oroméditerranéenne à astragale toujours verte et onosma fastigié	Ononidion cenisiae Barbero 1972	31.7E	Landes épineuses à Astragalus sempervirens	IC	4090	Landes oroméditerranéennes endémiques à Genêt épineux
Pelouses arctico-alpines de crêtes ventées, neutro-basophiles et cryophiles								
	32	Pelouse alpine calcicole basophile des crêtes à kobrésia queue de souris	Oxytropido - Elynion myosuroidis Br.-Bl. 1949	36.421	Pelouses alpines à Elyna	IC	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
Pelouses acidiphiles montagnardes, subalpines et alpines								
	Communautés thermophiles subalpines des pentes							
	33	Pelouse subalpine acidophile d'adret à Potentille de Valderi	Festucion variae Br.-Bl. 1926	36.33	Pelouses siliceuses thermophiles subalpines	NC		

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	34	Pelouse acidophile subalpine des pentes à laîche toujours verte, pâturin violacé	Nardion strictae Braun-Blanq. 1926	36.33	Pelouses siliceuses thermophiles subalpines	PR	6230	en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
	35	Pelouse subalpine à fétuque paniculée sur sol profond	Hyperico richeri - Festucion paniculatae De Foucault 2012	36.3312	Pelouses mésophiles des sols profonds à Festuca paniculata	NC		
	36	Pelouse écorchée acidophile subalpine à fétuque paniculée et avoine de Parlatore	Hyperico richeri - Festucion paniculatae De Foucault 2012	36.311	Pelouses xérophiles des versants rocailleux à Festuca paniculata	NC		
	Communautés des dépressions et replats							
	37	Pelouse acidophile subalpine à nard raide des pentes douces et replats	Nardion strictae Braun-Blanq. 1926	36.31	Gazons à Nard raide et groupements apparentés	PR	6230	en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
	38	Pelouse acidophile subalpine à alpine des combes et dépressions à nard raide et vulpin des Alpes	Nardion strictae Braun-Blanq. 1926	36.31	Gazons à Nard raide et groupements apparentés	PR	6230	en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
	246	Pelouse acidophile subalpine à benoîte des montagnes et fenouil des Alpes	Nardion strictae Braun-Blanq. 1926	36.31	Gazons à Nard raide et groupements apparentés	PR	6230	en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
	Communautés alpines climaciques, mésoxérophiles à mésohydriques							
	39	Pelouse alpine silicicole à fétuque de Haller et jonc trifide	Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.342	Pelouses à *Festuca halleri*	IC	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
	40	Pelouse acidophile à laîche toujours verte de l'alpin inférieur sur substrat calcaire ou gréseux	Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.34	Pelouses à laîche courbée et communautés apparentées	IC	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
	41	Pelouse acidophile à kobrésia queue de souris et laîche de Rosa de l'alpin supérieur	Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.421	Pelouses alpines à Elyna	IC	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
	42	Pelouse alpine silicicole de l'alpin supérieur à laîche courbée	Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.341	Pelouses à Carex curvula	IC	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
	43	Pelouse rocailleuse alpine d'ubac à oréochloa fausse seslérie et saxifrage fausse mousse	Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.34	Pelouses à laîche courbée et communautés apparentées	IC	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
Pelouses des combes à neige alpines								
	Communautés acidiphiles							
	44	Combe à neige alpine acidophile à saule herbacé	Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.1112	Communautés acidiphiles des combes à neige alpines à Saule nain	IC	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	45	Combe à neige alpine acidophile à Polytrichum sexangulare	Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.1111	Communautés acidiphiles des combes à neige alpines à mousses	IC	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
	247	Pelouse de combe à neige alpine acidiphile à vulpin de Gérard et laîche fétide	Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.1111	Communautés acidiphiles des combes à neige alpines à mousses	IC	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
	248	Pelouse de combe à neige alpine acidiphile hygrophile à pâturin étalé et céreste faux céreste	Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.1111	Communautés acidiphiles des combes à neige alpines à mousses	IC	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
	249	Pelouse de combe à neige alpine acidiphile à alchémille à cinq feuilles et saule herbacé	Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.1111	Communautés acidiphiles des combes à neige alpines à mousses	IC	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
		Communautés neutro-basophiles						
	46	Combe à neige alpine basophile à saules nains	Arabidion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.122	Communautés des combes à neige sur calcaires, à Saules en espaliers	NC		
	250	Pelouse de combe à neige alpine basophile à arabette bleue	Arabidion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	36.122	Communautés des combes à neige sur calcaires, à Saules en espaliers	NC		
Pelouses préforestières et ourlets								
	Communautés acidoclines à acidiphiles							
	47	Ourlet acidocline à oeillet de Séguier et persil de cerf	Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962	34.41	Lisières xéro-thermophiles	NC		
	48	Ptéridaie sur silice à fougère aigle et oeillet de Séguier	Melampyro pratensis - Holcetalia mollis Passarge 1979	31.86	Landes à Fougères	NC		
	Communautés basophiles							
	49	Ourlet basophile méso à supraméditerranéen à peucédan de Vénétie	Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962	34.41	Lisières xéro-thermophiles	NC		
	264	Ourlet mésophile supraméditerranéen à seslérie argentée	Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962	34.41	Lisières xéro-thermophiles	NC		
	265	Ourlet basophile xérophile supraméditerranéen à montagnard à buplèvre penché	Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962	34.41	Lisières xéro-thermophiles	NC		
	251	Ourlet basophile montagnard à subalpin des pentes ravinées à calamagrostide bigarrée et adénostyle glabre	Knaution gracilis Julve 1993 nom. inval.	34.4	Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles	NC		
	252	intermédiaire	Trifolion medii Th.Müll. 1962	34.42	Lisières mésophiles	NC		
Garrigues, Garides et landes								
Garrigues thermo- à mésoméditerranéennes								
	50	Garrigue à ciste cotonneux, jasmin buissonnant	1934	32.431	Garrigues à Cistus albidus	NC		

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	51	Garide supraméditerranéenne thermophile à stéhéline douteuse, aspérule pourpre, genêt cendré	Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae Barbero, Loisel & Quézel 1972	32.62	Garrigues à Genista cinerea	NC		
Garides supraméditerranéennes à oroméditerranéennes								
	53	Garide supraméditerranéenne mésophile à genêt cendré, lavande à feuilles étroites	Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae Barbero, Loisel & Quézel 1972	32.62	Garrigues à Genista cinerea	NC		
	54	Garide oroméditerranéenne à genêt cendré	Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae Barbero, Loisel & Quézel 1972	32.62	Garrigues à Genista cinerea	IC	4090	Landes oroméditerranéennes endémiques à Genêt épineux
	55	Garide supraméditerranéenne xérophile interne à euphorbe épineuse, genêt cendré	Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae Barbero, Loisel & Quézel 1972	32.62	Garrigues à Genista cinerea	NC		
Landes subatlantiques à continentales, planitiaires à montagnardes, acidoclines								
	56	Lande supraméditerranéenne thermophile à bruyère arborescente, genêt d'Allemagne	Genistion tinctorio - germanicae de Foucault 1990	31.22	Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune	IC	4030	
Landes arctico-alpines et subarctico-subalpines, acidophiles								
	Communautés subalpines d'ubac							
	57	Lande subalpine acidophile d'ubac à rhododendron ferrugineux, airelle des marais	Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930	31.42	Landes à Rhododendron	IC	4060	
	Communautés subalpines d'adret							
	58	Lande subalpine acidophile d'adret à genévrier nain, raisin d'ours	Juniperion sibiricae Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Sissingh & Vlieger 1939	31.431	Fourrés à Juniperus communis subsp. nana	IC	4060	
	Communautés alpines							
	59	Landine alpine acidophile à airelle des marais	Loiseleurio procumbentis - Vaccinion uliginosi subsp. microphylli Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & Jenny 1926	31.44	Landes à Empetrum et Vaccinium	IC		
Friches, ourlets et clairières nitrophiles								
Végétation herbacée pionnière des chablis et des coupes forestières, nitrophile et héliophile								
	60	Ourlet et clairière mésophile montagnarde à sénéçon de Fuchs	Epilobion angustifolii Tüxen ex Eggler 1952	31.8711	Clairières à Epilobes et Digitales	NC		
	61	Ourlet et clairière mésophile montagnarde à épilobe à feuilles étroites	Epilobion angustifolii Tüxen ex Eggler 1952	31.8711	Clairières à Epilobes et Digitales	NC		
	256	Clairière et lisière forestière montagnarde à framboisier	Epilobion angustifolii Tüxen ex Eggler 1952	31.8711	Clairières à Epilobes et Digitales	NC		
	62	Ourlet et clairière nitrophile montagnarde à belladonne	Atropion belladonnae Aichinger 1933	31.8712	Clairières à Bardane et Belladonne	NC		
Végétation d'ourlets nitrophiles des sols plus ou moins humides								
	Communautés hygroclines, hémihéliophiles							
	63	Ourlet nitrophile montagnard à cerfeuil des prés	Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons.	37.72	Franges des bords boisés ombragés	IC	6430	Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	64	Ourlet eutrophe en nappe à chérophylle doré	Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons.	37.72	Franges des bords boisés ombragés	IC	6430	Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
	65	Ourlet nitrophile à égopode podagraire	Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons.	37.72	Franges des bords boisés ombragés	IC	6430	Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
	Communautés sciaphiles							
	66	Ourlet nitrophile hémisciaphile à alliaire officinale	Geo urbani - Alliarion petiolatae Lohmeyer & Oberdorfer ex Görs & Müller 1969	37.72	Franges des bords boisés ombragés	IC	6430	Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Végétation rudérale, anthropogène, nitrophile à dominance d'espèces vivaces, eurosibérienne et méditerranéenne								
	Communautés très nitrophiles des reposoirs et stations fortement influencées par le bétail aux étages montagnard et subalpin							
	67	Pelouse nitrophile et reposoir subalpin à chénopode bon-Henri	Rumicion pseudalpini Rübel ex Scharfetter 1938 corr. Loidi & Biurrun 1996	87.2	zones rudérales	NC		
	68	Friche nitrophile subalpine à patience alpine	Rumicion pseudalpini Rübel ex Scharfetter 1938 corr. Loidi & Biurrun 1996	37.88	Communautés alpines à Patience alpine	NC		
	69	Friche nitrophile à scrophulaire de Printemps		87.2	zones rudérales	NC		
Végétation nitrophile à dominante d'annuelles et de bisannuelles des stations rudéralisées et irrégulièrement pertubées								
	70	Ourlet nitrophile annuel de pied de falaise à herbe de Sainte-Sophie, brome des toits	Sisymbrion officinalis Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950	87.2	zones rudérales	NC		
	71	Friche nitrophile à rapette couchée	Sisymbrion officinalis Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950	87.2	Zones ruderales	NC		
	72	Friche nitrophile montagnarde de pied de falaise à lamier du Mont Gargano et népéta petit népéta		87.1	Terrains en friche	NC		
	74	Pelouse subnitrophile sur pélites à croisette du Piémont		87.1	Terrains en friche	NC		
Mégaphorbiaies, sources, prairies humides								
Mégaphorbiaies planitiaires à montagnardes, méso-eutrophes, des stations plus ou moins inondables à humides								
	Communautés des berges de cours d'eau							
	75	Mégaphorbiaie supraméditerranéenne à eupatoire chanvrine et menthe à longues feuilles	Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957	37.71	Voiles des cours d'eau	IC	6430	Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
	Communautés de l'amont des cours d'eau à tendance torrentueuse ou des dépressions à alimentation phréatique latérale							
	76	Mégaphorbiaie montagnarde riveraine à pétasite hybride	Petasition officinalis Sillinger 1933	37.714	Communautés riveraines à pétasite	IC	6430	Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Mégaphorbiaies méso-hygrophiles montagnardes à subalpines								
	Communautés montagnardes, neutro-basophiles, intra-forestières							

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	77	Mégaphorbiaie hygrosciaphile à barbe de bouc et pétasite blanc	Arunco dioici - Petasition albi Br.-Bl. & Sutter 1977	37.8	Mégaphorbiaies alpines et subalpines	IC	6430	Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
	Communautés subalpines, héliophiles à sciaphiles							
	78	Mégaphorbiaie subalpine à adénostyle à feuilles d'alliaire	Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926	37.81	Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes	IC	6430	Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
	80	Mégaphorbiaie subalpine à sénéçon de Balbis	Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926	37.81	Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes	IC	6430	Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
	81	Prairie à hautes herbes subalpine à myrrhis odorant et adénostyle à feuilles d'alliaire	Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926	37.81	Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes	IC	6430	Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
	82	Mégaphorbiaie subalpine eutrophe à myrrhis odorant et céphalaire alpine		37.81	Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes	IC	6430	Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Végétation herbacée et bryophytique des sources, ruisseaux et suintements								
	Communautés des sources montagnardes à subalpines des eaux acides							
	83	Source montagnarde à cardamine à feuilles d'asaret et benoîte des ruisseaux	Montio fontanae - Cardaminetalia amarae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928	54.1	Sources	NC		
	84	Source subalpine à alpine des eaux acides à cardamines	Cardamino amarae - Montion fontanae Br.-Bl. 1926	54.112	Sources à Cardamines	NC		
	85	Source subalpine à alpine des eaux acides à Bryum schleicheri	Cardamino amarae - Montion fontanae Br.-Bl. 1926	54.111	Sources d'eaux douces à Bryophytes	NC		
	Communautés des sources montagnardes à subalpines, héliophiles et sténothermes, des sources bien oxygénées							
	86	Végétation fontinale à populage des marais		54.112	Sources à Cardamines	NC		
	87	Source basophile subalpine à alpine à cardamine à feuilles d'asaret et Palustriella spp.	Cratoneurion commutati Koch 1928	54.12	Sources d'eaux dures	PR	7220	
	268	Communauté subalpine à alpine des sources oligotrophes à arabette à feuilles de pâquerette et laîche des régions froides	Cratoneurion commutati Koch 1928	54.12	Sources d'eaux dures	PR	7220	
	Communautés tufogènes							
	88	Formation de tuf à Palustriella commutata	Cratoneurion commutati W.Koch 1928	54.12	Sources d'eaux dures	PR	7220	
	89	Tuf supraméditerranéenne à molinie bleue et choin noirâtre	Adiantion capilli-veneris Braun-Blanq. ex Horvatić 1939	54.12	Sources d'eaux dures	PR	7220	
	90	Formation de tuf méso à supraméditerranéenne à capillaire de Montpellier	Adiantion capilli-veneris Braun-Blanq. ex Horvatić 1939	54.12	Sources d'eaux dures	PR	7220	
Prairies hygrophiles à mésohygrophiles, sur sol oligotrophe à mésotrophe								

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	Communautés montagnardes sur sol paratourbeux basique, oligotrophe							
	91	Prairie humide montagnarde pauvre en nutriments à molinie bleue et dactylorhize de mai	Molinion caeruleae subsp. caeruleae Koch 1926 em. Braun-Blanquet 1947	37.311	Prairies à Molinie sur calcaires	IC	6410	
	Communautés élevées mésohygrophiles méditerranéennes							
	92	Prairie humide méditerranéenne à molinie bleue, scirpe à tête ronde	Molinio arundinaceae-Holoschoenion vulgaris Braun-Blanq. ex Tchou 1948	37.4	PRAIRIES HUMIDES MEDITERRANEENNES à GRANDES HERBES	IC	6420	Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes de Molinio-Holoschoenion
Végétation hygrophile de bas-marais, sur sol tourbeux, paratourbeux ou minéral, oligotrophe à mésotrophe								
	Communautés de bas-marais alcalins à mésotrophes, montagnardes à subalpines							
	93	Bas-marais alcalin montagnard à alpin à cypéracées	Caricion davallianae Klika 1934	54.2	Bas-marais alcalins (tourbieres basses alcalines)	IC	7230	Tourbières basses alcalines
	Communautés de bas-marais acidiclines à acidiphiles, subalpines							
	94	Bas-marais acide subalpin à alpin	Caricion fuscae Koch 1926	54.421	fusca	NC		
	95	Bas-marais acide subalpin à alpin à scirpe cespiteux	Caricion fuscae Koch 1926	54.451	Bas-marais acides alpiens à Trichophorum cespitosum	NC		
	253	Bas-marais acide subalpin à alpin des bordures de lacs à jonc filiforme et laîche noire	Caricion fuscae Koch 1926	54.421	Bas-marais alpins à Carex fusca	NC		
	96	Ceinture lacustre subalpine à alpine acidophile à linaigrette de Scheuchzer	Eriophorion scheuchzeri Hadac 1939	54.41	Ceintures lacustres à Eriophorum scheuchzeri	NC		
	Communautés subalpines à alpines							
	97	Végétation pionnière des bords de torrents alpins à laîche bicolore	Caricion incurvae Br.-Bl. in Volk 1940	54.3	Gazons riverains arctico-alpins	PR	7240	Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae
Végétation vivace rase et amphibie, des bordures de plans d'eau montagnards à alpins, oligotrophe								
	98	Herbier des étangs alpins à rubanier à feuilles étroites	Littorellion uniflorae Koch 1926	22.3114	Communautés flottantes de Sparganium	?		
	99	Végétation eutrophe alpine de plans d'eau asséchés à cresson d'Islande	Littorellion uniflorae Koch 1926	22.31	Communautés amphibies pérennes septentrionales	NC		
		Fourrés arbustifs, fruticées						
Végétation sempervirente, sclérophylle, méditerranéenne, héliophile								
	Communautés thermoméditerranéennes							
	100	Fourré thermophile à pistachier lentisque	Oleo sylvestris - Ceratonion siliquae Braun-Blanq. ex Guin. & Drouineau 1944	32.214	Fruticée à Lentisques	NC		
	Communautés de manteaux des chênaies vertes méditerranéennes (parfois stationnelles, sur rochers et corniches).							
	101	Matorral à genévrier rouge et buis	Rhamno lycioidis - Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975	32.1321	Matorral arborescent, intérieur, à Juniperus phoenicea	IC	5210	Matorrals arborescents à Juniperus spp.
	102	Matorral à genévrier oxycèdre	Rhamno lycioidis - Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975	32.1311	Matorral arborescent interne à Juniperus oxycedrus	IC	5210	Matorrals arborescents à Juniperus spp.

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	103	Fourré mésoméditerranéen à supraméditerranéen xérophile à sumac fustet et prunier de Sainte-Lucie	Rhamno lycioidis - Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975	32.21A3	Fourrés occidentaux à Phillyrea	NC		
Végétation principalement européenne de manteaux arbustifs, fruticées et haies								
	Communautés sous influences méditerranéennes							
	104	Fruticée à Spartier en jonc	1954	32.A	Champs de Spartium junceum	NC		
	106	Fruticée à sumac fustet et corroyère à feuilles de myrte	Pruno spinosae - Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954	31.89	méditerranéens sud-occidentaux	NC		
	Communautés supraméditerranéennes à montagnardes, xérophiles à méso-xérophiles							
	107	Fourré à buis supraméditerranéen basophile	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950	31.82	Fruticées à Buis	IC	5110	Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p)
	108	Fourré à buis et cytise à feuilles sessiles montagnard calcicole	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950	31.82	Fruticées à Buis	IC	5110	Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p)
	109	Fourré à buis et bruyère arborescente silicicole	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950	31.82 x 32.31	Fruticees a Buis / Maquis hauts	NC		
	110	Fourré saxicole montagnard acidicline à tremble et amélanchier à feuilles ovales	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950	31.8125	Autres fruticées intra-alpines à Epine vinette	NC		
	111	Matorral à genévrier commun	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950	32.134	Matorral arborescent à Juniperus communis	IC	5210	Matorrals arborescents à Juniperus spp.
	112	Fourré xéro-thermophile à sumac fustet, prunier de Sainte-Lucie	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950	31.81	Fourrés médio-européens sur sol fertile	NC		
	113	Fourré calcicole supraméditerranéen à montagnard à amélanchier à feuilles ovales	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950	31.8123	rocailleuses à Cotoneaster et Amélanchier	NC		
	114	Fourré montagnard à prunier de briançon	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950	31.81251	Fruticées à Prunus brigantiaca	IC	5110	Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p)
	255	Fourré montagnard des pentes marneuses à argousier et bugrane frutescente	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950	31.8124	Fruticées d'Argousiers	NC		
	282	Lande à genévrier sabine	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950	31.81	Fourrés médio-européens sur sol fertile	NC		
	115	Fruticée supraméditerranéenne à cornouiller rouge, prunellier, églantiers		31.89	méditerranéens sud-occidentaux	NC		
	Communautés sur substrats rocheux, des montagnes sous influence méditerranéenne							
	116	Fourré xéro-thermophile à genévrier thurifère	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950	32.136	Matorral arborescent à Juniperus thurifera	PR	9560 et 5210	(9560 et 5210)-5 Peuplements de Genévrier thurifère alpins du montagnard sous influences méditerranéennes
	Communautés des chablis et coupes forestières							

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	117	Clairière forestière montagnarde à sureau à grappes	Sambuco racemosae - Salicion capreae Tüxen & Neumann in Tüxen 1950	31.872	Clairières à couvert arbustif	NC		
	118	Clairière forestière montagnarde à saule marsault	Sambuco racemosae - Salicion capreae Tüxen & Neumann in Tüxen 1950	31.872	Clairières à couvert arbustif	NC		
Végétation arbustive de l'étage subalpin								
	Communautés de pin mugo calcicoles							
	119	Fourré calcicole subalpin à pin mugo et bruyère des neiges	Rhododendro hirsuti - Pinion mugo Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díáz, Fernández González & Loidi 1991	31.53	Fourrés bas de Pins mugo des Alpes sud-occidentales	PR	4070	* Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
	Communautés de pin mugo silicicoles							
	120	Fourré acidophile subalpin à pin mugo, rhododendron ferrugineux	Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930	31.42	Lande subalpine acidiphile des ubacs à Rhododendron ferrugineum	PR	4070	* Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
	Communautés des versants frais et bords de ruisseaux							
	121	Fourré subalpin mésohygrophile à aulne vert	Alnion viridis A. Schnyd. 1930	31.611	Alpes	NC		
	122	Fourré subalpin des couloirs d'avalanche à saule de Lagger	Alnion viridis A. Schnyd. 1930	31.6213	Brousses alpiennes de Saules élevés	NC		
	Communautés basses des pentes et rocailles sur sol acide							
	123	Fourré subalpin mésohygrophile à saule à feuilles hastées	Salicion helveticae Rübel ex Theurillat in Theurillat, Aeschimann, P. Küpfer & Spichiger 1995	31.6211	Brousses à Saules bas des Alpes	IC	4080	Fourrés de saules subarctiques
Végétation arbustive riveraine à bois tendre, montagnarde								
	124	Saulaie à saule drapé	Salicion incanae Aichinger 1933	44.11	Saussaies pré-alpines	IC	3240	Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
	257	Saulaie à saule pruineux	Salicion incanae Aichinger 1933	24.224	Fourrés et bois des bancs de graviers	IC	3240	Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
		Forêts						
Végétation arborée méditerranéenne, souvent sempervirente et sclérophylle								
	Communautés de chêne vert							
	125	Yeuseraie saxicole à buis, genévrier rouge	Rhamno lycioidis - Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975	45.32	Forêts de Chênes verts supra-méditerranéennes	IC	9340	
	126	Chênaie verte calcicole mésoxérophile à charme-houblon et frêne à fleurs	Fraxino orni-Quercion ilicis Biondi, Casavecchia & Gigante 2003	45.319	Forêts de Chênes verts Illyriennes	IC	9340	Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
	Communautés de pin d'Alep							
	127	Pinède xérophile pionnière de pin d'Alep	Rosmarinion officinalis Br.-Bl. Ex Molinier 1934	42.843	Forêts de Pins d'Alep provenço-ligurienne	NC		
	Communautés de pin maritime							
	128	Pinède calcicole de pin maritime	Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molinier 1934	42.823	Forêts de Pins mésogéens franco-italiennes		9540	Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
Forêts tempérées caducifoliées ou mixtes, collinéennes et montagnardes								
	Communautés supraméditerranéennes de chêne pubescent							
	129	Chênaie pubescente supraméditerranéenne à buis	Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932	41.711	Bois occidentaux de Quercus pubescens	NC		
	130	Chênaie pubescente supraméditerranéenne thermophile à sumac fustet	Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932	41.711	Bois occidentaux de Quercus pubescens	NC		
	131	Chênaie pubescente acidocline à luzule blanc de neige	Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932			NC		
	132	Forêt supraméditerranéenne de chêne pubescent mésoxérophile à seslérie argentée	Carpinion orientalis Horvat 1958	41.73	Bois orientaux de Quercus pubescens	NC		
	133	Forêt supraméditerranéenne de chêne pubescent mésophile avec châtaignier	Carpinion orientalis Horvat 1958	41.73	Bois orientaux de Quercus pubescens	NC		
	Communautés supraméditerranéennes à montagnardes de charme-houblon							
	271	Ostryaie mésoméditerranéenne mésophile à chêne vert	Carpinion orientalis Horvat 1958	41.811	Bois de Charmes houblon méso-méditerranéens			
	134	Ostryaie supraméditerranéenne de pente à seslérie argentée	Carpinion orientalis Horvat 1958	41.812	Bois de Charmes houblon supra-méditerranéens	NC		
	135	Ostryaie supraméditerranéenne mésophile à buis	Carpinion orientalis Horvat 1958	41.812	Bois de Charmes houblon supra-méditerranéens	NC		
	136	Ostryaie montagnarde à sapin et trochiscanthe nodiflore	Fagion sylvaticae Luquet 1926	41.813	Bois de Charmes houblon montagnards	NC		
	137	Charmaie à charme-houblon, charme, ail des ours	Carpinion orientalis Horvat 1958			PR	91E0	*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
	Communautés riveraines des bords de rivières et torrents							
	138	Ripisylve à aulne glutineux et frêne commun	Alnion incanae Pawł. in Pawł., Sokołowski & Wallisch 1928	44.3	Forêts de frênes et d'aulnes des fleuves medio-européens	PR	91E0	*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
	139	Ripisylve à aune blanchâtre	Alnion incanae Pawł. in Pawł., Sokołowski & Wallisch 1928	44.2	Galeries d'aulnes blancs	PR	91E0	*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
	Communautés riveraines des bords de rivières et torrents à bois tendre							
	140	Peupleraie noire sèche sur alluvions	Rubo caesii - Populion nigrae Passarge 1985	44.141	Galeries méditerranéennes de Saules blancs	IC	92A0	Forêts galeries à Salix alba et Populus alba
	Communautés sur éboulis ou en situation de ravins							
	141	Tiliaie sèche à buis sur pente rocheuse ou éboulis calcaire	Tilion platyphylli Moor 1973	41.45	Forêts thermophiles alpiennes et péri-alpiennes mixtes de tilleuls	PR	9180	*Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
	142	Frênaie-érablaie de ravin supraméditerranéenne	Tilio platyphylli-Acerion psudoplatani Klika 1955	41.43	Forêts de pente alpiennes et péri-alpiennes	PR	9180	*Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	143	Forêt de ravin montagnarde à barbe de bouc	Tilio platyphylli-Acerion psudoplatani Klika 1955	41.43	Forêts de pente alpiennes et péri-alpiennes	PR	9180	*Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
	144	Erablaie-tiliaie à scolopendre et lunaire vivace	Tilio platyphylli-Acerion psudoplatani Klika 1955	41.4	Forêts mixtes de pentes et ravins	PR	9180	*Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
	145	Tiliaie hygrosciaphile à buis et ruscus hypoglosse	Tilio platyphylli-Acerion psudoplatani Klika 1955	41.43	Forêts de pente alpiennes et péri-alpiennes	PR	9180	*Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
	Autres communautés de feuillus							
	146	Châtaigneraie thermophile sur pélites	Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932	41.9	Bois de chataigniers	IC	9260	Forêts de Castanea sativa
	147	Châtaigneraie - chênaie pubescente mésohydrique à luzule blanc de neige	Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932	41.9	Bois de chataigniers	IC	9260	Forêts de Castanea sativa
	149	Chênaie sessile-châtaigneraie-pinède sylvestre sur quartzites	Quercion roboris Malcuit 1929	41.9	Bois de chataigniers	IC	9260	Forêts de Castanea sativa
	150	Chênaie sessile-châtaigneraie à noisetier	Quercion roboris Malcuit 1929	41.9	Bois de chataigniers	IC	9260	Forêts de Castanea sativa
	151	Forêt de feuillus montagnarde à chêne pubescent, frêne commun, alisier blanc	Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932	41.711	Bois occidentaux de Quercus pubescens	NC		
	152	Couloir d'avalanche à cytise des Alpes, sorbier des oiseleurs et érable sycomore		31.872	Clairières à couvert arbustif	NC		
	153	Tiliaie collinéenne mésophile sur pélites		41.G	Bois de tilleuls	NC		
	154	Tiliaie - châtaigneraie mésohygrophile, faciès à châtaignier		41.9	Bois de chataigniers	IC	9260	Forêts de Castanea sativa
	155	Tiliaie - châtaigneraie mésohygrophile, faciès à tilleul à grande feuilles		41.G	Bois de tilleuls	NC		
	270	Frênaie- châtaigneraie collinéenne mésohygrophile	Carpinion betuli Issler 1931	41.28	Chênaies-charmaies sud-alpines	IC	9260	Forêts de Castanea sativa
	156	Taillis de noisetier montagnard à vératre noir	Carpinion orientalis Horvat 1958	31.8C	Fourrés de Noisetiers	NC		
	157	Taillis de noisetier montagnard	Fagion sylvaticae Luquet 1926	31.8C	Fourrés de Noisetiers	NC		
	158	Bosquet de Trembles	Corylo avellanae-Populion tremulae (Braun-Blanq. ex Theurillat in Theurillat, Aeschimann, P.Küpfer & Spichiger 1995) Géhu all. prov. et stat. Prov.	41.D	Bois de trembles	NC		
Pinèdes calcicoles à acidophiles, supraméditerranéennes à subalpines								
	Communautés de pin sylvestre							
	159	Pineraie de pin sylvestre supraméditerranéenne, type préalpin occidental	Quercion pubescenti-sessiliflorae Braun-Blanq. 1932	42.591	Forêts péri-alpines à Buis de Pins sylvestres	NC		
	160	Pinède sylvestre supraméditerranéenne calcicole d'ubac à feuillus	Quercion pubescenti-sessiliflorae Braun-Blanq. 1932	42.591	Forêts péri-alpines à Buis de Pins sylvestres	NC		
	161	Pineraie de pin sylvestre supraméditerranéenne à seslérie argentée	Carpinion orientalis Horvat 1958	42.591	Forêts péri-alpines à Buis de Pins sylvestres	NC		

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	162	Pineraie de pin sylvestre montagnarde sur pente rocheuses calcaire d'ubac à seslérie bleue	Erico carneae-Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh & Vlieger 1939	42.58	Forêts mésophiles de Pins sylvestres des Alpes sud-occidentales	NC		
	163	Pineraie de pin sylvestre supraméditerranéenne acidocline à bruyère arborescente, buis		42.591	Forêts péri-alpines à Buis de Pins sylvestres	NC		
	164	Pinède sylvestre collinéenne acidophile à chêne sessile, châtaignier, bouleau	Quercion roboris Malcuit 1929	42.5	Forêts de pins sylvestres			
	166	Pineraie de pin sylvestre montagnarde d'adret sur pente rocheuse siliceuse à canche flexueuse	Deschampsio flexuosae - Pinetum sylvestris Br.-Bl. 1961	42.55	Forêts steppiques intra-alpines à Minuartia	NC		
	167	Pineraie claire de pin sylvestre oroméditerranéenne à bugrane à crête et orchidées	Cephalanthero rubrae-Pinion sylvestris Vanden Berghen 1963 ?	42.591	Forêts péri-alpines à Buis de Pins sylvestres	NC		
	168	Pinède de pin sylvestre xérophile sur terrasse alluviale à astragale esparcette	Ononido rotundifolii-Pinion sylvestris Braun-Blanq. & R.Rich. 1950	42.53	Forêts steppiques intra-alpines à Ononis	NC		
	169	Pré-bois de pin sylvestre calcicole montagnard d'adret post-incendie à avoine de Parlatore	Ononidion cenisiae Barbero 1972	42.58 x 36.432	Forêts mésophiles de Pins sylvestres des Alpes sud-occidentales x Pelouses à Avoine et Seslérie des Alpes méridionales	NC		
	170	Pineraie de pin sylvestre calcicole montagnarde d'ubac à bruyère des neiges	Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh & Vlieger 1939	42.54	Forêts de Pins sylvestre à Erica herbacea	NC		
	171	Pineraie de pin sylvestre acidophile montagnarde d'ubac à myrtille	Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930	42.5	Forêts de pins sylvestres	NC		
	Communautés de pin à crochet							
	172	Pineraie de pin à crochet sur calcaire montagnarde à subalpine à raisin d'ours	Erico carneae-Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh & Vlieger 1939	42.421	Forêts de Pins de montagne des Alpes internes	PR	9430	*Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)
	173	Pinède de pin à crochets d'ubac sur éboulis marneux	Erico carneae-Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh & Vlieger 1939	42.421	Forêts de Pins de montagne des Alpes internes	PR	9430	*Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)
	174	Pineraie de pin à crochets calcicole montagnarde d'ubac à bruyère des neiges	Erico carneae-Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh & Vlieger 1939	42.4212	Forêts de Pins de montagne à Erica herbacea	PR	9430	*Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)
	175	Pineraie de pin à crochet montagnarde sur silice à myrtille	Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930	42.41	Forêts de Pins de montagne à Rhododendron ferrugineux	IC	9430	Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata
	176	Pineraie de pin à crochets silicicole montagnarde d'adret à genévrier nain	Juniperion sibiricae Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Sissingh & Vlieger 1939	42.421	Forêts de Pins de montagne des Alpes internes	IC	9430	*Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	177	Pineraie de pin à crochets silicicole montagnarde d'ubac à rhododendron ferrugineux	Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930	42.41	Forêts de Pins de montagne à Rhododendron ferrugineux	IC	9430	*Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)
Forêts résineuses montagnardes à subalpines								
	Communautés de sapin							
	178	Sapinière montagnarde calcicole méridionale à trochiscanthe nodiflore	Fagion sylvaticae Luquet 1926	42.1113	Sapinières à Trochiscanthes	NC		
	179	Sapinière sèche calcicole à charme-houblon et seslérie argentée	Cephalanthero rubrae - Fagion sylvaticae (Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958) Rameau 1996 nom. inval.	42.12	Sapinières calciphiles	IC	9150	Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion
	181	Pessière-sapinière montagnarde acidophile	Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928	42.131	Sapinières acidiphiles intra-alpines	IC	9410	
	Communautés d'épicéa							
	182	Pessière acidophile subalpine interne à myrtille	Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928	42.21	Pessières sub-alpines des Alpes	IC	9410	
	183	Pessière-mélézein d'ubac, calcicole, du montagnard supérieur		42.2 x 42.322	Pessières x Forêts de Mélèzes sur calcaires	NC		
	184	Pessière d'adret calcicole du montagnard supérieur à calamagrostide bigarrée	Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh & Vlieger 1939	42.222	Pessières montagnardes intra-alpines calciphiles	NC		
	Communautés de mélèze et pin cembro							
	185	Cembraie subalpine sur barre rocheuse siliceuse	Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930	42.3	Forêts de mélèzes et d'arolles	IC	9420	Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
	186	Forêt de mélèze subalpine calcicole	Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930	42.3	Forêts de mélèzes et d'arolles	IC	9420	
	187	Forêt de mélèze et pin cembro subalpine acidophile à calamagrostis villeux	Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930	42.3	Forêts de mélèzes et d'arolles	IC	9420	Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
	188	Forêt de mélèze et pin cembro subalpine acidophile à rhododendron ferrugineux	Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930	42.3	Forêts de mélèzes et d'arolles	IC	9420	Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
	189	Forêt de mélèze acidophile du subalpin sur pente forte, à fétuque jaunâtre	Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930	42.3	Forêts de mélèzes et d'arolles	IC	9420	Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
	190	Forêt de mélèze subalpine acidophile d'adret à genévrier nain	Juniperion sibiricae Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Sissingh & Vlieger 1939	42.316	Forêts de Mélèzes et d'Arolles avec Genévriers nains	IC	9420	Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
	191	Forêt de mélèze et de sapin du subalpin inférieur à sous-bois de hautes herbes	Groupement à Larix decidua, Geranium sylvaticum et Chaerophyllum hirsutum Sandoz & Barbero 1974	42.3	Forêts de mélèzes et d'arolles	NC		
	192	Forêt de mélèze du subalpin inférieur à renoncule à fruits crochus et myosotis des bois		42.3	Forets de melezes et d'arolles	NC		
	193	Forêt de mélèze du subalpin inférieur sur pelouse à seslérie bleue	Seslerion caeruleae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H.Jenny 1926	42.3	Forets de melezes et d'arolles	NC		

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	194	Pré-bois de mélèze sur pelouse à fétuque paniculée		42.3	Forêts de mélèzes et d'arolles	NC		
	195	Pré-bois de mélèze montagnard sur pelouse à brachypode rupestre	Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons.	42.3	Forêts de mélèzes et d'arolles	NC		
	196	Prébois de mélèze subalpin acidophile sur pelouse à nard raide	Nardion strictae Braun-Blanq. 1926					
	197	Forêt de mélèze montagnarde à subalpine à framboisier		42.3	Forêts de mélèzes et d'arolles	NC		
	199	Forêt de mélèze montagnarde acidophile, xérophile	Deschampsio flexuosae-Pinion sylvestris Braun-	42.3	Forêts de mélèzes et d'arolles	NC		
	200	Mélézein acidophile montagnard à sous-bois graminéen		42.3	Forêts de mélèzes et d'arolles	NC		
	201	Pré bois de mélèze sur prairie montagnarde à trolle d'Europe et bistorte		38.3	Prairies de fauche de montagne	IC		
	203	Pré-bois de mélèze calcicole sur pelouse à primevère intriquée		42.3 x 36.411	Forêts de mélèzes et d'arolles x Pelouses mésophiles à laîche sempervirente	IC	9420	Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
	204	Forêt de mélèze calcicole subalpine d'ubac à pin mugo et rhododendron ferrugineux		42.3 x 31.53	Forêts de mélèzes et d'arolles x Fourrés bas de Pins mugo des Alpes sud-occidentales	IC	9420	Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
		Milieux rocheux						
Végétation vivace chasmophytique des parois								
	Communautés calcicoles thermo- à mésoméditerranéennes							
	205	Falaise calcaire méditerranéenne thermophile à phagnales	Asplenion glandulosi Br.-Bl. & Meier in Meier & Br.-Bl. 1934	62.1111	Falaises calcaires ibéro-méditerranéennes	IC		
	Communautés humo-épilithiques mésohydriques mésoméditerranéennes							
	206	[illegible] cambrien et bryophytes	[illegible] Roussine & Nègre 1952	62.1115	[illegible] fougères	IC	8210	[illegible] végétation chasmophytique
	Communautés basophiles héliophiles supra- et oroméditerranéennes							
	207	Falaise calcaire supraméditerranéenne à subalpine à saxifrage à feuilles en languette	Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951	62.13	Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins	IC	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
	210	Balme calcaire mésoméditerranéenne à montagnarde à primevère d'Allioni et Moehringie	Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951	62.13	Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins	IC	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
	211	Falaise calcaire méso à supraméditerranéenne à potentille saxifrage	Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951	62.13	Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins	IC	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
	212	Falaise calcaire thermophile à ballote buissonnante	Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951	62.13	Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins		8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
	213	Falaise calcaire supraméditerranéenne à saxifrage à feuilles en cuiller	Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951	62.13	Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins	IC	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
	214	Falaise calcaire subalpine des Alpes ligures à siléne campanule et saxifrage fausse diapensie	Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951	62.13	Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins	IC	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	Communautés basophiles héliophiles subalpines à alpines (subnivales)							
	215	Falaise calcaire subalpine à alpine à raiponce de Charmeil	Potentillion caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	62.151	Falaises calcaires ensoleillées des Alpes	IC	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
	258	Falaise calcaire alpine à primevère marginée et valériane à feuilles de saule	Potentillion caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	62.151	Falaises calcaires ensoleillées des Alpes	IC	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
	Communautés collinéennes à subalpines, en stations ombragées, fraîches							
	216	Falaise calcaire montagnarde à subalpine sciaphile moussue à asplenium vert et cystoptéris fragile	Violo biflorae - Cystopteridion alpinae F. Casas 1970	62.152	Falaises calcaires médio-européennes à Fougères	IC	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
	217	Microphorbiaie à violette à deux fleurs et saxifrage à feuilles rondes	Violo biflorae - Cystopteridion alpinae F. Casas 1970	62.152	Falaises calcaires médio-européennes à Fougères	IC	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
	Communautés acidophiles continentales collinéennes et montagnardes							
	218	Falaise siliceuse supraméditerranéenne à asplénium septentrional	Asplenion septentrionalis Oberdorfer 1938	62.21	Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes	IC	8220	
	Communautés subalpines et alpines							
	220	Falaise siliceuse subalpine d'adret à silene à feuilles en coeur et gaillet de Tende	Saxifragion pedemontanae Barbero & Bono 1967	62.23	Falaises siliceuses des Alpes sud-occidentales	IC	8220	
	221	Falaise siliceuse subalpine à alpine d'ubac à saxifrage du piémont et saxifrage à fleurs nombreuses	Saxifragion pedemontanae Barbero & Bono 1967	62.23	Falaises siliceuses des Alpes sud-occidentales	IC	8220	
Végétation des éboulis plus ou moins mobiles								
	Communautés calcicoles xérothermophiles mésoméditerranéennes							
	222	Eboulis et pierrier calcaires mésoméditerranéens thermophiles à centranthe rouge et géranium pourpre	Pimpinello tragium-Gouffeion arenarioidis Braun-Blanq. in Braun-Blanq. , Roussine & Nègre 1952	61.32	Eboulis provençaux	IC	8130	Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
	Communautés calcicoles thermophiles supraméditerranéennes à montagnardes							
	223	Eboulis calcaire supraméditerranéen à montagnard à calamagrostide argentée	Stipion calamagrostis Jenny-Lips ex Quantin 1932	61.311	Eboulis à Stipa calamagrostis	IC	8130	Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
	224	Eboulis supraméditerranéen à montagnard thermophile à centranthe à feuilles étroites	Stipion calamagrostis Jenny-Lips ex Quantin 1932	61.311	Eboulis à Stipa calamagrostis	IC	8130	Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
	Communautés calcicoles supraméditerranéennes à montagnardes des versants frais							
	225	Eboulis calcaire montagnard d'ubac frais à gymnocarpium herbe-à-Robert	Scrophularion juratensis Béguin ex Richard 1971	61.3123	Eboulis calcaires à Fougères	PR	8160	*Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
	226	Eboulis calcaire supraméditerranéen à montagnard frais à géranium à racine épaisse	Scrophularion juratensis Béguin ex Richard 1971	61.3123	Eboulis calcaires à Fougères	PR	8160	*Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
	Communautés calcicoles montagnardes à subalpines des éboulis fins							
	227	Eboulis et roubine calcaires montagnards à subalpins à éléments fins à fétuque dimorphe	Petasition paradoxi Zollitsch ex W.Lippert 1966	61.23	Eboulis calcaires fins	IC	8120	Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	Communautés subalpines à nivales des Alpes							
	228	Eboulis calcaire subalpin à alpin à éléments fins et roubine à bérardie laineuse	Thlaspion rotundifolii Jenny 1930	61.2322	Eboulis à Berardia	IC	8120	Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)
	229	Eboulis calcaire subalpin à alpin à éléments moyens à tabouret à feuillles rondes	Thlaspion rotundifolii Jenny 1930	61.2	Eboulis calcaires alpiens	IC	8120	Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)
	Communautés montagnardes à alpines sur gros blocs souvent stables (moraines, lapiaz...)							
	272	Eboulis calcaire à éléments moyens et gros des situations froides à fougères	Dryopteridion submontanae Rivas Mart., T.E.Diáz, F.Prieto, Loidi & Penas 1984	61.3123	Eboulis calcaires à Fougères	IC	8120	Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)
	Communautés silicicoles xérothermophiles supraméditerranéennes							
	230	Eboulis siliceux supraméditerranéen thermophile à notholaène de Maranta		61.3	Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles	IC	8130	Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
	Communautés silicicoles montagnardes et subalpines des stations fraîches							
	231	Eboulis siliceux montagnard à subalpin à gros blocs à framboisier et allosore crépu	Allosuro crispi - Athyrion alpestris Nordhagen 1936 nom. inval.	61.114	Eboulis siliceux et froids de blocailles	IC	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
	232	Eboulis siliceux montagnard frais à éléments moyens à géranium à racine épaisse	Allosuro crispi - Athyrion alpestris Nordhagen 1936 nom. inval.	61.11	Eboulis siliceux alpins	IC	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
	Communautés silicicoles thermophiles subalpines							
	233	Eboulis siliceux subalpin thermophile à éléments moyens	Senecionion leucophylli Br.-Bl. 1948	61.11	Eboulis siliceux alpins	IC	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
	Communautés silicicoles subalpines à subnivales des stations fraîches							
	234	Eboulis siliceux alpin à éléments moyens à gros à adénostyle à feuilles blanches et achillée herbe trouée	Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	61.11	Eboulis siliceux alpins	IC	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
	235	Eboulis siliceux alpin à éléments fins à violette de l'Argentera	Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	61.1112	Eboulis du sud-ouest des Alpes à Oxyria digyna	IC	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
	236	Eboulis siliceux alpin à éléments fins à androsace des Alpes	Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	61.112	Eboulis à Androsace alpina	IC	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
	259	Eboulis siliceux alpin à éléments fins longuement enneigé à luzule rouge-brun	Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926	61.113	Eboulis à Luzule alpine	IC	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
Communautés des bancs de galets et sables des torrents et cours d'eau								

	N° Fiche	Intitulé de l'habitat	Rattachement phytosociologique (alliance ou niveau supérieur)	Code Cor. Biot.	Intitulé Cor. Biot.	Statut Eur 27	Code Eur 27	Intitulé Eur 27
	Communautés collinéennes à alpines							
	237	Banc de graviers à astragale esparcette	Epilobion fleischeri G.Braun-Blanq. ex Braun-Blanq. 1949	24.22	Bancs de graviers végétalisés	IC	3220	Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée
	238	Banc de graviers à épilobe de Fleischer	Epilobion fleischeri G.Braun-Blanq. ex Braun-Blanq. 1949	24.221	Groupements d'Epilobes des rivières subalpines	IC	3220	Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée

2. Fiches habitats

Code:78	Mégaphorbiaie subalpine à adénostyle à feuilles d'alliaire	
Rattachement phytosociologique au niveau association Hugueninio tanacetifoliae - Adenostyletum alliariae Lacoste 85		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926
CORINE biotope	37.81	Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes
Natura 2000	6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Cahiers d'habitats	6430-8	Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines des Alpes, du Jura, des Vosges et du Massif central
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'espèces protégées : Doronicum austriacum, Delphinium dubium, Cirsium alsophilum.

Menaces
Eutrophisation et dégradation dues à la surfréquentation des zones humides par les troupeaux bovins.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
QUEZEL, 1950
LACOSTE, 1975

Ecologie

Formation hygrophile généralement présente en contexte sylvatique (pré-bois de mélèzes, pessières), à proximité d'un point d'eau, en bordure de ruisseau, entre 1600 et 2000 m. d'altitude. Substrat siliceux ou calcaire. Sol riche en humus, à teneur en eau élevée.

Cortège floristique
Achillea macrophylla L., 1753
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871
Carduus personata (L.) Jacq., 1776
Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch, 1837
Cirsium alsophilum (Pollini) Greuter, 2003
Delphinium dubium (Rouy & Foucaud) Pawl., 1934
Descurainia tanacetifolia (L.) Prantl, 1892
Doronicum austriacum Jacq., 1774
Imperatoria ostruthium L., 1753
Lactuca alpina (L.) Benth. & Hook.f., 1876
Phyteuma ovatum Honck., 1782
Ranunculus platanifolius L., 1767

Physionomie de l'habitat

Formation de hautes herbes jusqu'à deux mètres de hauteur, souvent dominée par Adenostyles alliariae. Dans le massif de l'Argentera, Cirsium alsophilum (=Cirsium montanum) peut constituer un faciès. Une strate arbustive est parfois présente, avec Alnus alnobetula, Ribes petraeum, Sorbus aucuparia.

Variabilité et affinité de l'habitat

Cette association endémique des Alpes du sud englobe en tant que variante à Cirsium alsophilum le Cirsio montani - Adenostyletum alliariae Quézel 1950.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:80	Mégaphorbiaie subalpine à séneçon de Balbis	
Rattachement phytosociologique au niveau association Tephroserido balbisianae - Peucedanetum ostruthii Quézel 1950		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926
CORINE biotope	37.81	Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes
Natura 2000	6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Cahiers d'habitats	6430-8	Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines des Alpes, du Jura, des Vosges et du Massif central
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Association endémique du massif de l'Argentera. Présence d'espèces protégées : Tephroseris balbisiana, Tozzia alpina.

Menaces
Eutrophisation et dégradation dues à la surfréquentation des zones humides par les troupeaux bovins.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
QUEZEL, 1950

Ecologie

Association hygrophile et héliophile des bords de torrents, des pentes rocheuses raides humides, à l'étage subalpin en situation asylvatique, entre 2000 et 2450 m. d'altitude, sur substrat siliceux.

Cortège floristique
Chaerophyllum elegans Gaudin, 1828
Descurainia tanacetifolia (L.) Prantl, 1892
Imperatoria ostruthium L., 1753
Tephroseris balbisiana (DC.) Holub, 1973
Veratrum album subsp. lobelianum (Bernh.) K.Richt., 1890

Physionomie de l'habitat

Formation de hautes herbes composée de Tephroseris balbisiana généralement dominant, avec Chaerophyllum elegans, Imperatoria ostruthium, Veratrum lobelianum, Gentiana burserii subsp. villarsii.

Dynamique de la végétation

Formation stable

Etat de la connaissance

Bonne

Code:81	Prairie à hautes herbes subalpine à myrrhis odorant et adénostyle à feuilles d'alliaire	
Rattachement phytosociologique au niveau association Myrrhido odoratae - Adenostyletum alliariae Braun-Blanquet 1969		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926
CORINE biotope	37.81	Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes
Natura 2000	6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Cahiers d'habitats	6430-8	Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines des Alpes, du Jura, des Vosges et du Massif central
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Ubaye

Intérêt patrimonial
Fort. Présen,ce d'une espèce de l'annexe II de la directive Habitats : Eryngium alpinum.

Menaces
Surpâturage ovin.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BRAUN-BLANQUET, 1969

Ecologie

Petits replats, bas de pentes humides où la neige s'amasse et où séjourne l'eau de ruissellement, entre 1800 et 2000 m. d'altitude, en exposition nord, sur flysch argilo-calcaire.

Physionomie de l'habitat

Prairie à hautes herbes, souvent dominée par la grande ombellifère Myrrhis odorata, ou Adenostyles alliariae, avec comme combinaison caractéristique Tephroseris integrifolia subsp. capitata, Descurainia tanacetifolia, Achillea distans. Le groupement comprend en outre de nombreuses espèces prairiales montagnardes : Trisetum flavescens, Polygonum bistorta, Trollius europaeus, Centaurea montana.

Cortège floristique
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd., 1803
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871
Cirsium alsophilum (Pollini) Greuter, 2003
Descurainia tanacetifolia (L.) Prantl, 1892
Eryngium alpinum L., 1753
Myrrhis odorata (L.) Scop., 1771
Tephroseris integrifolia subsp. capitata (Wahlenb.) B.Nord., 1978

Etat de la connaissance

Moyenne. A rechercher dans les Alpes-Maritimes.

Code:90	Formation de tuf méso à supraméditerranéenne à capillaire de Montpellier	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Adiantion capilli-veneris Braun-Blanq. ex Horvatic 1939
CORINE biotope	54.12	Sources d'eaux dures
Natura 2000	7220	Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
Cahiers d'habitats	7220-1	Communautés des sources et suintements carbonatés
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen,Supraméditerranéen

Répartition
Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Très fort. Présence de l'endémique protégé Pinguicula longifolia subsp. reichenbachiana. Présence du mollusque Macrogastra attenuata euzieriana dans la Bendola.

Menaces
- Très menacé et en régression sur l'ensemble de son aire, par des causes anthropiques (pollutions, prélèvement d'eau domestique, modification du régime hydrique des cours d'eau) et naturelles (épisodes de sécheresse longs et répétés). La pratique du canyoning et de la randonnée aquatique contribuent à la fragilisation et la dégradation de l'habitat.
- Développement d'une espèces envahissante, Pinguicula hirtiflora, dans les gorges de Paganin.

Enjeu de conservation
Très fort

Bibliographie

Ecologie

Dépôts de tufs calcaires formés au voisinage des sources et résurgences, au pied des cascades, sur la surface émergée des rochers, dans le lit des ruisseaux.
Le bicarbonate de calcium contenu dans l'eau qui ruissèle sur les parois précipite au contact de bryophytes tufogènes dont les tiges se chargent d'incrustations. Formations atteignant leur développement optimal dans les stations bien protégées du soleil, où l'alimentation en eau est pratiquement constante. Etages méso et supraméditerranéen sur calcaire.

Cortège floristique
Adiantum capillus-veneris L., 1753
Conocephalum conicum (L.) Dumort.
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.
Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.
Pinguicula longifolia subsp. reichenbachiana (Schindl.) Casper, 1962

Physionomie de l'habitat

Aspects divers : monticules de tuf, cascade, parois travertinisées dans les canyons. La strate herbacée est pauvre en espèces, dominée par la fougère Adiantum capillus-veneris, et localement des grassettes (Pinguicula longifolia subsp. reichenbachiana, Pinguicula hirtiflora). Les secteurs en voie d'assèchement sont colonisés par Schoenus nigricans et Molina caerulea. Strate bryophytique très recouvrante, dominée par Palustriella commutata, Eucladium verticillatum ou Hymenostylium recurvirostre.

Dynamique de la végétation

Cet habitat est stable, tant qu'est maintenue une alimentation hydrique suffisante. En cas d'assèchement, les communautés bryophytiques dépérissent rapidement. Les tufs en voie d'assèchement sont colonisés par Molinia caerulea et Schoenus nigricans.

Variabilité et affinité de l'habitat

Faciès évolué à Schoenus nigricans et Molinia caerulea constituant des prairies verticales, colonisant les tufs en voie d'assèchement.

Code:63	Ourlet nitrophile montagnard à cerfeuil des prés	
Rattachement phytosociologique au niveau association Anthriscetum sylvestris Hadàc 1978		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons.
CORINE biotope	37.72	Franges des bords boisés ombragés
Natura 2000	6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Cahiers d'habitats	6430-6	Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée

Intérêt patrimonial
Moyen

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Lisière externe des forêts supraméditerranéenne à montagnardes, pieds de haies, en situation semi-héliophile, sur sol frais et profond, eutrophe.

Cortège floristique
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Urtica dioica L., 1753

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée de hautes herbes nitrophiles dominée par Anthriscus sylvestris.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:64	Ourlet eutrophe en nappe à chérophylle doré	
Rattachement phytosociologique au niveau association Chaerophylletum aurei Oberdorfer 1957		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons.
CORINE biotope	37.72	Franges des bords boisés ombragés
Natura 2000	6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Cahiers d'habitats	6430-6	Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Moyen

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Prairies de fauche montagnardes abandonnées, lisières et clairières, jusqu'à 1850 mètres d'altitude, sur sol frais, profond, eutrophe. Indifférent à la géologie du substrat.

Cortège floristique
Aegopodium podagraria L., 1753
Chaerophyllum aureum L., 1762
Geranium phaeum L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée de hautes herbes nitrophiles, dominée par l'ombellifère Chaerophyllum aureum.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:65	Ourlet nitrophile à égopode podagraire	
Rattachement phytosociologique au niveau association Urtico dioicae - Aegopodietum podagrariae (Tüxen 1963) Oberd. 1964 in Görs 1968		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons.
CORINE biotope	37.72	Franges des bords boisés ombragés
Natura 2000	6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Cahiers d'habitats	6430-6	Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Moyen. Habitat non fréquent.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Lisière hémi-sciaphile de forêt de feuillus, de 500 m à 1000 m. d' altitude. Sur sol frais, profond, eutrophe.

Cortège floristique
Aegopodium podagraria L., 1753
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Urtica dioica L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée de hautes herbes nitrophiles dominée par l'ombellifère Aegopodium podagraria.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:231	Eboulis siliceux montagnard à subalpin à gros blocs à framboisier et allosore crépu

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Rubo idaei - Dryopteridetum disjunctae Lacoste 1975	Allosuro crispi - Athyrion alpestris Nordhagen 1936 nom. inval.

CORINE biotope	61.114	Eboulis siliceux et froids de blocailles
Natura 2000	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
Cahiers d'habitats	8110-5	Éboulis siliceux montagnards à subalpins frais, des Alpes, du Massif central et des Vosges
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
A préciser

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LACOSTE, 1975

Ecologie

Eboulis de gros blocs siliceux, entre 1600 et 2100 m. d'altitude, à des expositions diverses.

Physionomie de l'habitat

Végétation herbacée au faible recouvrement (5 à 15 %), caractérisé par le framboisier Rubus idaeus, et plusieurs espèces de fougères s'implantant dans les fissures et interstices frais comblés par des matériaux fins : Dryopteris filix-mas, Cryptogramma crispa, Gymnocarpium dryopteris, Cystopteris fragilis.

Dynamique de la végétation

Caractère plus ou moins permanent du groupement. Les marges de ces éboulis peuvent être peu à peu colonisées par des landes à Juniperus communis subsp. nana, suivies par des pineraies à pin sylvestre et pin à crochet.

Cortège floristique
Cryptogramma crispa (L.) R.Br., 1842
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, 1851
Minuartia villarii (Balb.) Wilczek & Chenevard, 1912
Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799
Rubus idaeus L., 1753
Saxifraga exarata Vill., 1779

Etat de la connaissance

Bonne

Code:232	Eboulis siliceux montagnard frais à éléments moyens à géranium à racine épaisse

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A définir	Allosuro crispi - Athyrion alpestris Nordhagen 1936 nom. inval.

CORINE biotope	61.11	Eboulis siliceux alpins
Natura 2000	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Type d'éboulis rare et original, caractérisé par Geranium macrorrhizum, une espèce protégée en limite d'aire.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Eboulis et pierriers composés de blocs à éléments moyens à gros, stabilisés, dont les fissures et interstices sont colmatées par des éléments fins. Exposition nord, entre 1300 et 1500 m. d'altitude.

Cortège floristique
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836
Geranium macrorrhizum L., 1753
Sedum montanum Perrier & Songeon, 1864
Sempervivum montanum L., 1753

Physionomie de l'habitat

Végétation herbacée au recouvrement faible (20 %) caractérisée par l'abondance de Geranium macrorrhizum, se répérant de loin lors de la floraison, accompagné d'espèces crassulescentes comme Sempervivum montanum et Sedum montanum.

Dynamique de la végétation

La marge des éboulis est colonisée par un groupement arbustif à Laburnum alpinum, Sorbus aucuparia.

Variabilité et affinité de l'habitat

Ce type d'éboulis s'apparente au Rubo idaei-Dryopteridetum disjunctae Lacoste 1975, groupement des éboulis subalpins à gros blocs riche en fougères.

Etat de la connaissance

Faible

Code:138	Ripisylve à aulne glutineux et frêne commun

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Alnion incanae Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928

CORINE biotope	44.3	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Natura 2000	91	
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Forêts riches et floristiquement diversifiées.
Présence potentielle de Lathraea squamaria en sous-bois.
Les ripisylves accueillent de nombreux chiroptères (corridors écologiques, lieux de chasse, gîtes pour les espèces arboricoles) et oiseaux inféodés aux rivières et zones humides.

Menaces
Aménagements, travaux d'entretien des berges, modification du régime hydrique des cours d'eau, création de seuils et de micro-centrales hydroélectriques, endiguement.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Berges larges des rivières, sur sol alluvionnaire sablo-limoneux profond et humide, de 300 à 700 m d'altitude. Humidité atmosphérique élevée, situation confinée en fond de vallon.

Cortège floristique
Aegopodium podagraria L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Buxus sempervirens L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Evonymus latifolius (L.) Mill.
Fraxinus excelsior L., 1753
Geranium nodosum L., 1753
Mercurialis perennis L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771

Physionomie de l'habitat

Formation arborescente linéaire structurée par de grands arbres : Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior accompagnés par Tilia platyphyllos, Betula pendula, Salix eleagnos, Salix fragilis, Populus nigra.
Sous-bois arbustif diversifié : Cornus sanguinea, Evonymus latifolius, Buxus sempervirens, Ligustrum vulgare. Sous-bois herbacé mésophile avec Geranium nodosum, Aegopodium podagraria.

Dynamique de la végétation

Liée aux crues des cours d'eau. Les stades pionniers sont favorisés par les remaniements du lit majeur des cours d'eau.

Etat de la connaissance

Faible

Code:139	Ripisylve à aune blanchâtre

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Alnion incanae Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928

CORINE biotope	44.2	Galeries d'Aulnes blancs
Natura 2000	91	
Cahiers d'habitats	91E0-4	Aulnaies blanches
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée,Vésubie

Intérêt patrimonial
Les ripisylves accueillent de nombreux chiroptères (corridors écologiques, lieux de chasse, gîtes pour les espèces arboricoles) et oiseaux inféodés aux rivières et zones humides.

Menaces
- Aménagements, travaux d'entretien des berges, modification du régime hydrique des cours d'eau, création de seuils et de micro-centrales hydroélectriques, endiguement.
- Espèces exotiques envahissantes : Buddleja davidii, très présent dans la Vésubie (Roquebilière).

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Berges des rivières et torrents, sur sol alluvionnaire grossier sablo-limoneux riche en éléments grossiers, profond et humide. Ambiance moins confinée que pour la ripisylve à aulne glutineux et frêne. De 300 m. (Tinée) à 1250 m. d'altitude (haut Var).

Physionomie de l'habitat

Formation riveraine linéaire structurée par Alnus incana, avec Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos...
Sous-bois arbustif sciaphile et dense avec Buxus sempervirens, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare...
Sous-bois herbacée diversifiée avec de nombreuses espèces mésohygrophiles : Geranium nodosum, Carex digitata, Salvia glutinosa, Angelica sylvestris, Mercurialis perennis...

Dynamique de la végétation

Liée aux crues du cours d'eau. Les stades pionniers sont favorisés par les remaniements du lit majeur des cours d'eau.

Cortège floristique
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Alnus incana (L.) Moench, 1794
Buxus sempervirens L., 1753
Calamagrostis varia (Schrad.) Host subsp. varia
Corylus avellana L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Geranium nodosum L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Primula vulgaris Huds., 1762
Salix daphnoides Vill., 1779
Salix eleagnos Scop., 1772
Salix purpurea L., 1753
Salvia glutinosa L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771

Etat de la connaissance

Moyen

Code:121	Fourré subalpin mésohygrophile à aulne vert	
Rattachement phytosociologique au niveau association Alnetum viridis Br.-Bl. 1918		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Alnion viridis A. Schnyd. 1930
CORINE biotope	31.611	Fourrés d'Aulnes verts des Alpes
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Habitat rare dans les Alpes du sud.

Menaces
Facteurs naturels (sécheresses).

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Versants humides exposés au nord, soumis à une forte nébulosité. Sol humide toute l'année.

Cortège floristique
Achillea macrophylla L., 1753
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871
Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch, 1872
Carduus personata (L.) Jacq., 1776
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz, 1763

Physionomie de l'habitat

Fourrés arbustifs denses de Alnus alnobetula avec une strate herbacée composée de hautes herbes humides caractéristiques des mégaphorbiaies subalpines.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:122	Fourré subalpin des couloirs d'avalanche à saule de Lagger	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Alnion viridis A. Schnyd. 1930
CORINE biotope	31.6213	Brousses alpiennes de Saules élevés
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Fort, habitat très rare dans les Alpes-Maritimes. Salix laggeri est une espèce protégée. Plusieurs autres espèces patrimoniales endémiques des Alpes sud-occidentales sont susceptibles d'être rencontrées dans cet habitat.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
POLIDORI et BELLONE, 2010

Ecologie

Couloir d'avalanche frais en versant nord sur éboulis stabilisé à dominante de grès, entre 1900 et 2100 m. d'altitude.

Cortège floristique
Clematis alpina (L.) Mill., 1768
Lonicera caerulea L., 1753
Rosa pendulina L., 1753
Salix laggeri Wimm., 1854

Physionomie de l'habitat

Formation arbustive dense de 2-5 m. de haut dominée par Salix laggeri, accompagné de Lonicera coerulea, Ribes petraeum, Rosa pendulina, Sorbus aucuparia. La strate herbacée bien développée surtout dans les trouées est composée d'espèces de sous-bois et de mégaphorbiaies : Aconitum lycoctonum subsp. vulparia, Hieracium prenanthoides, Clematis alpina, Gentiana burseri subsp. villarsii, Gentiana lutea, Geranium sylvaticum, Vaccinium myrtillus, Rubus idaeus, Polygonatum verticillatum, Chaerophyllum villarsii, Lonicera alpigena...

Dynamique de la végétation

Formation pionnière régulièrement rajeunie par les avalanches.

Etat de la connaissance

Moyenne. rattachement phytosociologique à préciser.

Code:3	Pelouse supraméditerranéenne à montagnarde sur dalle calcaire à annuelles	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. & Th.Müll. in Th.Müll. 1961
CORINE biotope	34.11	Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
Natura 2000	6110	Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Roya

Intérêt patrimonial
Habitat d'espèce de Parnassius apollo (DH IV).

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pelouses calcicoles colonisant les dalles, les sommets de rochers et les affleurements rocheux en crête, jusqu'à 1550 m. d'alt.

Physionomie de l'habitat

Phytocénose de pelouse généralement composée d'une communauté de petites plantes vivaces à dominance d'espèces crassulescentes (Sedum spp., Sempervivum spp.), et d'une communauté d'annuelles d'origine méditerranéenne à développement printannier (dont les effectifs sont variables d'une année à l'autre et dépendent des précipitations), riche en espèces des genres Arabis, Veronica, Saxifraga.

Cortège floristique
Arabis auriculata Lam., 1783
Arabis nova Vill., 1779
Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838
Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 1842
Petrorhagia saxifraga (L.) Link, 1829
Saxifraga tridactylites L., 1753
Sedum acre L., 1753
Sedum album L., 1753
Sedum anopetalum DC., 1808
Sempervivum arachnoideum L., 1753
Sempervivum calcareum Jord., 1849
Veronica praecox All., 1789

Dynamique de la végétation

Ces pelouses peuvent être considérées comme stable dynamiquement (pelouses primaires).

Etat de la connaissance

Faible. Association(s) à décrire.

Code:4	Pelouse de pied de paroi calcaire et balme thermophile à clypéole	
Rattachement phytosociologique au niveau association Clypeolo jonthlaspi - Telephietum imperati Chouard 1949 pro parte		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. & Th.Müll. in Th.Müll. 1961
CORINE biotope	34.11	Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
Natura 2000	6110	Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Var

Intérêt patrimonial
Rare dans le territoire du PNM.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Se développe en pied de barres rocheuses calcaires exposées au sud, sur des corniches rocheuses et balmes thermophiles en encorbellement, sur un maigre sol, abrité des pluies par un surplomb.

Cortège floristique
Allium sphaerocephalon L., 1753
Arabis auriculata Lam., 1783
Arabis nova Vill., 1779
Clypeola jonthlaspi L., 1753

Physionomie de l'habitat

Pelouse composée de petites annuelles méditerranéennes, notamment Clypeola jonthlaspi, accompagné de Arabis nova, Arabis auriculata. Communauté toujours présente en mosaïque avec des friches nitrophiles primaires composées d'annuelles et de bisannuelles due au parcours d'animaux sauvages ou domestiques.

Dynamique de la végétation

Ces pelouses peuvent être considérées comme stable dynamiquement (pelouses primaires). Le caractère nitrophile, lié en partie aux déjections des animaux fréquentant ces milieux, peut devenir prépondérant et aboutir à l'élimination des espèces oligotrophes caractéristiques.

Etat de la connaissance

Faible. Communauté peu étudiée. Appartenance phytosociologique au niveau alliance à préciser.

Code:234	Eboulis siliceux alpin à éléments moyens à gros à adénostyle à feuilles blanches et achillée herbe trouée	
Rattachement phytosociologique au niveau association Achilleo herba-rottae - Adenostyletum leucophyllae Barbero & Bono 1967		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	61.11	Eboulis siliceux alpins
Natura 2000	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'Achillea erba-rotta, endémique des Alpes sud-occidentales

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BARBERO & BONO, 1967
GUINOCHET, 1938

Ecologie

Amas et chaos de blocs siliceux à éléments gros: éboulis, moraines, souvent sur de grandes surfaces, entre 2200 m. et 2700 m. d'altitude, sur des pentes comprises entre 20 et 40 %, exposées au nord ou en exposition intermédiaire.

Cortège floristique
Achillea erba-rotta All., 1773
Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb., 1831
Cardamine resedifolia L., 1753
Cryptogramma crispa (L.) R.Br., 1842
Doronicum clusii (All.) Tausch, 1828
Oxyria digyna (L.) Hill, 1768
Persicaria alpina (All.) H.Gross, 1913
Poa cenisia var. fontqueri (Braun-Blanq.) Portal, 2005
Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799

Physionomie de l'habitat

Végétation herbacée au recouvrement faible, entre 5 et 20 %, caractérisée par Adenostyles leucophylla, Doronicum clusii, Achillea erba-rota, Persicaria alpina (=Polygonum alpinum), Poa cenisia var. fontqueri.

Dynamique de la végétation

A l'étage alpin, très lente évolution vers les pelouses silicicoles du Festucetum halleri (Caricion curvulae).

Variabilité et affinité de l'habitat

Absence de Achillea erba-rotta dans le 04.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:235	Eboulis siliceux alpin à éléments fins à violette de l'Argentera	
Rattachement phytosociologique au niveau association Thlaspeetum limosellaefolii Barbero et Bono 1967		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	61.1112	Eboulis du sud-ouest des Alpes à Oxyria digyna
Natura 2000	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Habitat rare à l'échelle du PNM. Présence de l'espèce endémique Viola nummulariifolia (=V. argenteria).

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BARBERO & BONO, 1967
GUINOCHET, 1938

Ecologie

Eboulis fins siliceux, arènes granitiques, moraines à éléments fins, longuement enneigés et imbibés par l'eau de fonte, en exposition nord préférentiellement, rarement en exposition sud, entre 2100 m. et 2950 m. d'altitude, essentiellement à l'étage alpin, bien que pouvant s'observer également dans le subalpin supérieur.

Cortège floristique
Jacobaea incana (L.) Veldkamp, 2006
Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood, 1975
Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr., 1947
Minuartia sedoides (L.) Hiern, 1899
Noccaea corymbosa (J.Gay) F.K.Mey., 1973
Poa laxa Haenke, 1791
Viola nummulariifolia Vill., 1779

Physionomie de l'habitat

Végétation herbacée au faible recouvrement, caractérisée par Viola nummulariifolia qui est souvent dominante, avec Noccaea corymbosa (=Thlaspi limoselaefolium, Jacobaea incana (=Senecio incanus), Leucanthemopsis alpina.

Dynamique de la végétation

Sur les pentes faibles, évolution vers la pelouse du Festucetum halleri (Caricion curvulae). Dans les stations où l'enneigement se prolonge durant huit mois, le groupement est permanent.

Variabilité et affinité de l'habitat

Association dans laquelle Luzula alpinopilosa (=Luzula spadicea) est souvent présente, et dont les conditions écologiques sont semblables à celles du Luzuletum spadiceae, dont elle constituerait le vicariant pour le massif de l'Argentera selon BARBERO & BONO (1967).

Etat de la connaissance

Bonne

Code:236	Eboulis siliceux alpin à éléments fins à androsace des Alpes	
Rattachement phytosociologique au niveau association Androsacetum alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	61.11	Eboulis siliceux alpins
Natura 2000	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Alpin

Répartition
Tinée,Vésubie

Intérêt patrimonial
Fort. Androsace alpina est protégé au niveau national.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
NOBLE & DIADEMA, 2011

Ecologie

Eboulis siliceux à éléments fins, moraines, arènes granitiques, sur des pentes faibles et petites dépressions longuement enneigées, en exposition nord, à l'étage alpin et nival, de 2650 m. à 3100 m. d'altitude.

Cortège floristique
Androsace alpina (L.) Lam., 1779
Eritrichium nanum (L.) Schrad. ex Gaudin, 1828

Physionomie de l'habitat

Végétation au recouvrement faible, définie par la présence de Androsace alpina, aux coussinets de feuilles en rosettes et aux fleurs blanches.

Etat de la connaissance

Recherches complémentaires pour confirmer si les peuplements d'Androsace alpina du Mercantour se rapportent effectivement à l'association de l'Androsacetum alpinae.

Code:259	Eboulis siliceux alpin à éléments fins longuement enneigé à luzule rouge-brun	
Rattachement phytosociologique au niveau association Luzuletum spadiceae (Brockmann-Jerosch 1907) Br.-Bl. 1926		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	61.113	Eboulis à Luzule alpine
Natura 2000	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
Cahiers d'habitats	8110-3	Éboulis siliceux alpins à nivaux à éléments fins des Alpes
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye

Intérêt patrimonial
Fort. Association rare

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
VAN ES, 2003

Ecologie

Pentes d'éboulis siliceux moyennes à fortes, longuement enneigées et humides, en exposition froide, au-dessus de 2300 m. d'altitude. Sol squelettique riche en éléments fins mêlés à des éléments plus gros.

Cortège floristique
Cardamine resedifolia L., 1753
Doronicum clusii (All.) Tausch, 1828
Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr., 1947
Poa laxa Haenke, 1791

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée au recouvrement important pour une végétation d'éboulis (30 %), caractérisée par les colonies de Luzula alpinopilosa reconnaissables à la couleur rougeâtre de ses inflorescences, accompagné par Doronicum clusii, et diverses espèces de petite taille.

Variabilité et affinité de l'habitat

- Confusion avec le Thlaspeetum limosellaefolii Barbero et Bono 1967, association endémique du massif de l'Argentera, possédant la même écologie, caractérisé par Viola argenteria et Noccaea corymbosa.
- Communauté écologiquement proche des combes à neiges, dans laquelle Salix herbacea peut être présent.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:46	Combe à neige alpine basophile à saules nains	
Rattachement phytosociologique au niveau association Salicetum retuso - reticulatae Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & Jenny 1926		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Arabidion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	36.122	Communautés des combes à neige sur calcaires, à Saules en espaliers
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Fort

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BARBERO, 1972
VAN ES, 2003

Ecologie

Combes, replats, pentes douces d'ubac, bordures de dolines retenant longtemps la neige, sur calcaire.

Physionomie de l'habitat

Pelouse présentant un aspect moutonné et en gradins, au recouvrement important, dominée par diverses espèces de saules nains : Salix reticulata, Salix retusa, Salix serpyllifolia, dont les branches longues et flexibles très ramifiées retiennent les débris rocheux et contribuent à fixer le sol.

Cortège floristique
Anemone baldensis L., 1767
Bartsia alpina L., 1753
Homogyne alpina (L.) Cass., 1821
Pedicularis rosea Wulfen, 1781
Salix reticulata L., 1753
Salix retusa L., 1759
Salix serpyllifolia Scop., 1772
Veronica aphylla L., 1753

Dynamique de la végétation

Groupement stable et permanent.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:13	Prairie collinéenne de fauche à avoine élevée	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Arrhenatherion elatioris Koch 1926
CORINE biotope	38.22	Prairies de fauche des plaines médio-européennes
Natura 2000	6510	Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Habitat rare dans le PNM

Menaces
Abandon des pratiques agro-pastorales (fauche).

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Sol profond alluvionnaire, à basse altitude (400 m.)

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée haute (Prairie) structurée par des graminées : Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Avenula pubescens.

Cortège floristique

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868
Colchicum autumnale L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Poa pratensis L., 1753
Rumex acetosa L., 1753
Tragopogon pratensis L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812

Etat de la connaissance

Moyen. Association à préciser.

Code:14	Prairie montagnarde à siléne fleur de Jupiter et trisète jaunâtre	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Arrhenatherion elatioris Koch 1926
CORINE biotope	38.22	Prairies de fauche des plaines médio-européennes
Natura 2000	6510	Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Cians

Intérêt patrimonial
Fort : groupement original et localisé (gorges du Cians).

Menaces
Abandon des pratiques agro-pastorales (pâturage)

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Prairies mésohydriques souvent pâturées s'installant sur pélites rouges à l'étage montagnard supérieur (1500-1700 m), en versant sud ou sur des plateaux, observables à proximité de bergeries ou de hameaux abandonnés.

Cortège floristique
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868
Carum carvi L., 1753
Silene flos-jovis (L.) Greuter & Burdet, 1982
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812

Physionomie de l'habitat

Prairie à Silene flos-jovis, avec de nombreuses graminées : Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Avenula pubescens.

Etat de la connaissance

Faible. Groupement difficile à classer au niveau de l'alliance. A rechercher ailleurs dans le PNM.

Code:77	Mégaphorbiaie hygrosciaphile à barbe de bouc et pétasite blanc	
Rattachement phytosociologique au niveau association Arunco dioici - Petasitetum albi Braun-Blanquet & Sutter 1977		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Arunco dioici - Petasition albi Br.-Bl. & Sutter 1977
CORINE biotope	37.8	Mégaphorbiaies alpines et subalpines
Natura 2000	6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Verdon,Var,Cians,Roya

Intérêt patrimonial
Habitat original faiblement représenté au niveau national. Abrite des espèces végétales patrimoniales (Hesperis inodora, Phylittis scolopendrium, Lunaria rediviva).

Menaces
Exploitation forestière

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BRAUN-BLANQUET, & SUTTER, 1977
VAGGE I., 1996

Ecologie

Fond de vallon, bord de cours d'eau, clairière de sapinière ou de forêt de ravin. Ambiance fraîche et humide, dans des sites confinés et ombragés, de 450 à 1600 m. d'alt., sur calcaire préférentiellement, mais aussi sur pélites rouges et flysch.

Cortège floristique
Aquilegia atrata W.D.J.Koch, 1830
Aruncus dioicus (Walter) Fernald, 1939
Astrantia major L., 1753
Geranium nodosum L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Hesperis inodora L., 1753
Lunaria rediviva L., 1753
Myrrhis odorata (L.) Scop., 1771
Petasites albus (L.) Gaertn., 1791

Physionomie de l'habitat

Formation de hautes herbes mésohygrophile souvent développé en linéaire, structurée par Aruncus dioicus souvent abondant et Petasites albus, associés à plusieurs ombellifères de grande taille.

Dynamique de la végétation

L'existence de ces mégaphorbiaies étant liée à des conditions stationnelles particulières (bordure de cours d?eau, ruissellements, suintements), leur composition floristique est relativement stable.

Etat de la connaissance

Dans les Alpes-Maritimes, association représentée par la sous-association geranietosum nodosi, décrite de l'Apennin du nord (Vagge 1996).

Code:205	Falaise calcaire méditerranéenne thermophile à phagnales

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Asplenion glandulosi Br.-Bl. & Meier in Meier & Br.-Bl. 1934

CORINE biotope	62.1111	Falaises calcaires ibéro-méditerranéennes
Natura 2000	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Cet habitat, très marginal dans le PNM, est peu perturbé par les activités humaines constitue un milieu de quiétude pour la faune et la flore.
De nombreuses espèces d?oiseaux sont liées aux milieux rupestres.

Menaces
Les menaces les plus importantes pour la flore rupicole sont les purges de sécurisation des falaises suivies de la pose de grillages métalliques de protection. En ce qui concerne l'avifaune nicheuse, ce sont d'une façon générale la pratique de l'escalade et le parcours en via ferrata qui sont en plus une source de dérangement.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Falaises calcaires d'adret thermophiles, entre 450 et 500 m d'alt.

Physionomie de l'habitat

Végétation herbacée des fissures de paroi calcaire, au recouvrement faible, dominée par Phagnalon saxatile et Phagnalon sordidum. Les microfissures et les plages de terre nue accueillent divers groupements bryophytiques et lichéniques méditerranéens

Cortège floristique
Antirrhinum latifolium Mill., 1768
Asplenium ceterach L., 1753
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, 2005
Mannia androgyna (L.) A.Evans
Phagnalon saxatile (L.) Cass., 1819
Phagnalon sordidum (L.) Rchb., 1831
Plagiochasma rupestre (J.R.Forst. et G.Forst.) Steph.

Dynamique de la végétation

Habitat stable

Variabilité et affinité de l'habitat

Groupement proche de l'Asplenio petrarchae - Campanuletum macrorhizae

Etat de la connaissance

Faible

Code:66	Ourlet et clairière nitrophile montagnarde à belladonne	
Rattachement phytosociologique au niveau association Atropetum bellae-donnae Braun-Blanquet 1930 ex Tüxen 1950		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Atropion belladonnae Aichinger 1933
CORINE biotope	31.8712	Clairières à Bardane et Belladonne
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Verdon,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Faible

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Groupement ponctuel des chablis, des coupes dans les sapinières et pessières, ou au bord des pistes d'exploitation.

Cortège floristique
Atropa belladonna L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Urtica dioica L., 1753

Physionomie de l'habitat

Peuplements de Atropa belladona, accompagné d'espèces nitrophiles comme Urtica dioica et Rubus idaeus.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:218	Falaise siliceuse supraméditerranéenne à asplénium septentrional	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Asplenion septentrionalis Oberdorfer 1938
CORINE biotope	62.21	Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes
Natura 2000	8220	Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8220-12	Falaises siliceuses collinéennes à subalpines des Ardennes, Vosges, Jura et Alpes du Nord
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Var,Cians,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Cet habitat peu perturbé par les activités humaines, constitue un milieu de quiétude pour la faune et la flore. De nombreuses espèces d'oiseaux sont liées aux milieux rupestres.

Menaces
Les menaces les plus importantes pour la flore rupicole sont les purges de sécurisation des falaises suivies de la pose de grillages métalliques de protection. En ce qui concerne l'avifaune nicheuse, la pratique de l'escalade et le parcours en via ferrata sont une source de dérangement.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Falaises siliceuses thermophiles, généralement exposées au sud, aux étages supraméditerranéen et montagnard, sur quartzites, pélites, gneiss.

Cortège floristique
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795
Grimmia laevigata (Brid.) Brid.
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.
Orthotrichum rupestre Schleich. ex SchwÃ¤gr.

Physionomie de l'habitat

Végétation herbacée chasmophytique au très faible recouvrement, caractérisée par des fougères : Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium septentrionale. Groupements lichéniques et bryophytiques diversifiés associés.

Dynamique de la végétation

Habitat stable

Variabilité et affinité de l'habitat

Vers le montagnard supérieur, le groupement s'enrichit en espèces du Saxifragion pedemontanae, notamment Silene cordifolia.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:107	Fourré à buis supraméditerranéen basophile

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Rhamno saxatilis - Buxetum sempervirentis (de Bannes-Puygiron 1933) Tüxen 1952	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950

CORINE biotope	31.82	Fruticées à Buis
Natura 2000	5110	Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Var,Cians,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
A préciser.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Pentes rocheuses ou rocailleuses sur calcaire ou pélites rouges, corniches rocheuses, manteaux de forêts à chêne pubescent, pin sylvestre, entre 500 et 1000 m. Exposition variable, en fonction de l'altitude.

Cortège floristique
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Buxus sempervirens L., 1753
Colutea arborescens L., 1753
Cotinus coggygria Scop., 1771
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Genista cinerea (Vill.) DC., 1805
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
Juniperus communis L., 1753
Prunus mahaleb L., 1753
Rhamnus saxatilis Jacq., 1762

Physionomie de l'habitat

Fourré arbustif souvent dominé par le buis (Buxus sempervirens), parfois par Amelanchier ovalis, avec Hippocrepis emerus, Prunus mahaleb, Genista cinerea, Juniperus communis, Cytisophyllum sessilifolium. Rhamnus saxatilis est rare.

Dynamique de la végétation

Les fourrés installés sur corniches ou pentes rocheuses très raides sont permanents. Les fourrés de recolonisation évoluent vers des forêts à Quercus pubescens, Pinus sylvestris, ou Ostrya carpinifolia. Ce groupement se développe par colonisation des lavandaies et garides à genêt cendré.

Variabilité et affinité de l'habitat

- Seules les buxaies en station primaire rupicole non susceptibles d'évoluer vers des stades forestiers sont pris en compte dans la directive Habitats et considérées comme habitats d'intérêt communautaire.
- Variante de la Roya à étudier avec Laburnum anagyroides.

Etat de la connaissance

Faible. Rattachement au niveau association à confirmer.

Code:108	Fourré à buis et cytise à feuilles sessiles montagnard calcicole	
Rattachement phytosociologique au niveau association Cytisophyllo sessilifoli - Amelanchieretum ovalis de Foucault 1991		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
CORINE biotope	31.82	Fruticées à Buis
Natura 2000	5110	Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Cians,Tinée

Intérêt patrimonial
A préciser

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie
FOUCAULT (DE), 1991

Ecologie

Manteaux de forêts calcicoles de pin sylvestre, épicéa ou sapin de l'étage montagnard, pentes rocailleuses sur calcaire, de 1000 à 1700 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Fourré arbustif dominé par Buxus sempervirens ou Cytisophyllum sessilifolium, avec Amelanchier ovalis, Juniperus communis, Viburnum lantana, Lonicera xylosteum, Cotoneaster tomentosus, Laburnum alpinum.

Cortège floristique
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Buxus sempervirens L., 1753
Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Juniperus communis L., 1753
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835
Lonicera xylosteum L., 1753
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Viburnum lantana L., 1753

Dynamique de la végétation

Evolue vers des forêts à pin sylvestre, Picea abies.

Variabilité et affinité de l'habitat

- Seules les buxaies en station primaire rupicole non susceptibles d'évoluer vers des stades forestiers sont pris en compte dans la directive Habitats et considérées comme habitats d'intérêt communautaire.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:109	Fourré à buis et bruyère arborescente silicicole	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
CORINE biotope	31.82 x 32.31	
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Habitat original et rare.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pentes rocheuses sur substrat siliceux (quartzites et pélites rouges), à l'étage supraméditerranéen, entre 500 et 900 m. d'altitude. Expositions diverses.

Cortège floristique
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Buxus sempervirens L., 1753
Cotinus coggygria Scop., 1771
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Erica arborea L., 1753
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
Prunus mahaleb L., 1753

Physionomie de l'habitat

Fourré arbustif dominé par Buxus sempervirens et Erica arborea, avec Amelanchier ovalis, Cytisophyllum sessilifolium, Hippocrepis emerus, Prunus mahaleb.

Dynamique de la végétation

Evolue dans certaines situations vers des pinèdes de pin sylvestre.

Etat de la connaissance

Faible

Code:110	Fourré saxicole montagnard acidicline à tremble et amélanchier à feuilles ovales

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950

CORINE biotope	31.8	Fourrés
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Cians

Intérêt patrimonial
Habitat original et non décrit, semblant rare dans le territoire du PNM (Beuil).

Menaces
Peu menacé.

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Barres rocheuses et corniches de quartzites ensoleillées, en exposition chaude, à l'étage montagnard, entre 1500 m. et 1700 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Fourré arbustif saxicole de 1-3 m. de hauteur aisément reconnaissable de loin par la dominance de petits individus de Populus tremula en peuplements denses, enracinés dans la roche, accompagné par Amelanchier ovalis, Juniperus communis (sous une forme prostrée), Berberis vulgaris, Laburnum alpinum, Buxus sempervirens.

Cortège floristique
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Berberis vulgaris L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Juniperus communis L., 1753
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835
Populus tremula L., 1753
Rosa canina L., 1753

Dynamique de la végétation

Formation primaire stable.

Etat de la connaissance

Faible.

Code:111	Matorral à genévrier commun	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
CORINE biotope	32.134	Matorral arborescent à Juniperus communis
Natura 2000	5210	Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Cahiers d'habitats	5210-6	Junipéraies méditerranéennes à genévrier commun
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Verdon,Ubaye,Var

Intérêt patrimonial
Faible.

Menaces
Brûlages dirigés

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pentes rocailleuses et escarpements d'adret en situations primaires, pentes plus douces et replats en situations secondaires, sur substrats carbonatés, à l'étage supraméditerranéen, observé jusqu'à 1200 m. d'altitude.

Cortège floristique
Buxus sempervirens L., 1753
Genista cinerea (Vill.) DC., 1805
Juniperus communis L., 1753

Physionomie de l'habitat

Fourré arbustif ouvert dominé par Juniperus communis, accompagné de Genista cinerea, Buxus sempervirens, Quercus pubescens, Pinus sylvestris, présent en mosaïque superposée sur des garides à genêt cendré.

Dynamique de la végétation

Evolution vers la chênaie pubescente à buis ou la pinède sylvestre de substitution.

Variabilité et affinité de l'habitat

Peuplement représentant un faciès appauvri d'associations du Berberidion vulgaris, notamment le Rhamno saxatilis - Buxetum sempervirentis.

Etat de la connaissance

Moyenne.

Code:112	Fourré xéro-thermophile à sumac fustet, prunier de Sainte-Lucie	
Rattachement phytosociologique au niveau association Pruno mahaleb - Cotinetum coggygriae Rivas-Martínez & Géhu 1978		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
CORINE biotope	31.81	Fourrés médio-européens sur sol fertile
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée

Intérêt patrimonial
Habitat original, peu signalé en France.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Pentes pierreuses arides, éboulis calcaires, de 500 m. à 1100 m. d'altitude. Exposition sud ou intermédiaire.

Cortège floristique
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Cornus sanguinea L., 1753
Cotinus coggygria Scop., 1771
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
Juniperus communis L., 1753
Lonicera etrusca Santi, 1795
Prunus mahaleb L., 1753
Rosa canina L., 1753

Physionomie de l'habitat

Fourré arbustif caducifolié dominé par Cotinus coggygria et Prunus mahaleb pouvant constituer de véritables fruticées installées sur éboulis.

Dynamique de la végétation

Cette communauté s'inscrit dans la dynamique de la série de la chênaie pubescente supraméditerranéenne, sous sa variante thermophile à Cotinus coggygria.

Variabilité et affinité de l'habitat

Peut être confondu avec les fruticées à Cotinus coggygria installées sur sol plus frais, accompagnées d'espèces du Pruno-Rubion ulmifolii (dans la dynamique de l'ostryaie supraméditerranéenne), ou bien avec les fruticées à Cotinus coggygria enrichies en arbustes méditerranéens, et relevant du Rhamno-Quercion.

Etat de la connaissance

Moyen

Code:114	Fourré montagnard à prunier de briançon	
Rattachement phytosociologique au niveau association Berberido vulgaris - Prunetum brigantinae Braun-Blanquet 1961		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
CORINE biotope	31.81251	Fruticées à Prunus brigantiaca
Natura 2000	5110	Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Présence d'une espèce endémique des Alpes sud-occidentales : Prunus brigantina. Association riche en arbustes.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pentes rocailleuses d'adret, escarpements rocheux, pâturages abandonnés, de 1150 à 1700 m d'altitude, sur calcaire, pélites ou schistes.

Physionomie de l'habitat

Fourré arbustif dominé par Prunus brigantina, accompagné de nombreux autres arbustes, dont Berberis vulgaris, et plusieurs espèces d'églantiers montagnardes.

Cortège floristique
Berberis vulgaris L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Juniperus communis L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Prunus brigantina Vill., 1786
Rhamnus alpina L., 1753
Rhamnus cathartica L., 1753
Ribes alpinum L., 1753
Rosa montana Chaix, 1785
Rosa villosa L., 1753

Variabilité et affinité de l'habitat

- variante à buis (Buxus sempervirens) sur pélites rouges et calcaire, dans les gorges du Cians (Beuil), constituant un habitat d'intérêt communautaire dans les pentes raides rocheuses.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:116	Fourré xéro-thermophile à genévrier thurifère	
Rattachement phytosociologique au niveau association Amelanchierio ovalis - Juniperetum thuriferae (Archiloque et Borel 1965) De Foucault 1991		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
CORINE biotope	32.136	Matorral arborescent à Juniperus thurifera
Natura 2000	9560 et 5210	
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Var,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Le genévrier thurifère est une espèce rare en France et dans les Alpes-Maritimes.
Les peuplements de la Bendola, de découverte récente (Association des Amis de la Bendola), sont les plus méridionaux de l?arc alpin et en limite de leur aire de répartition.

Menaces
Les stations secondaires sont menacées par la déprise agricole (plus de pâturage ovin) : évolution progressive vers la chênaie pubescente.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BOREL & POLIDORI, 1983
BARBERO, HAMMOUD & QUEZEL, 1988
FOUCAULT (DE), 1991

Ecologie

Pentes rocheuses d'adret, de 800 à 1600 m d'altitude, sur substrat calcaire et siliceux, sols rocailleux peu profonds, ambiance xérothermophile et héliophile. Climat montagnard continental sous influence méditerranéenne.

Cortège floristique
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Buxus sempervirens L., 1753
Genista cinerea (Vill.) DC., 1805
Juniperus communis L., 1753
Juniperus oxycedrus L., 1753
Juniperus thurifera L., 1753
Thymus vulgaris L., 1753

Physionomie de l'habitat

Matorral dominé par Juniperus thurifera accompagné souvent par Juniperus oxycedrus et Juniperus communis et parfois par Juniperus phoenicea et Juniperus sabina (Vallon de Mollières). Autres arbustes fréquemment rencontrés dans ces matorrals : Buxus sempervirens, Amelanchier ovalis, Genista cinerea, Prunus brigantina.
Ces genévriers sont parfois accompagnés par quelques arbres épars : Pinus sylvestris, Quercus pubescens, Acer opalus, Sorbus aria.
Les peuplements de Juniperus thurifera sont présents en mosaïque avec des garides et pelouses écorchées voisines, avec Thymus vulgaris, Teucrium chamaedrys, Stachys recta, Centaurea leucophaea, Helichrysum stoechas, Artemisia campestris, Melica ciliata, Carex halleriana, Dactylis glomerata, Silene otites, Carduus litigiosus, Antirrhinum latifolium, Petrorhagia saxifraga, Saponaria ocymoides...

Dynamique de la végétation

Stabilité stationnelle dans les stations primaires.
Evolution vers la chênaie pubescente dans les stations secondaires (série méditerranéenne du chêne pubescent d'après OZENDA 1966).

Variabilité et affinité de l'habitat

On peut distinguer au sein de cet habitat, différentes variantes, selon qu'il s'agit de stations primaires ou secondaires.
Les stations primaires sont localisées sur des barres rocheuses, des corniches avec une flore pauvre en espèces, sur des pentes fortes et chaudes, rocailleuses, sur des pelouses écorchées et des végétations de rochers et de dalles (Col de Tende, Aiguilles de Girenze (Saorge), Rochers de Valabres, Roure).

Code:2	Pelouse mésoméditerranéenne à brachypode penné et herbe à bitume

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Diantho balbisii - Brachypodietum pinnati Loisel 1976	Brachypodion phoenicoidis Br-Bl. ex Molinier 1934

CORINE biotope	34.36	gazons à Brachypode de Phénicie
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen

Répartition
Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Intérêt entomologique

Menaces
Embroussaillement

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LOISEL, 1976
OFFERHAUS & FRACHON, 2009

Ecologie

Talus calcaires bien exposés, restanques, oliveraies, de 300 à 700 m. d'alt.

Physionomie de l'habitat

Groupement herbacé de pelouse - friche structuré par Brachypodium rupestre, riche en annuelles et bisannuelles méditerranéennes plus ou moins nitrophiles.

Dynamique de la végétation

Evolue vers un ourlet du Geranion sanguinei, puis vers des fruticées à Spartier en jonc ou des garides supaméditerranéennes thermophiles à genêt cendré, euphorbe épineuse et armoise blanche. Par la suite, évolution vers la chênaie pubescente.

Cortège floristique
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Dianthus balbisii Ser., 1824
Euphorbia serrata L., 1753
Foeniculum vulgare subsp. piperitum (Ucria) BÃ©g., 1907
Pallenis spinosa (L.) Cass., 1825

Etat de la connaissance

Bonne

Code:9	Pelouse mésophile pâturée à seslérie argentée	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Brometalia erecti Koch 1928
CORINE biotope	34.3	Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Présence potentielle de Gentiana ligustica (espèce DH2).

Menaces
surpâturage bovin

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Crête calcaire soumis à une humidité atmosphérique importante (fréquents brouillards).

Physionomie de l'habitat

Pelouse pâturée (bovins) dominée par la graminée Sesleria argentea, accompagnée d'espèces mésophiles des pelouses montagnardes, d'ourlet ou de sous-bois.

Cortège floristique
Anemone hepatica L., 1753
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Dactylorhiza sambucina (L.) SoÃ³, 1962
Erythronium dens-canis L., 1753
Gentiana lutea L., 1753
Hieracium cymosum L., 1763
Knautia timeroyi subsp. collina (SchÃ¼bler & G.Martens) Breistr., 1940
Plantago argentea Chaix, 1785
Primula veris subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm., 1908
Sesleria argentea (Savi) Savi, 1808
Stachys officinalis (L.) TrÃ©vis., 1842

Etat de la connaissance

Faible

Code:84	Source subalpine à alpine des eaux acides à cardamines

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Cardaminetum amarae Braun-Blanquet 1926 cardaminetosum asarifoliae Guinochet 1938	Cardamino amarae - Montion fontanae Br.-Bl. 1926

CORINE biotope	54.112	Sources à Cardamines
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Espèce protégée au niveau régional : Cardamine asarifolia. Intérêt bryologique fort.

Menaces
Perturbations sur le régime hydrologique, pollutions.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO, 1972
GUINOCHET, 1938

Ecologie

Sources, bordure de ruisseaux et de torrents aux eaux oligotrophes aérées et fraîches, légèrement acides ou neutres, sur substrat siliceux. optimum entre 1900 et 2400 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée de 30 à 50 cm. de haut dominée par Cardamine asarifolia aux feuilles cordées caractéristiques. Strate bryophytique bien développée avec Brachythecium rivulare, Philonotis tomentella.

Cortège floristique
Allium schoenoprasum L., 1753
Brachythecium rivulare Schimp.
Bryum schleicheri DC.
Cardamine amara L., 1753
Cardamine asarifolia L., 1753
Carex frigida All., 1785
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda
Dichodontium palustre (Dicks.) M.Stech
Epilobium alsinifolium Vill., 1779
Marchantia polymorpha subsp. montivagans Bischl. & Boisselier
Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra
Pellia neesiana (Gottsche) Limpr.
Philonotis tomentella Molendo
Saxifraga stellaris L., 1753

Variabilité et affinité de l'habitat

Formes enrichies en espèces de mégaphorbiaies : Imperatoria ostruthium, Delphinium dubium, Cacalia alliariae.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:85	Source subalpine à alpine des eaux acides à Bryum schleicheri

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Bryetum schleicheri Br.-Bl. 1925	Cardamino amarae - Montion fontanae Br.-Bl. 1926

CORINE biotope	54.111	Sources d'eaux douces à Bryophytes
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Alpin

Répartition
Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Intérêt bryologique fort. Bryum scheicheri est une espèce peu fréquente.

Menaces
Eutrophisation et dégradation des zones humides d'altitude, assèchement.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO, 1972

Ecologie

Périphérie de sources à faible débit, sur substrat siliceux, aux étages subalpin et alpin.

Physionomie de l'habitat

Communauté dominée par des bryophytiques hygrophiles, notamment Bryum schleicheri.

Cortège floristique
Brachythecium rivulare Schimp.
Bryum schleicheri DC.
Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra
Palustriella falcata (Brid.) HedenÃ¤s
Philonotis seriata Mitt.
Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:39	Pelouse alpine silicicole à fétuque de Haller et jonc trifide	
Rattachement phytosociologique au niveau association Festucetum halleri Braun-Blanquet 1926		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	36.342	Pelouses à Festuca halleri
Natura 2000	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Fort

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
GUINOCHET, 1938
VAN ES, 2005

Ecologie

Pentes faibles, replats, croupes rocheuses de l'étage alpin, au-dessus de 2200 m. d'altitude, sur substrat siliceux. Sol superficiel.

Physionomie de l'habitat

Pelouse faiblement recouvrante, souvent parsemée de cailloux et d'affleurements rocheux, dominée par Festuca halleri, Juncus trifidus, Agrostis alpina, Senecio incanus, Minuartia sedoides, Saxifraga bryoides. Nardus stricta peut parfois être abondant.

Cortège floristique
Avenula versicolor (Vill.) LaÃ-nz, 1974
Festuca halleri All., 1785
Hieracium piliferum Hoppe, 1799
Juncus trifidus L., 1753
Luzula lutea (All.) DC., 1805
Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell., 1907
Minuartia sedoides (L.) Hiern, 1899
Pachypleurum mutellinoides (Crantz) Holub, 1983
Silene acaulis subsp. bryoides (Jord.) Nyman, 1878
Veronica bellidioides L., 1753

Variabilité et affinité de l'habitat

- variante à Agrostis alpina, sur sol rocailleux, dominée par Agrostis alpina et Festuca halleri, en-dessous de 2400-2500 m. d'altitude.
- variante à Saxifraga bryoides, au-dessus de 2500 m. d'altitude.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:40	Pelouse acidophile à laîche toujours verte de l'alpin inférieur sur substrat calcaire ou gréseux	
Rattachement phytosociologique au niveau association Festucetum halleri Braun-Blanquet 1926 caricetosum sempervirentis Guinochet 1938		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	36.34	Pelouses à laîche courbée et communautés apparentées
Natura 2000	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée

Intérêt patrimonial
Fort. Présence potentielle de plusieurs espèces patrimoniales.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
GUINOCHET, 1938

Ecologie

Pentes faibles jusqu'à 25-30°, replats, croupes rocheuses, crêtes exposées au vent, à l'étage alpin, entre 2200 (2000) et 2500 m. d'altitude, sur substrat calcaire ou gréseux. Sol épais, riche en matière organique, légèrement acide à neutre.

Cortège floristique
Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791
Carex sempervirens Vill., 1787
Draba aizoides L., 1767
Hieracium glaciale Reyn., 1787
Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang., 1882
Sempervivum arachnoideum L., 1753

Physionomie de l'habitat

Pelouse constituant des gazons ras, d'un vert roux grisâtre, fermée, au recouvrement moyen à fort (de 50 à 100 %), dominée par Carex sempervirens. Antennaria dioica est souvent abondant.

Dynamique de la végétation

Pelouse constituant le climax de l'horizon supérieur de l'étage alpin sur calcaire et grès d'Annot.

Variabilité et affinité de l'habitat

Vis à vis du Festucetum halleri type, la sous association à Carex sempervirens possède comme espèces différentielles Plantago maritima subsp. serpentina, Draba aizoides.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:41	Pelouse acidophile à kobrésia queue de souris et laîche de Rosa de l'alpin supérieur	
Rattachement phytosociologique au niveau association Caricetum curvulae Braun-Blanquet 1926 elynetosum Braun-Blanquet 1926		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	36.421	Pelouses alpines à Elyna
Natura 2000	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Alpin

Répartition
Ubaye,Cians,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Intérêt fort de ce groupement d'origine glaciaire en régression depuis la fin du Quaternaire, qui présente une aire fragmentée dans la chaîne centrale du Mercantour.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
GUINOCHET, 1938

Ecologie

Pentes douces, replats et crêtes de l'étage alpin supérieur, sur substrat gréseux, sur sol acide, au-dessus de 2400 m. d'altitude. Sol légèrement acide à neutre.

Cortège floristique
Avenula versicolor (Vill.) LaÃ-nz, 1974
Carex curvula subsp. rosae Gilomen, 1937
Carex myosuroides Vill., 1779
Festuca quadriflora Honck., 1782
Hieracium glaciale Reyn., 1787
Juncus trifidus L., 1753
Minuartia sedoides (L.) Hiern, 1899

Physionomie de l'habitat

Pelouse constituant des gazons ras, au recouvrement élevé (80-90 %), codominée par Carex myosuroides (=Kobresia myosuroides) et Carex curvula subsp. rosae.

Dynamique de la végétation

Pelouse climacique de l'étage alpin supérieur, sur calcaire et grès d'Annot.

Etat de la connaissance

Bonne. Variante de l'association spéciale aux Alpes du sud décrite : variété australe Guinochet 1938

Code:42	Pelouse alpine silicicole de l'alpin supérieur à laîche courbée

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Caricetum curvulae Braun-Blanquet 1926 typicum	Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926

CORINE biotope	36.341	Pelouses à Carex curvula
Natura 2000	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Alpin

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Intérêt patrimonial très fort, étant donné la rareté de l'association dans les Alpes-Maritimes.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
GUINOCHET, 1938

Ecologie

Pentes faibles et replats exposés au nord ou à l'ouest, sur substrat cristallin, au-desssus de 2400 m. d'altitude. Sol épais, acide, riche en humus.

Physionomie de l'habitat

Pelouse constituant des gazons ras d'un vert olive brunâtre, fermée, au recouvrement élevé (75 % et plus), dominée par Carex curvula subsp. curvula.

Dynamique de la végétation

Pelouse constituant le climax de l'étage alpin supérieur, sur silice.

Etat de la connaissance

Bonne. Variante de la Haute Tinée décrite : var. meridionale Guinochet 1938

Cortège floristique
Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh., 1825
Avenula versicolor (Vill.) LaÃ-nz, 1974
Carex curvula All. subsp. curvula
Festuca halleri All., 1785
Hieracium glanduliferum Hoppe, 1815
Minuartia sedoides (L.) Hiern, 1899
Oreochloa seslerioides (All.) K.Richt., 1890
Pedicularis kerneri Dalla Torre, 1882
Silene acaulis (L.) Jacq., 1762

Code:43	Pelouse rocailleuse alpine d'ubac à oréochloa fausse seslérie et saxifrage fausse mousse	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	36.34	Pelouses à laîche courbée et communautés apparentées
Natura 2000	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Présence de Oreochloa seslerioides, endémique des Alpes sud-occidentales.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
VAN ES, 2003

Ecologie

Vires et couloirs rocheux, pied de falaises, sur substrat siliceux, en exposition nord, sous micro-climat froid, au-dessus de 2150 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Pelouses et banquettes herbeuses rocailleuses de faibles dimensions, disposées en mosaïque avec les groupements chasmophytiques du Saxifragion pedemontanae, dominées par Oreochloa seslerioides, avec Juncus trifidus, Huperzia selago, Hieracium pallidiflorum.

Cortège floristique
Carex curvula subsp. rosae Gilomen, 1937
Hieracium pallidiflorum Jord. ex Asch., 1854
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829
Juncus trifidus L., 1753
Luzula lutea (All.) DC., 1805
Oreochloa seslerioides (All.) K.Richt., 1890
Saxifraga bryoides L., 1753
Silene acaulis (L.) Jacq., 1762

Dynamique de la végétation

Groupement stable

Etat de la connaissance

Relevés complémentaires pour préciser l'appartenance phytosociologique de ce groupement au rang association.

Code:93	Bas-marais alcalin montagnard à alpin à cypéracées	
Rattachement phytosociologique au niveau association Caricetum davallianae (Dutoit 1924) Görs 1963		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Caricion davallianae Klika 1934
CORINE biotope	54.2	Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)
Natura 2000	7230	Tourbières basses alcalines
Cahiers d'habitats	7230-1	Végétation des bas-marais neutro-alcalins
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'espèces protégées comme Dactylorhiza cruenta.

Menaces
Assèchement des zones humides, surpâturage et eutrophisation du milieu par les troupeaux bovins.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO, 1972
GUINOCHET, 1938

Ecologie

Stations planes autour de nappes d'eau, cuvettes humides, bordure de ruisseaux et de lacs, sur substrat calcaire. Sol tourbeux. Large amplitude altitudinale, comprise entre 1500 m et 2500 m. d'altitude.

Cortège floristique
Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen
Carex davalliana Sm., 1800
Carex hostiana DC., 1813
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949
Equisetum variegatum Schleich., 1797
Eriophorum latifolium Hoppe, 1800
Gentiana rostanii Reut. ex Verl., 1872
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra
Palustriella falcata (Brid.) HedenÃ¤s
Polygala amarella Crantz, 1769
Primula farinosa L., 1753
Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart., 1829
Swertia perennis L., 1753
Thalictrum alpinum L., 1753
Triglochin palustre L., 1753

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée dominée par des cypéracées : touradons de Carex davalliana, touffes de linaigrettes (Eriophorum latifolium). Strate bryophytique bien développée dominée par des mousses brunes : Palustriella commutata, Palustriella falcata, Campylium stellatum. A l'étage alpin, les bas-marais prennent l'aspect de pozzines (formations herbacées rases percées de trous d'eau occupant le fond plat de vallées glaciaires).

Dynamique de la végétation

A l'étage subalpin, évolution possible vers des fourrés hygrophiles à Salix caesia et Salix foetida, voir aussi plus localement à Salix pentdandra.
A l'étage alpin, peut évoluer vers le bas-marais acide (Caricion fuscae) par acidification du sol.

Variabilité et affinité de l'habitat

- Sous association equisetosum variegatae de l'étage alpin inférieur, caractérisée par Equisetum variegatum, et des espèces transgressives des bas-marais acides : Carex nigra, Eriophorum angustifolium.
- Variantes montagnarde et subalpine à Dactylorhiza cruenta, Carex paniculata, Carex viridula subsp. brachyrrhyncha, Blysmus compressus.
- variante à Blysmus compressus dans les situations piétinées et enrichies en nutriments.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:20	Pelouse basophile subalpine à alpine mésohydrique des pentes faibles à fétuque violacée et trèfle de Thal	
Rattachement phytosociologique au niveau association		Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Festuco violaceae - Trifolietum thalii (Rübel 1912) Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926		Caricion ferrugineae G. Braun-Blanquet & Br.-Bl. 1931
CORINE biotope	36.411	Pelouses mésophiles à laîche sempervirente
Natura 2000	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
Cahiers d'habitats	6170-1	Pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles des Alpes
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Habitat abritant des espèces rares, avec notamment Lathyrus occidentalis, Muscari botryoides

Menaces
Evolution vers d'autres types de pelouses sous l'action d'un surpâturage

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
GUINOCHET, 1938

Ecologie

Ce type de pelouse apparaît à l'étage subalpin, dès 1700 m, jusqu'à 2500 m d'alt., et se localise surtout en ubac ou aux expositions intermédiaires, sur des replats et des pentes faibles, où l'enneigement est assez prolongé. Substrat calcaire.

Physionomie de l'habitat

Pelouse luxuriante, dense, souvent dominée par Anemone narcissiflora, avec Primula elatior subsp. intricata.

Cortège floristique
Anemone narcissiflora L., 1753
Carex ferruginea subsp. tenax (H.Christ) K.Richt., 1890
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin, 1808
Linum alpinum Jacq., 1762
Pedicularis comosa L., 1753
Primula elatior subsp. intricata (Gren. & Godr.) Widmer, 1891
Sagina glabra (Willd.) Fenzl, 1833
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763
Tephroseris integrifolia subsp. capitata (Wahlenb.) B.Nord., 1978
Thesium alpinum L., 1753
Trifolium badium Schreb., 1804
Trifolium thalii Vill., 1779

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:21	Pelouse basophile subalpine mésohydrique des pentes faibles à alchémille	
Rattachement phytosociologique au niveau association Poeto - Alchemilletum hoppeanae Lacoste 1975		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Caricion ferrugineae G. Braun-Blanquet & Br.-Bl. 1931
CORINE biotope	36.411	Pelouses mésophiles à laîche sempervirente
Natura 2000	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
Cahiers d'habitats	6170-1	Pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles des Alpes
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Association originale, uniquement connue des Alpes-Maritimes.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LACOSTE, 1975

Ecologie

Se développe entre 1700 et 2100 m d'alt., sur des pentes variant de 10° à 35°, longuement enneigées, en versant nord, sur substrat calcaire.

Cortège floristique
Alchemilla alpigena Buser, 1894
Astragalus danicus Retz., 1783
Bellardiochloa variegata (Lam.) KerguÃ©len, 1983
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin, 1808
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763

Physionomie de l'habitat

Pelouse au fort recouvrement, dominée par des graminées et des légumineuses, et Alchemilla alpigena.

Variabilité et affinité de l'habitat

Sous-association laricetosum présentant l'aspect d'un pré-bois de mélèze.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:22	Pelouse subalpine calcicole mésohydrique à laîche toujours verte et sénéçon champêtre	
Rattachement phytosociologique au niveau association Senecio campestris - Poeetum violaceae Barbero et Quézel 1975		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Caricion ferrugineae G. Braun-Blanquet & Br.-Bl. 1931
CORINE biotope	36.411	Pelouses mésophiles à laîche sempervirente
Natura 2000	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
Cahiers d'habitats	6170-1	Pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles des Alpes
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Var,Cians

Intérêt patrimonial
Habitat original et rare

Menaces
Forte menace de surpâturage ovin en crête

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO & QUEZEL, 1975

Ecologie

Pelouse basophile à acidocline, subalpine, des pentes pentes faibles à enneigement prolongé, de 1700 m à 2000 m. d'altitude, en versant nord.

Physionomie de l'habitat

Pelouse dense à Carex sempervirens, Bellardiochloa variegata, Tephroseris integrifolia subsp. integrifolia, Festuca violacea, Sesleria coerulea, Pedicularis gyroflexa, avec plusieurs espèces acidophiles des nardaies : Alchemilla vetteri, Potentilla crantzii, Leontodon helveticus, Gentiana verna.

Cortège floristique
Bellardiochloa variegata (Lam.) KerguÃ©len, 1983
Carex ornithopoda Willd., 1805
Carex sempervirens Vill., 1787
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin, 1808
Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794
Pedicularis gyroflexa Vill., 1785
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763
Tephroseris integrifolia (L.) Holub subsp. integrifolia
Trifolium montanum L., 1753

Etat de la connaissance

Moyennne. Rattachement au niveau de l'alliance incertain.

Code:243	Pelouse subalpine des pentes ébouleuses à laîche méridionale	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Caricion ferrugineae G.Braun-Blanq. & Braun-Blanq. 1931
CORINE biotope	36.41	Pelouses à laîche ferrugineuse et communautés apparentées
Natura 2000	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye

Intérêt patrimonial
Habitat original, connue que de la partie Alpes-de-Haute-Provence du PNM.

Menaces
Habitat globalement non menacé à l'échelle du PN, particulièrement dans ses stades pionniers peu végétalisés n'offrant qu'une maigre ressource pastorale. Des menaces de surpâturage de ces pelouses existent néanmoins dans le vallon du Lauzanier (versant de la montagne de Prayer), où celles-ci occupent de vastes surfaces et présentent une biomasse importante ainsi qu'une grande diversité floristique, notamment en légumineuses, les rendant particulièrement attractives pour le pastoralisme.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pelouse de l'étage subalpin, principalement entre 1 800 et 2 150 m, des expositions froides, sur pentes moyennes à fortes et substrat carbonaté à sols frais et humides, de type rendzine brunifiée ou sol brun.

Cortège floristique
Anemone narcissiflora L., 1753
Carex ferruginea subsp. tenax (H.Christ) K.Richt., 1890
Hedysarum boutignyanum (A.Camus) Alleiz., 1928
Hieracium villosum Jacq., 1762
Linum alpinum (Jacq.) L., 1763
Thesium alpinum L., 1753

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée à recouvrement variable, de 50% à continu selon l'intensité de la pente et la pierrosité), dominée des touffes vert jaunâtre de Carex ferruginea subsp. tenax, auxquelles se mêlent souvent celles blanche rosé de Hedysarum boutignyanum. Strate arbustive pouvant être représentée par un piquetage de Larix decidua.

Variabilité et affinité de l'habitat

- communauté pionnière sur forte pente ébouleuse : végétation très lacunaire, fort recouvrement de Carex ferruginea subsp. tenax, à cortège floristique appauvri (absence de Linum alpinum et Thesium alpinum)
- faciès à Festuca paniculata, sur pentes plus douces et sol plus profond.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:94	Bas-marais acide subalpin à alpin	
Rattachement phytosociologique au niveau association Caricetum fuscae Braun-Blanquet 1915		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Caricion fuscae Koch 1926
CORINE biotope	54.421	Bas-marais alpins à Carex fusca
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Fort intérêt patrimonial, par la présence d'espèces protégées (Carex curta, Potentilla fruticosa).

Menaces
Surpâturage et piétinement des troupeaux de bovins à proximité des lacs et des zones humides.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO, 1972
GUINOCHET, 1938
OFFERHAUS & FRACHON, 2008
OFFERHAUS & FRACHON, 2009

Ecologie

Pentes très faibles près d'une nappe d'eau, plateaux et dépressions où séjourne l'eau de fonte des neiges, bordure de ruisseaux et de lacs alpins, sur substrat siliceux ou calcaire. Sol tourbeux constamment humide, alimenté par des eaux acides faiblement minéralisées. Altitude comprise entre 1900 m. et 2500 m.

Cortège floristique
Aulacomnium palustre (Hedw.) SchwÃ¤gr.
Carex curta Gooden., 1794
Carex echinata Murray, 1770
Carex nigra (L.) Reichard, 1778
Eriophorum angustifolium Honck., 1782
Gentiana rostanii Reut. ex Verl., 1872
Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) HedenÃ¤s
Viola palustris L., 1753

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée de tourbière basse, caractérisée par la dominance de Carex nigra. Viola palustris et Carex curta sont des espèces caractéristiques. Strate bryophytique bien développée, avec Aulacomnium palustre, Straminergon stramineum, Scorpidium revolvens

Dynamique de la végétation

A l'étage alpin, rôle pionnier dans la colonisation des berges de lac et de ruisseau, et actif édificateur de tourbe. Sur silice, il évolue vers le Trichophoretum caespitosi. Sur calcaire, il succède au Caricetum davallianae, par acidification du sol.

Variabilité et affinité de l'habitat

- Confusion avec les bas-marais alcalins du Caricetum davallianae, et les bas-marais acides dominés par Trichophorum caespitosum.
- en bordure de lac, contact avec le groupement de ceinture à Juncus filiformis.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:95	Bas-marais acide subalpin à alpin à scirpe cespiteux	
Rattachement phytosociologique au niveau association Trichophoretum cespitosi - alpinum Koch 1928		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Caricion fuscae Koch 1926
CORINE biotope	54.451	Bas-marais acides alpiens à Trichophorum cespitosum
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Grand intérêt patrimonial. Présence d'espèces rares (sphaignes) et protégées (Drosera rotundifolia).

Menaces
Assèchement des zones humides, surpâturage et eutrophisation du milieu par les troupeaux bovins.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
GUINOCHET, 1938
BARBERO, 1972

Ecologie

Périphérie de marécages à l'étage alpin, bordure de lacs, en situation légèrement surélevée, exondée. Sol tourbeux acide. Se rencontre sur substrat siliceux et calcaire, entre 2000 m. et 2500 m. d'altitude.

Cortège floristique
Aulacomnium palustre (Hedw.) SchwÃ¤gr.
Carex echinata Murray, 1770
Carex nigra (L.) Reichard, 1778
Carex viridula subsp. oedocarpa (Andersson) B.Schmid, 1983
Juncus jacquini L., 1767
Pinguicula vulgaris L., 1753
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) HedenÃ¤s
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée basse, souvent à aspect de pozzine, généralement constituée par un gazon serré en brosse au fort recouvrement constitué par Trichophorum caespitosum. Strate bryophytique bien développée, parfois dominante par rapport à la strate herbacée, structurée dans le meilleur des cas par des sphaignes (surtout Sphagnum capillifolium, et les mousses Aulacomnium palustre, Straminergon stramineum.

Dynamique de la végétation

Le Trichophoretum cespitosi - alpinum succède au Caricetum fuscae, lorsque la sol s'assèche un peu, s'enrichit en matière organique et s'acidifie.

Variabilité et affinité de l'habitat

- Le faciès à sphaignes ne se développe que sur substrat cristallin.
Certains bas-marais tourbeux du massif du Mercantour présentent une strate bryophytique riche en sphaignes. Cependant, on ne peut assimiler ces formations aux véritables tourbières bombées ombrotrophes.
- variante riche en Nardus strica, occupant des stations encore plus surelevées et plus sèches.
- variante avec Salix herbacea

Etat de la connaissance

Bonne

Code:254	Bas-marais acide subalpin à alpin des bordures de lacs à jonc filiforme et laîche noire	
Rattachement phytosociologique au niveau association Junco filiformis - Caricetum nigrae Rivas-Martinez & Géhu 1978		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Caricion fuscae Koch 1926
CORINE biotope	54.421	Bas-marais alpins à Carex fusca
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye

Intérêt patrimonial
Habitat peu répandu abritant des espèces patrimoniales.

Menaces
Habitat oligotrophe menacé localement d'eutrophisation par les activités pastorales (surpâturage sur secteurs amont, reposoir à proximité)

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
QUITTARD, 2004
RIVAS-MARTINEZ & GEHU, 1978
VILLARET, 2006

Ecologie

Association des sols organique profonds acidiphiles, engorgés la majeure partie de la saison de végétation, des étages subalpin supérieur et alpin, des dépressions et ceintures lacustres internes des lacs, mares et gouilles.

Cortège floristique
Carex echinata Murray, 1770
Carex nigra (L.) Reichard, 1778
Eriophorum angustifolium Honck., 1782
Juncus filiformis L., 1753

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée formant une ceinture de quelques décimètres de large sur la rive de pièces d'eau, dominée par Juncus filiformis qui donne à cette communauté une couleur vert jaunâtre. Présence de cypéracées, avec Carex nigra, Carex echinata, Eriophorum angustifolium et, plus rarement, Eriophorum scheuchzeri et Carex curta.

Variabilité et affinité de l'habitat

Variante de contact avec bas-marais à Eriophorum scheuchzeri.
Variante de contact avec les pelouses chionophiles (Nardion strictae, Salicion herbaceae).

Etat de la connaissance

Moyenne.

Code:97	Végétation pionnière des bords de torrents alpins à laîche bicolore	
Rattachement phytosociologique au niveau association Juncetum artici Bressoud 1989 ; Junco triglumis - Caricetum bicoloris Doyle 1952		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Caricion incurvae Br.-Bl. in Volk 1940
CORINE biotope	54.3	Gazons riverains arctico-alpins
Natura 2000	7240	Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae
Cahiers d'habitats	7240-1	Groupement pionniers des bords de torrents alpins
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	

Etages de végétation

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée

Intérêt patrimonial
Intérêt patrimonial très fort, en raison de la présence d'espèces arctico-alpines relictuelles des glaciations quarternaires.

Menaces
Captage de sources, de torrent, modification du ruissellement, surpâturage et piétinement excessif par les troupeaux ovins avant la maturation des fruits de Carex bicolor.

Enjeu de conservation
Très fort

Bibliographie
NOBLE & DIADEMA, 2011
POLIDORI & POLIDORI, 1997
UGO, 2006
VAN ES, 2003

Ecologie

A l'étage alpin, rives et zones de dépôts sédimentaires des torrents et ruisseaux, îlots des torrents anastomosés submergés à la fonte des neiges, suintements et ruissellement de pentes liés aux sources, berges de lacs glaciaires, plus rarement marges de combes à neiges. Nécessite un rajeunissement constant du milieu par des facteurs déstabilisant (alluvionnement, colluvionnement, solifluxion, cryoturbation). Sur substrat calcaire ou gréseux.

Cortège floristique
Carex bicolor All., 1785
Carex microglochin Wahlenb., 1803
Juncus arcticus Willd., 1799
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell., 1921

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée basse dominée par des joncacées et des cypéracées, au recouvrement moyen, caractérisée par Juncus arcticus, Carex bicolor, Carex microglochin et Trichophorum pumilum. Groupement fragmentaire ne couvrant pas de grandes surfaces, présent en mosaïque avec des communautés de bas-marais alcalin ou acide, fontinales, et de combes à neiges.

Dynamique de la végétation

Habitat permanent tant que se maintiennent les facteurs de rajeunissement du milieu.

Variabilité et affinité de l'habitat

Deux associations proches regroupées dans cette fiche :
- Juncetum artici Bressoud 1989
- Junco triglumis - Caricetum bicoloris Doyle 1952

Etat de la connaissance

Bonne

Code:270	Frênaie- châtaigneraie collinéenne mésohygrophile

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Salvio glutinosae - Fraxinetum excelsioris Oberdorfer 1964	Carpinion betuli Issler 1931

CORINE biotope	41.28	Chênaies-charmaies sud-alpines
Natura 2000	9260	Forêts de Castanea sativa
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Vésubie

Intérêt patrimonial
Présence d'une espèce très rare : Orobanche salviae.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BARBERO et al., 1973
OBERDORFER, 1964
OBERDORFER & HOFMANN, 1967
ROYER et al., 2006

Ecologie

Bas de versants exposés au nord, fonds de vallons, à l'étage collinéen (type centro-européen), sur substrat siliceux ou faiblement carbonaté. Sol frais et profond, entre 400 et 800 m. d'altitude.

Cortège floristique
Aruncus dioicus (Walter) Fernald, 1939
Carpinus betulus L., 1753
Castanea sativa Mill., 1768
Fraxinus excelsior L., 1753
Orobanche salviae F.W.Schultz ex W.D.J.Koch, 1833
Salvia glutinosa L., 1753

Physionomie de l'habitat

Forêt de feuillus mixte, généralement dominée dans les Alpes-Maritimes par Fraxinus excelsior et Castanea sativa, avec Carpinus betulus, Prunus avium. Strate arbustive dominée par Corylus avellana, avec Malus sylvestris. Strate herbacée diversifiée avec Salvia glutinosa, Orobanche salviae, Aruncus dioicus, Luzula nivea, Aegopodium podagraria, Stachys sylvatica, Geranium nodosum.

Dynamique de la végétation

Méconnue

Variabilité et affinité de l'habitat

Confusion possible avec d'autres types de forêt à Castanea sativa et Carpinus betulus.

Etat de la connaissance

Habitat méconnu. Rattachement au niveau de l'alliance non résolu.

Code:132	Forêt supraméditerranéenne de chêne pubescent mésoxérophile à seslérie argentée	
Rattachement phytosociologique au niveau association Seslerio argenteae - Ostryetum carpinifoliae Lapraz 1983		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Carpinion orientalis Horvat 1958
CORINE biotope	41.73	Chênaies pubescentes orientales
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
- Présence de nombreuses espèces patrimoniales en limite d'aire occidentale dans les Alpes-Maritimes ou endémiques ou rares : Juniperus thurifera, Ostrya carpinifolia, Sesleria argentea, Leucanthemum virgatum, Euphorbia hyberna subsp. canutii, Iberis umbellata, Holandrea schottii, Xanthoselinum alsaticum subsp. venetum, Inula bifrons, Delphinium fissum.
- Présence de d'arbres senescents (Barivière à Moulinet, Bendola à Saorge, Breil-sur-Roya) abritant le Piqueprune (Osmoderma eremita, annexe II directive Habitats).

Menaces
Ces forêts souvent peu accessibles ne plus exploitées depuis longtemps.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BLASI, DI PIETRO & FILESI, 2004
LAPRAZ, 1983

Ecologie

Pentes d'adret, croupes rocheuses, crêtes, de 500 à 1400 m d'altitude, sur des sols calcaires peu profonds et secs.

Physionomie de l'habitat

Forêts peu élevées, souvent clairiérées, dominées par Quercus pubescens, accompagné d'Ostrya carpinifolia, Pinus sylvestris, Acer opalus, Sorbus aria. Strate herbacée, floristiquement assez diversifiée, caractérisée par Sesleria argentea qui forme des tapis en sous-bois, accompagné de nombreuses espèces transgressives des ourlets du Geranion sanguinei.

Cortège floristique
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Buphthalmum salicifolium L., 1753
Campanula medium L., 1753
Cervaria rivini Gaertn., 1788
Cotinus coggygria Scop., 1771
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
Laburnum anagyroides Medik., 1787
Ostrya carpinifolia Scop., 1772
Quercus pubescens Willd., 1805
Sesleria argentea (Savi) Savi, 1808

Variabilité et affinité de l'habitat

- Variante remarquable dans la Haute Bendola avec Juniperus thurifera, dans des faciès subrupicoles.

Etat de la connaissance

Faible

Code:133	Forêt supraméditerranéenne de chêne pubescent mésophile avec châtaignier	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Carpinion orientalis Horvat 1958
CORINE biotope	41.73	Chênaies pubescentes orientales
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'espèces végétales patrimoniales endémiques ou en limite d'aire occidentale dans les Alpes-Maritimes : Ostrya carpinifolia, Sesleria argentea, Leucanthemum virgatum.

Menaces
Menaces sanitaires liée au châtaignier (cynips, encre).

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BLASI, DI PIETRO & FILESI, 2004

Ecologie

Bas de versants, fonds de vallon, de 550 à 750 m d'altitude. Sur pentes moyennes, sols calcaires profonds, ambiance mésophile.

Physionomie de l'habitat

Chênaie pubescente caractérisée par la présence du châtaignier et du charme-houblon dans la strate arborescente.

Sous-bois herbacé dominé par Brachypodium rupestre et Sesleria argentea formant des tapis et par des espèces d'ourlets du Geranion sanguinei.

Cortège floristique
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Campanula medium L., 1753
Campanula trachelium L., 1753
Castanea sativa Mill., 1768
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
Leucanthemum virgatum (Desr.) Clos, 1870
Ostrya carpinifolia Scop., 1772
Quercus pubescens Willd., 1805
Sesleria argentea (Savi) Savi, 1808

Etat de la connaissance

Faible

Code:134	Ostryaie supraméditerranéenne de pente à seslérie argentée	
Rattachement phytosociologique au niveau association Seslerio argenteae - Ostryetum carpinifoliae Lapraz 1983		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Carpinion orientalis Horvat 1958
CORINE biotope	41.812	Bois de Charmes houblon supra-méditerranéens
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Habitat endémique des Alpes maritimes et ligures. Présence d'espèces végétales patrimoniales endémiques ou en limite d'aire occidentale dans les Alpes-Maritimes : Ostrya carpinifolia, Sesleria argentea, Leucanthemum virgatum, Euphorbia hyberna subsp. canutii.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BARBERO, GRUBER & LOISEL, 1971
BLASI, DI PIETRO & FILESI, 2004
GRUBER, 1968
LAPRAZ, 1983

Ecologie

Pentes fortes d'ubac ou exposition intermédiaire, mais également en situation moins pentue et sur restanques (jeunes recolonisations). Substrat calcaire.

Cortège floristique
Cotinus coggygria Scop., 1771
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Euphorbia hyberna subsp. canutii (Parl.) Tutin, 1968
Laburnum anagyroides Medik., 1787
Leucanthemum virgatum (Desr.) Clos, 1870
Ostrya carpinifolia Scop., 1772
Sesleria argentea (Savi) Savi, 1808
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

Physionomie de l'habitat

Forêt dominée par Ostrya carpinifolia, anciennement traitée en taillis. La strate herbacée est caractérisée par d'étendus tapis de Sesleria argentea, accompagné de nombreuses espèces d'ourlet transgressives du Geranion sanguinei.

Dynamique de la végétation

Présente un caractère stable sur les fortes pentes. Ailleurs, ces ostryaies représentent un stade pionnier jeune, susceptibles d'évoluer vers l'ostryaie mésophile.

Variabilité et affinité de l'habitat

Association qui correspond en partie au Plagio-Ostryetum Gruber 1968, et proche de l'Ostryo-Seslerietum autumnalis Horvat 1950, association géo-vicariante décrite des Balkans.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:135	Ostryaie supraméditerranéenne mésophile à buis	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Carpinion orientalis Horvat 1958
CORINE biotope	41.812	Bois de Charmes houblon supra-méditerranéens
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Ostrya carpinifolia est une espèce en limite d'aire occidentale dans les Alpes-Maritimes.

Menaces
Peu menacé.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BLASI, DI PIETRO & FILESI, 2004

Ecologie

Bas de versants en ubac, fonds de vallon, anciennes restanques boisées, sur pentes faibles ou replats, de 300 à 1200 m. d'altitude. Substrat calcaire, sol profond.

Physionomie de l'habitat

Forêt dominée par Ostrya carpinifolia dans la strate arborescente, se présentant souvent en taillis, parfois en futaie, caractérisée par la fréquence et l'abondance dans la strate arbustive de Buxus sempervirens, avec souvent Ilex aquifolium. Strate herbacée caractérisée par un cortège mésohygrophile : Geranium nodosum, Melica uniflora, Mercurialis perennis, Salvia glutinosa, Carex digitata, Sanicula europaea. Présence rare de Carpinus betulus et Quercus cerris.

Cortège floristique
Acer opalus Mill., 1768
Buxus sempervirens L., 1753
Carex digitata L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Geranium nodosum L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Melica uniflora Retz., 1779
Mercurialis perennis L., 1753
Ostrya carpinifolia Scop., 1772
Quercus pubescens Willd., 1805
Salvia glutinosa L., 1753
Sanicula europaea L., 1753
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

Dynamique de la végétation

Ostryaie mature, pouvant représenter un stade évolutif du Seslerio argenteae - Ostryetum carpinifoliae sur les pentes faibles.

Variabilité et affinité de l'habitat

Confusion avec l'ostryaie mésoxérophile de pente à Sesleria argentea, formation plus ouverte, au sous-bois mésoxérophile riches en espèces des ourlets du Geranion sanguinei.

Etat de la connaissance

Bien que les ostryaies des Alpes-Maritimes aient fait l'objet de plusieurs travaux phytosociologiques, ce groupement mésophile reste non décrit à ce jour.

Code:156	Taillis de noisetier montagnard à vératre noir

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Carpinion orientalis Horvat 1958

CORINE biotope	31.8C	Fourrés de Noisetiers
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Habitat d'une espèce protégée : Veratrum nigrum, qui peut être localement abondante.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BLASI, DI PIETRO & FILESI, 2004

Ecologie

Pentes calcaires en exposition intermédiaire, à l'étage montagnard, sur substrat calcaire.

Physionomie de l'habitat

Formation arborée basse à aspect de taillis, dominée par le noisetier (Corylus avellana), accompagné de diverses essences feuillues (Acer opalus, Sorbus aria, Laburnum alpinum, Euonymus latifolius), ainsi que du sapin (Abies alba). Groupement assez clairiéré comprenant de nombreuses espèces d'ourlets calcicoles mésoxérophiles (Trifolio-Geranietea) dans la strate herbacée, dont Sesleria argentea qui forme des tapis étendus.

Cortège floristique
Corylus avellana L., 1753
Erythronium dens-canis L., 1753
Euonymus latifolius (L.) Mill., 1768
Galium aristatum L., 1762
Holandrea schottii (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997
Hyacinthoides italica (L.) Rothm., 1944
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835
Sesleria argentea (Savi) Savi, 1808
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763
Thesium bavarum Schrank, 1786
Veratrum nigrum L., 1753

Variabilité et affinité de l'habitat

Ces taillis de noisetiers sont proches floristiquement des ostryaies, qu'ils relaient en altitude.

Etat de la connaissance

Habitat très mal connu

Code:161	Pineraie de pin sylvestre supraméditerranéenne à seslérie argentée

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Carpinion orientalis Horvat 1958

CORINE biotope	42.591	Forêts péri-alpines à Buis de Pins sylvestres
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Dans la Roya, cette pinède peut héberger de nombreuses espèces patrimoniales en limite d'aire occidentale dans les Alpes-Maritimes ou endémiques : Ostrya carpinifolia, Sesleria argentea, Carex ferruginea subsp. tenax, Euphorbia hyberna subsp. canutii, Fritillaria involucrata.

Menaces
Faibles (pas d'exploitation sylvicole à l'heure actuelle)

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie
BLASI, DI PIETRO & FILESI, 2004

Ecologie

Pentes fortes d'ubac ou d'exposition intermédiaire, de 450 à 1000 m. d'altitude, sur substrat siliceux (pélite) ou calcaire, sol peu profond, ambiance mésoxérophile.

Physionomie de l'habitat

Pinède de pin sylvestre accompagnée par Ostrya carpinifolia, Quercus pubescens, Acer opalus.
La strate arbustive peu dense est constituée par : Prunus mahaleb, Cotinus coggygria, Hippocrepis emerus, Buxus sempervirens, Cytisophyllum sessilifolium.
Cette pinède se caractérise par un sous-bois herbacé constitué d'un tapis étendu de Sesleria argentea.

Cortège floristique
Acer opalus Mill., 1768
Buxus sempervirens L., 1753
Campanula trachelium L., 1753
Carex ferruginea subsp. tenax (H.Christ) K.Richt., 1890
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet, 1984
Helleborus foetidus L., 1753
Ostrya carpinifolia Scop., 1772
Pinus sylvestris L., 1753
Quercus pubescens Willd., 1805
Sesleria argentea (Savi) Savi, 1808

Dynamique de la végétation

Cette pinède s'intègre dans la série occidentale du chêne pubescent, sous-série inférieure dans la Tinée alors que dans la Roya, elle intègre la série de l'Ostrya.

Etat de la connaissance

Faible

Code:271	Ostryaie mésoméditerranéenne mésophile à chêne vert	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir (Ostryo carpinifoliae - Quercetum ilicis Lapraz 1975 pro parte)		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Carpinion orientalis Horvat 1958
CORINE biotope	41.811	Bois de Charmes houblon méso-méditerranéens
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Groupement original et mal décrit, spécial aux Alpes-Maritimes.

Menaces
Peu menacé dans les stations encaissées de gorges.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BLASI, DI PIETRO & FILESI, 2004
LAPRAZ, 1975

Ecologie

Bas de versants exposés au nord, fonds de vallons encaissés, entre 150 et 400 m. d'altitude, à l'étage mésoméditerranéen supérieur. Substrat calcaire. Pentes moyennes à faible, souvent sur anciennes restanques.

Physionomie de l'habitat

Forêt dominée par le charme-houblon dans la strate arborescente, accompagné de Acer opalus, Quercus pubescens, Quercus ilex. Strate arbustive caractérisée par des arbustes et lianes sclérophylles : Viburnum tinus, Laurus nobilis, Phillyrea latifolia, Smilax aspera, et Hippocrepis emerus, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare. Strate herbacée riche, avec Melica uniflora, Sanicula europaea, Hedera helix, Primula vulgaris, Ruscus aculeatus, Brachypodium sylvaticum, Hepatica nobilis etc.

Cortège floristique
Acer opalus Mill., 1768
Daphne laureola L., 1753
Fraxinus ornus L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
Melica uniflora Retz., 1779
Ostrya carpinifolia Scop., 1772
Phillyrea latifolia L., 1753
Primula vulgaris Huds., 1762
Quercus ilex L., 1753
Ruscus aculeatus L., 1753
Sanicula europaea L., 1753
Smilax aspera L., 1753
Viburnum tinus L., 1753

Dynamique de la végétation

Se situe au contact de la chênaie verte mésoxérophile à Ostrya carpinifolia et Fraxinus ornus, située sur des versants pentus.

Variabilité et affinité de l'habitat

Se différencie de la chênaie verte mésoxérophile à Ostrya carpinifolia et Fraxinus ornus par la strate herbacée riche en espèces mésophiles de sous-bois. Se différencie de l'ostryaie mésophile à buis supraméditerranéenne par la présence, surtout dans la strate arbustive, de nombreux arbustes et lianes sclérophylles caractéristiques des yeuseraies.

Etat de la connaissance

Faible. L'association décrite par Lapraz (1975) est hétérogène et comprend des yeuseraies à frênes à fleurs mésoxérophiles, ainsi que des ostryaies mésophiles de fond de vallon. L'étude de ces groupements est à reprendre dans les Alpes-Maritimes.

Code:179	Sapinière sèche calcicole à charme-houblon et seslérie argentée

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Campanulo persicifoliae-Ostryetum carpinifoliae Barbero, Loisel & Gruber 1971	Cephalanthero rubrae - Fagion sylvaticae (Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958)...

CORINE biotope	42.12	Sapinières calciphiles
Natura 2000	9150	Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Présence de nombreuses espèces végétales endémiques ou en limite d'aire occidentale : Ostrya carpinifolia, Sesleria argentea, Carex ferruginea subsp. tenax, Teucrium lucidum, Fritillaria involucrata.

Menaces
Faibles (exploitations difficiles, pentes fortes)

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO, GRUBER & LOISEL, 1971
LAPRAZ, 1983

Ecologie

Croupes, pentes fortes et hauts de versants aux expositions intermédiaires, de 1000 à 1800 m. d'altitude, sur substrat calcaire et flysch. Sol peu profond avec affleurements rocheux, ambiance mésoxérophile.

Cortège floristique
Abies alba Mill., 1768
Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 1809
Campanula persicifolia L., 1753
Carex ferruginea subsp. tenax (H.Christ) K.Richt., 1890
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888
Fritillaria involucrata All., 1789
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799
Ostrya carpinifolia Scop., 1772
Sesleria argentea (Savi) Savi, 1808
Teucrium lucidum L., 1759

Physionomie de l'habitat

Forêt mélangée à Abies alba accompagné de Ostrya carpinifolia, Acer opalus, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Tilia platyphyllos.
Sesleria argentea forme des tapis caractéristiques en sous-bois avec Brachypodium rupestre, Calamagrostis varia, Campanula persicifolia, Cephalanthera longifolia, Daphne mezereum, Galium aristatum, Geranium nodosum, Hepatica nobilis, Luzula nivea, Prenanthes purpurea, Pulmonaria saccharata, Saxifraga cuneifolia, Solidago virgaurea, Trochiscanthes nodiflora, Veronica urticifolia, Teucrium lucidum, Carex ferruginea subsp. tenax, Fritillaria involucrata.

Dynamique de la végétation

Série mésophile du hêtre, sous-série à sapin

Variabilité et affinité de l'habitat

En 1983, LAPRAZ a décrit une sous-association à Campanula persicifolia du Seslerio argenteae-Ostryetum de l'étage montagnard, à laquelle cette sapinière pourrait également se rattacher (faciès des ostryaies sèches de l'étage montagnard).

Etat de la connaissance

Faible

Code:75	Mégaphorbiaie supraméditerranéenne à eupatoire chanvrine et menthe à longues feuilles

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957

CORINE biotope	37.71	Voiles des cours d'eau
Natura 2000	6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Cahiers d'habitats	6430-4	Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Habitat important du point de vue entomologique (odonates).

Menaces
Modification du régime hydrologique des cours d'eau, endiguement, aménagements.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Abords de petites retenues d'eau quasi stagnante formées dans des secteurs plans à écoulement très lent de ruisseaux ou de vallons, berges de rivières, sur sol humide enrichi en matière organique par des dépôts limoneux entraînés par les cours d'eau. De 400 à 1400 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Végétation de hautes herbes composée principalement de Lythrum salicaria, Eupatorium cannabinum, Epilobium hirsutum, Mentha longifolia.

Cortège floristique
Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810
Epilobium hirsutum L., 1753
Equisetum telmateia Ehrh., 1783
Eupatorium cannabinum L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Mentha aquatica L., 1753
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Scrophularia auriculata L., 1753

Etat de la connaissance

Faible.

Code:158 **Bosquet de Trembles**

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
	Corylo avellanae-Populion tremulae (Braun-Blanq. ex Theurillat in Theurillat,...

CORINE biotope	41.D	Bois de Trembles
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Cians,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Pas de données

Menaces
Faibles (habitats très ponctuels et isolés)

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Pentes d'adret, d'ubac ou replats, sur substrat siliceux (pélites, schistes ou quartzites), de 1050 à 1550 m. d'altitude.

Cortège floristique
Populus tremula L., 1753

Physionomie de l'habitat

Peuplement dense quasi mono-spécifique de Populus tremula, occupant toujours de faibles surfaces et souvent implanté près de ruines.

Dynamique de la végétation

Peuplement de l'étage montagnard souvent intégré dans la série de la pessière-sapinière, sous-série acidophile ou de la série mésophile du pin sylvestre, sous-série acidophile.

Etat de la connaissance

Faible

Code:87	Source basophile subalpine à alpine à cardamine à feuilles d'asaret et Palustriella spp.	
Rattachement phytosociologique au niveau association Cratoneuro commutatae - Arabidetum bellidifoliae Koch 1928		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Cratoneurion commutati Koch 1928
CORINE biotope	54.12	Sources d'eaux dures
Natura 2000	7220	Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
Cahiers d'habitats	7220-1	Communautés des sources et suintements carbonatés
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Cardamine asarifolia est protégé au niveau régional.

Menaces
Perturbations sur le régime hydrologique, pollutions.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO, 1972
GUINOCHET, 1938
VAN ES, 2008

Ecologie

Sources, bordures de ruisseaux et de torrents aux eaux oligotrophes aérées et fraîches, basiques, riches en carbonate de calcium dissous, sur substrat calcaire, au-dessus de 1900 m. d'altitude.

Cortège floristique
Alchemilla coriacea Buser, 1891
Allium schoenoprasum L., 1753
Arabis soyeri subsp. subcoriacea (Gren.) Breistr., 1947
Cardamine asarifolia L., 1753
Carex frigida All., 1785
Epilobium alsinifolium Vill., 1779
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra
Palustriella falcata (Brid.) HedenÃ¤s
Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée de 30 à 50 cm. de haut dominée par Cardamine asarifolia aux feuilles cordées caractéristiques. Alchemilla coriacea est souvent abondant. Strate bryophytique bien développée avec Palustriella falcata, Palustriella commutata, Philonotis calcarea.

Variabilité et affinité de l'habitat

Sous association austro-occidentale Guinochet 1938 présente dans le PNM. Association présentant la même écologie et la même physionomie que le Cardaminetum amarae, avec lequel elle possède des espèces en commun. Le Cratoneuro commutatae - Arabidetum bellidifoliae croît au contact d'eaux carbonatées et est caractérisé par Arabis soyeri subsp. subcoriacea, Alchemilla coriacea, et les bryophytes Palustriella falcata, Palustriella commutata.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:88	Formation de tuf à Palustriella commutata

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Cratoneurion commutati W.Koch 1928

CORINE biotope	54.12	Sources d'eaux dures
Natura 2000	7220	Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
Cahiers d'habitats	7220-1	Communautés des sources et suintements carbonatés
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Var,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Très fort

Menaces
Très menacé et en régression sur l'ensemble de son aire, par des causes anthropiques (pollutions, prélèvement d'eau domestique, modification du régime hydrique des cours d'eau) et naturelles (épisodes de sécheresse longs et répétés). La pratique du canyoning et de la randonnée aquatique contribuent à la fragilisation et la dégradation de l'habitat.

Enjeu de conservation
Très fort

Bibliographie

Ecologie

Dépôts de tufs calcaires formés au voisinage des sources et résurgences, au pied des cascades, sur la surface émergée des rochers, dans le lit des ruisseaux. Le bicarbonate de calcium contenu dans l'eau qui ruissèle sur les parois précipite au contact de bryophytes tufogènes dont les tiges se chargent d'incrustations. Formations atteignant leur développement optimal dans les stations bien protégées du soleil, où l'alimentation en eau est pratiquement constante. Etages supraméditerranéen à montagnard, sur calcaire.

Cortège floristique
Conocephalum conicum (L.) Dumort.
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa
Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.
Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon
Leiocolea turbinata (Raddi) H.Buch
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.
Pinguicula vulgaris L., 1753
Southbya tophacea (Spruce) Spruce

Physionomie de l'habitat

Aspects divers : monticules de tuf, cascade, parois travertinisées dans les canyons. Strate herbacée absente ou pauvre en espèces, avec plantes transgressives de mégaphorbiaies ou de bas-marais alcalins, comme Pinguicula vulgaris. Strate bryophytique très recouvrante, généralement dominée par Palustriella commutata.

Dynamique de la végétation

Cet habitat est stable, tant qu'est maintenue une alimentation hydrique suffisante. En cas d'assèchement, les communautés bryophytiques dépérissent rapidement.

Variabilité et affinité de l'habitat

Confusion avec les formations similaires des étages méso et supraméditerranéens en contexte climatique plus thermophile, caractérisées par Adiantum capillus-veneris.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:268 **Communauté subalpine à alpine des sources oligotrophes à arabette à feuilles de pâquerette et laîche des régions froides**

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A définir	Cratoneurion commutati Koch 1928

CORINE biotope	54.12	Sources d'eaux dures
Natura 2000	7220	Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	

Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye

Intérêt patrimonial
Fort. Arabis soyeri subsp. subcoriacea est une espèce rare.

Menaces
Perturbations sur le régime hydrologique, pollutions.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
VAN ES, 2003

Ecologie

Bordure de sources et de ruisseaux, dans des eaux oligotrophes pauvres en oxygène, entre 2000 et 2500 m. d'altitude.

Cortège floristique
Arabis soyeri subsp. subcoriacea (Gren.) Breistr., 1947
Carex frigida All., 1785
Epilobium alsinifolium Vill., 1779
Pinguicula vulgaris L., 1753
Saxifraga aizoides L., 1753

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée basse (hauteur inférieure à 5 à 10 cm), ouverte (recouvrement de l'ordre de 50%), prenant naissance sur un lit de mousse ;
- physionomie marquée par les rosettes de feuilles d'aspect coriace et luisant de Arabis soyeri subsp. subcoriacea, par les rosettes gluantes de Pinguicula spp., et par le rose des touffes de Epilobium alsinifolium et le jaune de celles de Saxifraga aizoides ;
- strate arbustive éventuelle composée d'un piquetage de Salix foetida et de Salix caesia.

Etat de la connaissance

Les différentes espèces de bryophytes présentes dans ce groupement sont à préciser.

Code:267	Végétation des vieux murs en pierres ombragés et humides à cymbalaire et pâturin des bois

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Poo nemoralis-Linarietum cymbalariae Focquet 1986	Cymbalario muralis-Asplenion rutae-murariae Segal 1969

CORINE biotope		
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation

Répartition
Vésubie

Intérêt patrimonial

Menaces

Enjeu de conservation

Bibliographie

Ecologie

Vieux murs en pierres calcaires ou siliceuses ombragés et humides

Physionomie de l'habitat

Groupement caractérisé par Cymbalaria muralis, Poa nemoralis, Cheiranthus cheiri et Umbilicus rupestris. Parietaria judaica peut être abondant.

Cortège floristique

Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
Poa nemoralis L., 1753
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948

Code:166	Pineraie de pin sylvestre montagnarde d'adret sur pente rocheuse siliceuse à canche flexueuse	
Rattachement phytosociologique au niveau association Deschampsio flexuosae - Pinetum sylvestris Br.-Bl. 1961		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Deschampsio flexuosae - Pinion sylvestris Br.-Bl. 1961
CORINE biotope	42.55	Forêts steppiques intra-alpines à Minuartia
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Richesse floristique

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Adrets plus ou moins pentus et rocailleux, sur substrat siliceux. Parfois sur pentes d'éboulis stabilisés (dépôts glaciaires siliceux).

Physionomie de l'habitat

Forêt dominée par Pinus sylvestris. Sous bois clair et lumineux. Strate arbustive peu fournie. Strate herbacée constituée parfois par des tapis étendus de Luzula pedemontana, avec Deschampsia flexuosa.

Cortège floristique

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836
Genista germanica L., 1753
Jasione montana L., 1753
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799
Luzula pedemontana Boiss. & Reut., 1852
Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell., 1907
Pinus sylvestris L., 1753
Saponaria ocymoides L., 1753
Silene nutans L., 1753
Silene rupestris L., 1753
Teucrium scorodonia L., 1753
Vaccinium myrtillus L., 1753
Vicia cracca subsp. incana (Burnat) Rouy, 1899

Etat de la connaissance

Moyen

Code:204	Forêt de mélèze montagnarde acidophile, xérophile

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Deschampsio flexuosae - Pinion sylvestris Br.-Bl. 1961

CORINE biotope	42.3	Forêts de Mélèzes et d'Arolles
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Habitat original

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LAVAGNE, 1964

Ecologie

Pentes fortes orientées sud, sud-est ou est, sur sol superficiel rocailleux ou présentant des affleurements de roche siliceuse (gneiss), de 1250 à 1800 m d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Forêt clairiérée dominée par le mélèze.

Dynamique de la végétation

Ce groupement vraisemblablement de cause anthropique a dû se mettre en place suite à un épisode de surpâturage ayant provoqué une érosion importante des sols sur ce versant, favorable à une colonisation active du mélèze depuis les massifs environnants qui a supplanté le pin sylvestre. Un phénomène analogue a été décrit dans l'Ubaye par LAVAGNE (1964), sur substrat calcaire (forêts de mélèze "per descensum").

Cortège floristique
Betula pendula Roth, 1788
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836
Dianthus seguieri Vill., 1779
Genista pilosa L., 1753
Larix decidua Mill., 1768
Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell., 1907
Pinus sylvestris L., 1753
Sedum annuum L., 1753

Etat de la connaissance

Faible

Code:60	Ourlet et clairière mésophile montagnarde à sénéçon de Fuchs	
Rattachement phytosociologique au niveau association Senecietum fuschii Pfeiff. 1936		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Epilobion angustifolii Tüxen ex Eggler 1952
CORINE biotope	31.8711	Clairières à Epilobes et Digitales
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
A préciser.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Groupement nitrophile semi-héliophile des bords de pistes d'exploitation et des clairières dans les sapinières, pessières et hêtraies-sapinières.

Physionomie de l'habitat

Végétation de hautes herbes nitrophiles, dominée par Senecio ovatus.

Dynamique de la végétation

Evolue vers des formations arbustives de coupe à Salix capraea, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia, Laburnum alpinum.

Cortège floristique
Digitalis grandiflora Mill., 1768
Epilobium angustifolium L., 1753
Hypericum hirsutum L., 1753
Roegneria canina (L.) Nevski, 1934
Rubus idaeus L., 1753
Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803
Stachys alpina L., 1753

Etat de la connaissance

Faible

Code:61	Ourlet et clairière nitrophile à épilobe à feuilles étroites	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Epilobion angustifolii Tüxen ex Eggler 1952
CORINE biotope	31.8711	Clairières à Epilobes et Digitales
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Verdon,Ubaye,Cians,Roya

Intérêt patrimonial
A préciser

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Talus en bordure des pistes forestières, clairières naturelles de régénération de sapinière, sur sol frais, basique ou acidocline, à l'étage montagnard, au sein de la série de la hêtraie-sapinière.

Cortège floristique
Arctium nemorosum Lej., 1833
Epilobium angustifolium L., 1753
Hypericum hirsutum L., 1753
Roegneria canina (L.) Nevski, 1934
Rubus hirtus Waldst. & Kit., 1805
Rubus idaeus L., 1753
Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée composée de hautes herbes mésophiles et plus ou moins nitrophiles, souvent dominée par Epilobium angustifolium, avec Rubus idaeus, Roegneria canina. Communauté présentant sur certains sites une grande diversité floristique. Se présente souvent associé à un groupement pionnier à Salix capraea, Laburnum alpinum, Corylus avellana.

Dynamique de la végétation

Evolue vers des boisements pionniers à Salix capraea, Laburnum alpinum, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia.

Etat de la connaissance

Faible

Code:237	Banc de graviers à astragale esparcette	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Epilobion fleischeri G.Braun-Blanq. ex Braun-Blanq. 1949
CORINE biotope	24.22	Bancs de graviers végétalisés
Natura 2000	3220	Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée
Cahiers d'habitats	3220-2	Végétations ripicoles herbacées de la base de l'étage montagnard et de l'étage collinéen des Alpes et des...
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Var,Tinée

Intérêt patrimonial
Groupement original non décrit bien présent dans les vallées du Var et de la Tinée

Menaces
Habitat lié au fonctionnement hydrologique naturel des cours d'eau à régime torrentiel et à la dynamique d'engravement.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Alluvions grossières des torrents et rivières alpins, à basse altitude (500 à 1000 m.)

Physionomie de l'habitat

Groupement pionnier au recouvrement très faible, caractérisé par notamment par de plusieurs espèces de fabacées des genres Astragalus, Ononis, Melilotus, d'espèces issues des éboulis subalpins à alpins, et des compagnes de friches.

Cortège floristique
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812
Artemisia campestris L., 1753
Astragalus monspessulanus L., 1753
Astragalus onobrychis L., 1753
Astragalus sempervirens Lam., 1783
Epilobium dodonaei Vill. subsp. dodonaei
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916
Gypsophila repens L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Ononis natrix L., 1753
Ononis rotundifolia L., 1753
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon, 1876
Tussilago farfara L., 1753

Dynamique de la végétation

L'évolution de cet habitat est liée à la dynamique naturelle des cours d'eau (régime torrentiel). Il s'insère dans la série de l'aulne blanc, dont il constitue la phase pionnière. Il est supplanté par la saulaie à saule drapé, qui évolue à son tour vers l'aulnaie blanche ou la peupleraie noire

Variabilité et affinité de l'habitat

Groupement proche de l'Epilobio dodonaei subsp. dodonaei - Scrophularietum caninae Koch & Braun-Blanquet in Braun-Blanquet 1949. Cet habitat présente une parenté étroite avec la végétation des éboulis calcaires, dont de nombreuses espèces se retrouvent ici.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:238	Banc de graviers à épilobe de Fleischer	
Rattachement phytosociologique au niveau association Epilobietum dodonaei subsp. fleischeri Braun-Blanquet 1923		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Epilobion fleischeri G.Braun-Blanq. ex Braun-Blanq. 1949
CORINE biotope	24.221	Groupements d'Epilobes des rivières subalpines
Natura 2000	3220	Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée
Cahiers d'habitats	3220-1	Végétations ripicoles herbacées des étages subalpin et montagnard des Alpes
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Var,Cians

Intérêt patrimonial
Présence d'une espèce protégée : Hedysarum boutignyanum (protection nationale)

Menaces
- rectification du lit des des cours d'eau par endiguement (empierrement des rives).
- ouverture et exploitation de gravières.
- circulation d?engins à moteur de type quad sur les bancs de gravier des cours d?eau

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
VANES, 2003

Ecologie

Alluvions torrentielles humides calcaires et marno-calcaires, aux étages montagnard et subalpin, de 1300 à 1900 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Groupement pionnier au recouvrement très faible, dominé par Epilobium dodonaei subsp. fleicheri

Cortège floristique
Epilobium dodonaei subsp. fleischeri (Hochst.) Schinz & Thell., 1923
Gypsophila repens L., 1753
Petasites paradoxus (Retz.) Baumg., 1816
Pimpinella saxifraga L., 1753
Saxifraga aizoides L., 1753
Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip., 1861
Tussilago farfara L., 1753
Valeriana rotundifolia Vill., 1787

Dynamique de la végétation

Peut évoluer vers une saulaie à Salix elaeagnos, puis vers une aulnaie blanche

Variabilité et affinité de l'habitat

Variante des niveaux topographiques élevés, moins soumise aux crues, enrichie en espèces de pelouses.
Confusion avec la végétation subalpine des roubines marneuses (Petasitetum paradoxi athamantetosum cretensis), qui s'en distingue par l'absence de Epilobium dodonaei subsp. fleicheri.

Etat de la connaissance

moyen

Code:162	Pineraie de pin sylvestre montagnarde sur pente rocheuse calcaire d'ubac à seslérie bleue	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Erico carneae - Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh &...
CORINE biotope	42.58	Forêts mésophiles de Pins sylvestres des Alpes sud-occidentales
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Grande diversité floristique du sous-bois herbacé.
Habitat d'espèces pour deux espèces végétales de l'Annexe II de la Directive Habitats : Aquilegia bertolonii et Gentiana ligustica.

Menaces
Peu menacé.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pentes fortes, croupes et vires rocheuses calcaires d'ubac, de 1000 à 1500 m. d'altitude, sol rocailleux peu profond. Ambiance mésophile.

Physionomie de l'habitat

Ces pinèdes sont dominées par Pinus sylvestris accompagné de feuillus aux altitudes les plus basses : Acer opalus, Sorbus aria, Salix capraea, et de Picea abies et Abies alba plus en altitude.
La strate arbustive est diversifiée : Amelanchier ovalis, Cytisophyllum sessilifolium, Viburnum lantana, Corylus avellana, Buxus sempervirens, Juniperus communis, Lonicera xylosteum, Hippocrepis emerus.
La strate herbacée se compose de Sesleria caerulea, qui constitue souvent des tapis, Calamagrostis varia, Brachypodium rupestre, Hieracium bifidum, Ranunculus aduncus, Hepatica nobilis, Aster bellidiastrum, Festuca dimorpha, Carex ferruginea subsp. tenax, Teucrium lucidum, Gentiana ligustica, Aquilegia bertolonii, Arctostaphylos uva-ursi, Phyteuma orbiculare, Euphorbia dulcis, Orthilia secunda, Pyrola chlorantha, Rubus saxatilis, Goodyera repens, Primula veris subsp. columnae, Laserpitium latifolium, Dactylorhiza fuschii. La strate bryophytique, plus ou moins développée, comprend Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triqueter, Dicranum scoparium.

Cortège floristique
Aquilegia bertolonii Schott, 1853
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825
Bellidiastrum michelii Cass., 1817
Buxus sempervirens L., 1753
Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 1809
Carex ferruginea subsp. tenax (H.Christ) K.Richt., 1890
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Festuca dimorpha Guss., 1826
Gentiana ligustica R.Vilm. & Chopinet, 1956
Hieracium bifidum Kit., 1815
Pinus sylvestris L., 1753
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763
Teucrium lucidum L., 1759

Dynamique de la végétation

Les forêts installées sur fortes pentes semblent stables et climaciques (série mésophile du pin sylvestre). En revanche, dans certaines situations, elles constituent une phase pionnière de pessières et sapinières du trochiscantho-Abietum.

Variabilité et affinité de l'habitat

- variante plus interne riche en à Arctostaphylos uva-ursi

Code:170	Pineraie de pin sylvestre calcicole montagnarde d'ubac à bruyère des neiges	
Rattachement phytosociologique au niveau association Erico carneae - Pinetum sylvestris Br.-Bl. in Br. Bl. et al. 1939		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Erico carneae - Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh &...
CORINE biotope	42.54	Forêts de Pins sylvestre à Erica herbacea
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Intérêt patrimonial fort du fait de sa rareté au niveau français.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
CHARPIN A. & SALANON R., 1972
OFFERHAUS B. & FRACHON C., 2008

Ecologie

Ubacs frais à la base de l'étage montagnard, sur substrat calcaire.

Physionomie de l'habitat

Forêt de pin sylvestre, avec Sorbus aria, Acer opalus dans la strate arborescente. Strate arbustive composée de Corylus avellana, Cytisophyllum sessilifolium, Amelanchier ovalis. La strate herbacée est marquée par l'abondance de Erica carnea, accompagné notamment de Sesleria argentea, Carex ferruginea subsp. tenax, Rubus saxatilis, Polygala chamaebuxus, Luzula nivea, Festuca dimorpha, Teucrium lucidum.

Cortège floristique
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Carex ferruginea subsp. tenax (H.Christ) K.Richt., 1890
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Erica herbacea L., 1753
Luzula nivea (L.) DC., 1805
Pinus sylvestris L., 1753
Polygala chamaebuxus L., 1753
Rubus saxatilis L., 1753
Sesleria argentea (Savi) Savi, 1808
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763
Teucrium lucidum L., 1759

Dynamique de la végétation

Habitat stable

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:172	Pineraie de pin à crochet sur calcaire montagnarde à subalpine à raisin d'ours	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Erico carneae - Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh &...
CORINE biotope	42.421	Forêts de Pins de montagne des Alpes internes
Natura 2000	9430	Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Verdon,Var,Tinée

Intérêt patrimonial
Habitat d'espèces pour trois espèces végétales de l'annexe II de la Directive Habitats : Gentiana ligustica, Aquilegia bertolonii et Buxbaumia viridis.

Menaces
L'exploitation forestière peu envisageable.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Pentes raides orientées est nord-est, de 1400 à 2135 m. d'altitude, sur substrat calcaire rocailleux superficiel, ambiance hélioxérophile.

Physionomie de l'habitat

Forêt de clairiérée de pin à crochet dominant, accompagné du mélèze et du pin sylvestre. Strate arbustive composée de Buxus sempervirens, Amelanchier ovalis, Juniperus communis, Cytisophyllum sessilifolium, Cotoneaster tomentosus. Sous-bois herbacé implanté sur des vires rocheuses, structuré par Sesleria caerulea et Arctostaphyllos uva-ursi, avec Pulsatilla alpina, Gentiana ligustica, Aquilegia bertolonii, Solidago virgaurea, Aster bellidiastrum, Hieracium bifidum, Festuca dimorpha, Achnatherum calamagrostis.

Dynamique de la végétation

Stabilité stationnelle. Série méridionale du pin à crochet.

Etat de la connaissance

Faible

Cortège floristique
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Aquilegia bertolonii Schott, 1853
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825
Bellidiastrum michelii Cass., 1817
Buxus sempervirens L., 1753
Gentiana ligustica R.Vilm. & Chopinet, 1956
Larix decidua Mill., 1768
Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, 1936
Pinus sylvestris L., 1753
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre, 1800
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763

Code:173	Pinède de pin à crochets d'ubac sur éboulis marneux

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Erico carneae - Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh &...

CORINE biotope	42.421	Forêts de Pins de montagne des Alpes internes
Natura 2000	9430	Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Habitat d'espèces pour trois espèces végétales de l'annexe II de la Directive Habitats : Gentiana ligustica, Aquilegia bertolonii et Buxbaumia viridis. Présence d'autres espèces végétales protégées : Hedysarum boutignyanum et Primula marginata (Protection nationale)

Menaces
Faibles (pas d'exploitation forestière dans ces pentes marneuses peu accessibles)

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
FAURE, 1968

Ecologie

Pentes calcaires ou d'éboulis marneux d'ubac, de 1700 à 1900 m. d'altitude, sol argileux et humide.

Physionomie de l'habitat

Forêt de pin à crochets dominant, accompagné par Abies alba, Picea abies, Larix decidua que l'on retrouve dans la strate arbustive.

Le sous-bois herbacé est dominé par Calamagrostis varia, accompagné d'espèces mésophiles telles Tofieldia calyculata, Carex ferruginea subsp. tenax, Soldanella alpina, Prenanthes purpurea, Viola biflora. On trouve également dans le sous-bois des plantes plus mésoxérophiles : Sesleria caerulea, Arctostaphyllos uva-ursi, Pulsatilla alpina, Orthilia secunda, Solidago virgaurea, Hepatica nobilis, Hieracium bifidum, Aster bellidiastrum, Phyteuma orbiculare, et des espèces électives des éboulis comme Hedysarum boutignyanum, Festuca dimorpha, Aquilegia bertolonii.

Cortège floristique
Abies alba Mill., 1768
Aquilegia bertolonii Schott, 1853
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825
Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 1809
Carex ferruginea subsp. tenax (H.Christ) K.Richt., 1890
Festuca dimorpha Guss., 1826
Hedysarum hedysaroides subsp. boutignyanum (A.Camus) Jauzein, 2010
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, 1936
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre, 1800
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., 1812

Dynamique de la végétation

Stabilité stationnelle. série méridionale du pin à crochet.

Variabilité et affinité de l'habitat

Ce type de pinède de pin à crochets à Calamagrostis varia et Tofielda calyculata se retrouve également sur calcaire à plus basse altitude (1300 m) aux expositions les plus fraîches et sur des sols à bonne rétention hydrique.

Etat de la connaissance

Une pinède de pin à crochets signalée dans le Vercors septentrional (FAURE, 1968) se rapproche de ce groupement

Code:174	Pineraie de pin à crochets calcicole montagnarde d'ubac à bruyère des neiges	
Rattachement phytosociologique au niveau association Erico carneae - Pinetum uncinatae Br.-Bl. et al.1954		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Erico carneae - Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh &...
CORINE biotope	42.4212	Forêts de Pins de montagne à Erica herbacea
Natura 2000	9430	Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)
Cahiers d'habitats	9430-1	Pineraies mésophiles de Pin à crochets à Bruyère des neiges des Alpes internes
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Intérêt patrimonial du fait de sa rareté au niveau français.
Présence de Erica carnea, protégée au niveau régional et de Pyrola media, rare dans les Alpes-Maritimes.
Habitat d'espèces pour Buxbaumia viridis (espèce végétale de l'Annexe II de la Directive Habitats).

Menaces
Exploitation forestière

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
CHARPIN & SALANON, 1972

Ecologie

Pentes raides d'ubac sur substrat calcaire, de 1500 à 1700 m. d'altitude, sol moyennement profond, ambiance mésophile.

Physionomie de l'habitat

Pinède de pin à crochet. la strate arbustive est quasi absente. La strate herbacée est dominée par Erica carnea, avec Sesleria caerulea, Hieracium bifidum, Orthilia secunda, Pyrola media, Moneses uniflora, Goodyera repens, Hepatica nobilis, Luzula nivea, Aster bellidiastrum.

Cortège floristique
Bellidiastrum michelii Cass., 1817
Carex ferruginea subsp. tenax (H.Christ) K.Richt., 1890
Erica herbacea L., 1753
Goodyera repens (L.) R.Br., 1813
Hieracium bifidum Kit., 1815
Luzula nivea (L.) DC., 1805
Moneses uniflora (L.) A.Gray, 1848
Orthilia secunda (L.) House, 1921
Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, 1936
Pyrola media Sw., 1804
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763

Dynamique de la végétation

Habitat stable

Etat de la connaissance

Bonne

Code:184	Pessière d'adret calcicole du montagnard supérieur à calamagrostide bigarrée	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Erico carneae - Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh &...
CORINE biotope	42.222	Pessières montagnardes intra-alpines calciphiles
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Cians,Tinée

Intérêt patrimonial
Habitat très rare dans les Alpes-Maritimes.

Menaces
Exploitation forestière

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Pentes fortes d'adret ou en exposition intermédiaire, de 1400 à 1900 m. d'altitude, sur substrat calcaire ou marneux, sol rocailleux peu profond, ambiance hélio-xérophile.

Physionomie de l'habitat

Pessière à Picea abies accompagné de Pinus sylvestris et Larix decidua abondants dans la strate arborescente. Strate arbustive avec Buxus sempervirens, Amelanchier ovalis, Cytisophyllum sessilifolium.
Sous-bois herbacé dominé par des tapis de Calamagrostis varia, avec Fragaria vesca, Solidago virgaurea, Anemone hepatica, Prunella grandiflora, Ranunculus aduncus, Hieracium bifidum, Melampyrum sylvaticum, Goodyera repens, Rubus saxatilis, Helleborus foetidus, Sesleria caerulea, Luzula nivea, Brachypodium rupestre, Pyrola chlorantha.

Dynamique de la végétation

Série interne de l'épicéa

Etat de la connaissance

Faible

Cortège floristique
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812
Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 1809
Larix decidua Mill., 1768
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Pinus sylvestris L., 1753
Prunella grandiflora (L.) SchÃ¶ller, 1775
Ranunculus aduncus Gren., 1847
Rubus saxatilis L., 1753
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763
Solidago virgaurea L., 1753

Code:96	Ceinture lacustre subalpine à alpine acidophile à linaigrette de Scheuchzer	
Rattachement phytosociologique au niveau association Eriophoretum scheuchzeri Rübel 1912		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Eriophorion scheuchzeri Hadac 1939
CORINE biotope	54.41	Ceintures lacustres à Eriophorum scheuchzeri
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Association peu fréquente.

Menaces
Assèchement des plans d'eau.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO, 1972
GUINOCHET, 1938

Ecologie

Bordure de petits bassins, de lacs et de nappes d'eau, sur substrat siliceux. S'observe entre 2300 m. et 2500 m. d'altitude. dans le Mercantour occidental, et entre 2000 et 2200 m. dans le Mercantour oriental.

Cortège floristique
Carex nigra (L.) Reichard, 1778
Eriophorum scheuchzeri Hoppe, 1800
Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée constituée presque exclusivement par des peuplements de Eriophorum scheuchzeri, se reconnaissant de loin à ses aigrettes d'un blancs de neige semblables à des pompons. Strate bryophytique en partie immergée à Scorpidium revolvens. L'association n'occupe généralement que quelques mètres carrés, disposée en ceinture.

Dynamique de la végétation

Rôle pionnier dans la colonisation de l'eau libre. Précède l'implantation du Caricetum fuscae et du Trichophoretum caespitosi-alpinum.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:136	Ostryaie montagnarde à sapin et trochiscanthe nodiflore	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Fagion sylvaticae Luquet 1926
CORINE biotope	41.813	Bois de Charmes houblon montagnards
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Abrite plusieurs espèces végétales patrimoniales rares, protégées, endémiques ou en limite occidentale d'aire de répartition : Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus, Sesleria argentea, Carex ferruginea subsp. tenax, Polystichum setiferum, Hyacinthoides italica, Asperula taurina.

Menaces
Peu menacé et non concerné à moyen ou long terme par des projets d'exploitation sylvicole.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
GRUBER, 1968

Ecologie

Versants d'ubac, fonds de vallons humides de l'étage montagnard, sur subatrat calcaire. A l'étage montagnard inférieur, elle occupe les stations les plus fraîches, et peut descendre jusqu'à 600 m d'altitude (Bendola). Plus en altitude, elle se cantonne en exposition intermédiaire (atteint 1600 m d'altitude dans la forêt communale de Breil-sur-roya).

Cortège floristique
Abies alba Mill., 1768
Acer pseudoplatanus L., 1753
Actaea spicata L., 1753
Adoxa moschatellina L., 1753
Anemone ranunculoides L., 1753
Asperula taurina L., 1753
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903
Geranium nodosum L., 1753
Ostrya carpinifolia Scop., 1772
Trochiscanthes nodiflora (All.) W.D.J.Koch, 1824

Physionomie de l'habitat

Forêt mélangée composée de divers feuillus dont le charme-houblon, le sapin, le charme commun et divers érables en abondance variable. Le sous-bois herbacé est très diversifié.

Dynamique de la végétation

Maturation possible vers une sapinière.

Variabilité et affinité de l'habitat

Faciès à charme-houblon dans lequel le sapin est discret.

Etat de la connaissance

Faible. A étudier.

Code:157 **Taillis de noisetier montagnard**

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A définir	Fagion sylvaticae Luquet 1926

CORINE biotope	31.8C	Fourrés de Noisetiers
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Cians,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Présence en Roya d'une espèce végétale protégée au niveau régional dans le sous-bois herbacé du taillis à noisetier : Hesperis inodora.

Menaces
Faibles

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Bas de versant d'ubac ou fonds de vallon, de 1150 à 1450 m. d'altitude, sol profond sur pélite ou calcaire, ambiance fraîche et humide.

Physionomie de l'habitat

Ces taillis de noisetier montagnards peuvent être mêlés à Fraxinus excelsior et Tilia platyphyllos.
La strate herbacée est constituée d'espèces mésohygrophiles avec Salvia glutinosa, Geranium nododum, Listera ovata, Hesperis inodora, Aconitum variegatum subsp. paniculatum, Aconitum lycoctonum.

Cortège floristique
Aconitum lycoctonum L., 1753
Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcang.) Negodi, 1944
Corylus avellana L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Geranium nodosum L., 1753
Hesperis inodora L., 1753
Listera ovata (L.) R.Br., 1813
Salvia glutinosa L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771

Etat de la connaissance

Faible

Code:178	Sapinière montagnarde calcicole méridionale à trochiscanthe nodiflore	
Rattachement phytosociologique au niveau association Trochiscantho nodiflori - Abietetum albae Br.-Bl. 1961		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Fagion sylvaticae Luquet 1926
CORINE biotope	42.1113	Sapinières à Trochiscanthes
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Var,Cians,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Habitat d'espèce pour Buxbaumia viridis et Orthotrichum rogeri, mousses de l'annexe II de la directive Habitats.

Menaces
Les sapinières âgées riches en très gros bois sont rares, en raison de l'exploitation forestière.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO, 1970
BARBERO & BONO, 1970
BRESSET, 1975

Ecologie

Pentes d'ubac sur substrat calcaire, calcaro-marneux, flysch, de 1000 à 1800 m. d'altitude. Ambiance sciaphile, mésophile à mésohygrophile.

Cortège floristique
Abies alba Mill., 1768
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, 1769
Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze, 1891
Galium aristatum L., 1762
Geranium nodosum L., 1753
Prenanthes purpurea L., 1753
Trochiscanthes nodiflora (All.) W.D.J.Koch, 1824

Physionomie de l'habitat

Forêt dominée par le sapin (Abies alba), accompagné dans la strate arborescente de Picea abies, Larix decidua, Acer opalus, Pinus sylvestris.
La strate arbustive se compose de Laburnum alpinum, Sorbus aucuparia, Corylus avellana.
La strate herbacée neutrophile, plus ou moins diversifiée et en rapport avec le recouvrement des strates ligneuses comprend entre autres : Trochiscanthes nodiflora, Calamintha grandiflora, Cardamine pentaphyllos, Galium aristatum, Oxalis acetosella, Veronica urticifolia, Saxifraga cuneifolia, Mycelis muralis, Geranium nodosum, Hepatica nobilis, Hieracium prenanthoides, Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca, Euphorbia dulcis, Pulmonaria saccharata, Luzula nivea, Paris quadrifolia, Prenanthes purpurea, Corallorhiza trifida, Solidago virgaurea, Actaea spicata, Aconitum lycoctonum, Ranunculus aduncus, Viola biflora, Lilium martagon, Lathyrus vernus.

Dynamique de la végétation

Terme climacique de la série de la Hêtraie-sapinière.

Variabilité et affinité de l'habitat

- sous-association buxetosum décrit dans la vallée de la Vésubie (BRESSET,1975), caractérisée par l'abondance du buis (Buxus semeprvirens) dans la strate arbustive, et par Daphne laureola, Sanicula europaea, Melica uniflora, Festuca heterophylla.
- variante à Anemone trifolia des chaînons préalpins de la Roya frontaliers avec la Ligurie (Tête d'Alpe, Bois Noir de Saorge), caractérisée par l'abondance de Anemone trifolia dans la strate herbacée, avec Anemone ranunculoides, Aegopodium podagraria, sur calcaire et flysch. Cette variante se rapproche de la hêtraie ligure de l' Anemono - Fagetum Barbero 70 nom.

Code:33	Pelouse subalpine acidophile d'adret à potentille de Valderi	
Rattachement phytosociologique au niveau association Festuco scabriculmis - Potentilletum valderiae Guinochet 1938		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Festucion variae Br.-Bl. 1926
CORINE biotope	36.33	Pelouses siliceuses thermophiles subalpines
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Endémique du massif de l'Argentera. Présence d'une espèce endémique des Alpes maritimes : Potentilla valderia, et d'une espèce endémique des Alpes sud-occidentales : Festuca scabriculmis.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LACOSTE, 1975

Ecologie

Pente rocailleuses d'exposition sud, de 1700 à 2450 m. d'alt., sur substrat siliceux.

Cortège floristique
Dianthus furcatus Balb., 1804
Festuca acuminata Gaudin, 1811
Festuca scabriculmis (Hack.) K.Richt., 1890
Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell., 1907
Potentilla valderia L., 1759
Veronica fruticans Jacq., 1762

Physionomie de l'habitat

Pelouse ouverte, avec fréquemment un aspect en gradins lié à l'action des troupeaux ovins. Potentilla valderia est l'espèce la plus représentative de l'association.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:12	Pelouse montagnarde thermophile à fétuque méditerranéenne et brachypode rupestre	
Rattachement phytosociologique au niveau association Brachypodio pinnati - Bupleuretum exaltati Barbero & Loisel 1971		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Festuco amethystinae - Bromion erecti Barbero & Loisel 1972
CORINE biotope	34.3265	Mesobromion des Alpes sud-occidentales
Natura 2000	6210	Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites...
Cahiers d'habitats	6210-35	Pelouses méso-xérophiles montagnardes provençales et ligures
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'espèces patrimoniales : Festuca marginata subsp. laevis, Holandrea schottii. Association donnée comme endémique des Alpes maritimes franco-italiennes.

Menaces
Embroussaillement dû à l'abandon des pratiques agro-pastorales.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO & LOISEL, 1971

Ecologie

Adrets entre 1300 et 1900 m, sur des pentes ou des restanques abandonnées, sur substrat calcaire ou flysch.

Physionomie de l'habitat

Pelouse dominée par des graminées : Brachypodium rupestre, Festuca marginata subsp. laevis, Agrostis capillaris, ou Sesleria argentea, et riches en espèces de la famille des apiacées.

Cortège floristique
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Bupleurum falcatum subsp. cernuum (Ten.) Arcang., 1894
Centaurea scabiosa L., 1753
Dianthus seguieri Vill., 1779
Festuca marginata subsp. laevis (Hack.) Jauzein & J.M.Tison, 2010
Holandrea schottii (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997
Seseli annuum subsp. carvifolium (Vill.) P.Fourn., 1937

Dynamique de la végétation

Embroussaillement fréquent : évolution vers un ourlet mésoxérophile du Geranion sanguinei.

Etat de la connaissance

Faible. Les pelouses observées dans le PNM sont souvent ourlifiées. Aspect typique à rechercher.

Code:126	Chênaie verte calcicole mésoxérophile à charme-houblon et frêne à fleurs	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser (Ostryo carpinifoliae - Quercetum ilicis Lapraz 1975 pro parte)		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Fraxino orni-Quercion ilicis Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
CORINE biotope	45.319	Forêts de Chênes verts Illyriennes
Natura 2000	9340	Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
Cahiers d'habitats	9340-7	Yeuseraies à Frêne à fleurs
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'essences arborées orientales arrivant en limite occidentale de leur aire de répartition dans le département des Alpes-Maritimes : Fraxinus ornus et Ostrya carpinifolia.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BIONDI, CASAVECCHIA & GIGANTE, 2003
LAPRAZ, 1975

Ecologie

Cette forêt se développe sur substrat calcaire, à l'étage mésoméditerranéen, entre 150 et 400 m d'altitude, voire localement 700 m, sur des versants d'expositions diverses.
Ce type de forêt, répandu en Ligurie surtout dans une variante acidophile, arrive en limite d'aire dans les Alpes-Maritimes, où il caractérise un secteur préligure littoral, marqué par une pluviométrie et une température moyenne annuelle plus élevés qu'en Provence.

Cortège floristique
Fraxinus ornus L. subsp. ornus
Lonicera implexa Aiton, 1789
Ostrya carpinifolia Scop., 1772
Phillyrea media L., 1759
Quercus ilex L. subsp. ilex
Quercus pubescens Willd., 1805
Rhamnus alaternus L., 1753
Rubia peregrina L., 1753
Smilax aspera L., 1753
Viburnum tinus L., 1753
Viola alba subsp. dehnhardtii (Ten.) W.Becker, 1902

Physionomie de l'habitat

Forêt dominée par le chêne vert ou le charme-houblon. Elle se présente souvent sous l'aspect d'un taillis ou d'une forêt peu élevée. Le frêne à fleurs est très rare sur le territoire communal de Breil-sur-Roya, (plus commun vers Vintimille et entre Nice et Menton). La strate arbustive est généralement assez développée avec des arbustes et des lianes méditerranéens sclérophylles : Pistacia lentiscus, Viburnum tinus, Smilax aspera, Ruscus aculeatus, Rubia peregrina. La strate herbacée est pauvre et réduite : Asplenium onopteris, Viola alba subsp. dehnhardtii.

Variabilité et affinité de l'habitat

- Cette forêt peut se présenter sous divers aspects en fonction de la dominance d'une ou l'autre des essences arborées suivantes : chêne vert, charme-houblon, frêne à fleurs (très rare dans le PNM), chêne pubescent.
- très proche de l'Ostryo-Quercetum ilicis Trinajstic (1965) 1974, ainsi que du Fraxino orni-Quercetum ilicis Horvatic 1957 définis en Croatie. Dans cette seconde association littorale, Ostrya carpinifolia est rare ou absent.

Etat de la connaissance

Faible. L'association décrite par Lapraz (1975) est hétérogène et comprend des yeuseraies à frênes à fleurs mésoxérophiles, ainsi que des ostryaies mésophiles de fond de vallon. L'étude de ces groupements est à reprendre dans les Alpes-Maritimes.

Code:56	Lande supraméditerranéenne thermophile à bruyère arborescente, genêt d'Allemagne	
Rattachement phytosociologique au niveau association Erico arboreae - Genistetum pilosae Oberdorfer & Hofmann 1967		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Genistion tinctorio - germanicae de Foucault 1990
CORINE biotope	31.22	Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune
Natura 2000	4030	Landes sèches européennes
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Lande originale décrite dans le nord de l'Apennin et répandue en Ligurie où les terrains acides sont nombreux. Elle se raréfie dans les Alpes-Maritimes. Habitat toujours présent sur de petites surfaces.

Menaces
Incendies, écobuages, dynamique forestière.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
OBERDORFER et HOFMANN, 1967

Ecologie

Etage supraméditerranéen sur sols décarbonatés (calcaires gréseux, flysch, gneiss), généralement en adret. C'est un habitat thermophile.

Cortège floristique
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Cistus salviifolius L., 1753
Cytisus triflorus Lam., 1786
Erica arborea L., 1753
Genista germanica L., 1753
Genista pilosa L., 1753

Physionomie de l'habitat

Lande dominée par la bruyère arborescente (individus juvéniles, jusqu'à 1 m.), accompagnée par Genista germanica, Genista pilosa, Cytisus triflorus, Genista tinctoria.

Dynamique de la végétation

Ces landes évoluent vers des maquis à Erica arborea et des formations arborées à Quercus pubescens, Pinus sylvestris, Betula pendula, Castanea sativa.

Variabilité et affinité de l'habitat

Una association proche, le Cytiso hirsuti - Callunetum vulgaris Oberdorfer 1964 est à rechercher. Plus mésophile et montagnarde, elle est dépourvu d'éléments thermophiles comme Erica arborea et Cistus salvifolius, et se caractérise par la présence de Cytisus triflorus et Vaccinium myrtillus.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:66	Ourlet nitrophile hémisciaphile à alliaire officinale	
Rattachement phytosociologique au niveau association Alliario petiolatae - Chaerophylletum temuli Lohm. 1949		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Geo urbani - Alliarion petiolatae Lohmeyer & Oberdorfer ex Görs & Müller 1969
CORINE biotope	37.72	Franges des bords boisés ombragés
Natura 2000	6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Cahiers d'habitats	6430-7	Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Var,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Faible

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Lisières et clairières hémi-sciaphiles en forêt de feuillus, bord de sentiers forestiers, de 500 m à 1400 m. d'altitude. Sol profond eutrophe et frais.

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée nitrophile composée de Alliaria petiolata, urtica dioica, Chaerophyllum temulum.

Cortège floristique
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Chaerophyllum temulum L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L. subsp. robertianum
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lapsana communis L., 1753
Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811
Mycelis muralis (L.) Dumort., 1829
Urtica dioica L., 1753

Etat de la connaissance

Bonne

Code:47	Ourlet acidocline à oeillet de Séguier et persil de cerf	
Rattachement phytosociologique au niveau association Diantho seguieri - Peucedanetum oreoselini Oberdorfer 1964		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962
CORINE biotope	34.41	Lisières xéro-thermophiles
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Fort, association rare en France.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
OBERDORFER, 1964

Ecologie

Ourlet acidocline, thermophile, sur substrat siliceux. Se développe en lisière de forêt feuillue (généralement dominée par le châtaignier) ou colonise des restanques abandonnées.

Physionomie de l'habitat

Pelouse dominée par Brachypodium rupestre, Agrostis capillaris ou Pteridium aquilinum. Caractérisé par Dianthus seguieri, Oreoselinum nigrum, Phyteuma michelii, avec des espèces des ourlets basophiles mésoxérophiles : Geranium sanguineum, Clinopodium vulgare, Trifolium alpestre.

Dynamique de la végétation

Série dynamique de la châtaigneraie, avec Quercus pubescens, Betula pendula, Populus tremula.

Cortège floristique
Agrostis capillaris L., 1753
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Dianthus seguieri Vill., 1779
Genista tinctoria L., 1753
Geranium sanguineum L., 1753
Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
Teucrium scorodonia L., 1753

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:49	Ourlet basophile méso à supraméditerranéen à peucédan de Vénétie	
Rattachement phytosociologique au niveau association Xanthoselino veneti - Brachypodietum rupestris Offerhaus (à paraître)		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962
CORINE biotope	34.41	Lisières xéro-thermophiles
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Mésoméditerranéen,Supraméditerranéen

Répartition
Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Association rare en France, connu seulement des Alpes-Maritimes.

Menaces
Peu menacé.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Talus secs en lisières de chênaies pubescentes xérophiles à Cotinus coggygria, restanques sur calcaires abandonnées. Jusqu'à 800 m. d'altitude environ.

Cortège floristique
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818
Cervaria rivini Gaertn., 1788
Odontites luteus subsp. provincialis (Bolliger) J.M.Tison, 2010
Xanthoselinum alsaticum subsp. venetum (Spreng.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997

Physionomie de l'habitat

Groupement d'ourlet et de pelouse préforestière dominé par Brachypodium rupestre, avec les grandes ombellifères Xanthoselinum alsaticum subsp. venetum et Cervaria rivini. Bituminaria bituminosa peut être abondant. Campanula medium est souvent présent, au niveau des talus, Cephalaria leucantha sur restanques.

Dynamique de la végétation

Evolue vers des fruticées mésoxérophiles puis des boisements dominés par le chêne pubescent.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:264	Ourlet mésophile supraméditerranéen à seslérie argentée	
Rattachement phytosociologique au niveau association Geranio sanguinei - Seslerietum argenteae Offerhaus (à paraître)		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962
CORINE biotope	34.41	Lisières xéro-thermophiles
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Association endémique des Alpes maritimes franco-italiennes. Présence de plusieurs espèces endémiques des Alpes maritimes ou des Alpes sud-occidentales.

Menaces
Peu menacé. Favorisé par la déprise agricole et pastorale.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Lisières de forêts supraméditerranéennes à charme-houblon ou à pin sylvestre, restanques abandonnées. Sur calcaire principalement.

Cortège floristique
Buphthalmum salicifolium L., 1753
Campanula persicifolia L., 1753
Euphorbia hyberna subsp. canutii (Parl.) Tutin, 1968
Geranium sanguineum L., 1753
Leucanthemum virgatum (Desr.) Clos, 1870
Sesleria argentea (Savi) Savi, 1808

Physionomie de l'habitat

Ourlet et pelouse préforestière le plus souvent étendu en nappe, caractérisé par un tapis de Sesleria argentea, accompagné de Geranium sanguineum, Buphtalmum salicifolium, Campanula persifolia, Euphorbia hyberna subsp. canutii, leucanthemum virgatum.

Dynamique de la végétation

Ourlet pouvant persister longtemps sous une strate claire arbustive et arborescente.

Variabilité et affinité de l'habitat

variante sciaphile sous couvert de jeunes ligneux avec Euphorbia dulcis, Hedera helix, Primula vulgaris, Daphne laureola.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:265	Ourlet basophile xérophile supraméditerranéen à montagnard à buplèvre penché	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962
CORINE biotope	34.41	Lisières xéro-thermophiles
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial

Menaces

Enjeu de conservation

Bibliographie

Ecologie

Lisière de pinède de pin sylvestre, restanques abandonnées, sur calcaire, en exposition chaude.

Physionomie de l'habitat

Ourlet ou pelouse préforestière dominé par Brachypodium rupestre, avec Bupleurum falcatum subsp. cernuum, Vicia cracca subsp. incana, Festuca marginata subsp. laevis, Lathyrus latifolius, Securigera varia.

Cortège floristique

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Bupleurum falcatum subsp. cernuum (Ten.) Arcang., 1894
Festuca marginata subsp. laevis (Hack.) Jauzein & J.M.Tison, 2010
Lathyrus latifolius L., 1753
Securigera varia (L.) Lassen, 1989
Vicia cracca subsp. incana (Burnat) Rouy, 1899

Code:35	Pelouse subalpine à fétuque paniculée sur sol profond	
Rattachement phytosociologique au niveau association Hypochaerido uniflorae - Festucetum paniculatae Barbero 1972		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Hyperico richeri - Festucion paniculatae De Foucault 2012
CORINE biotope	36.3312	Pelouses mésophiles des sols profonds à Festuca paniculata
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Pelouses présentant souvent une grande richesse floristique. Présence d'une espèce Natura 2000 DH2 : Eryngium alpinum, et de plusieurs autres espèces endémiques des Alpes sud-occidentales.

Menaces
surpâturage bovin ou ovin

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO, 1972
FOUCAULT (DE), 2012
LACOSTE, 1970
VAN ES, 2003
LACOSTE, 1975

Ecologie

Pelouse mésophile, sur substrat calcaire ou siliceux, en exposition sud au-dessus de 2000 m, en exposition plus fraîche dans le subalpin moyen, sur des pentes moyennes ou faibles, et sur sol profond.

Physionomie de l'habitat

Pelouse de recouvrement élevé, richement fleurie avec de nombreuses espèces prairiales. Festuca paniculata est l'espèce dominante, avec souvent Asphodelus albus, Paradisea liliastrum.

Cortège floristique
Anemone narcissiflora L., 1753
Asphodelus albus subsp. delphinensis (Gren. & Godr.) Z.Diaz & ValdÃ©s, 1996
Centaurea uniflora Turra, 1765
Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kern., 1872
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell., 1913
Hypericum richeri Vill., 1779
Hypochaeris uniflora Vill., 1779
Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers., 1805
Paradisea liliastrum (L.) Bertol., 1840

Etat de la connaissance

Bonne

Code:36	Pelouse écorchée acidophile subalpine à fétuque paniculée et avoine de Parlatore	
Rattachement phytosociologique au niveau association Helictotricho parlatorei - Festucetum paniculatae Barbero 1972		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Hyperico richeri - Festucion paniculatae De Foucault 2012
CORINE biotope	36.311	Nardaies mésophiles pyrénéo-alpines
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Moyen

Menaces
peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BARBERO, 1972
FOUCAULT (DE), 2012
LACOSTE, 1970
LACOSTE, 1975

Ecologie

Groupement xérothermophile colonisant les pentes fortes, raides et chaudes, sur substrat rocailleux siliceux,de l'horizon supérieur de l'étage subalpin, entre 1950 et 2300 m d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Pelouse de recouvrement assez faible, structurée par deux grandes graminées sociales : Festuca paniculata et Helictotrichon parlatorei.

Cortège floristique
Centaurea uniflora Turra, 1765
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell., 1913
Festuca scabriculmis (Hack.) K.Richt., 1890
Helictotrichon parlatorei (J.Woods) Pilg., 1938
Hieracium billyanum de Retz, 1974
Pedicularis gyroflexa Vill., 1785
Potentilla grandiflora L., 1753
Senecio doronicum (L.) L., 1759
Silene nutans L., 1753
Trifolium montanum subsp. rupestre (Ten.) Nyman, 1878

Dynamique de la végétation

Evolution progressive lente vers les landes d'adret du Juniperion sibiricae.

Variabilité et affinité de l'habitat

Association proche du Festuco-Potentilletum valderiae (Festucion variae).

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:58	Lande subalpine acidophile d'adret à genévrier nain, raisin d'ours	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Juniperion nanae Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Sissingh & Vlieger 1939
CORINE biotope	31.431	Fourrés à Juniperus communis subsp. nana
Natura 2000	4060	Landes alpines et boréales
Cahiers d'habitats	4060-6	Landes subalpines secondaires d'adret des Alpes et des Pyrénées à genévrier nain
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'une espèce en limite d'aire dans les Alpes sud-occidentales : Cytisus polytrichus. Présence d'une espèce protégée, Erica carnea (Tende, rare).

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
VAN ES, 2003

Ecologie

Adrets pentus et rocheux de l'étage subalpin, rapidement déneigés, sur substrat siliceux.

Cortège floristique
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Cotoneaster juranus Gand., 1875
Cytisus polytrichus M.Bieb., 1819
Juniperus communis subsp. nana (Hook.) Syme, 1868
Vaccinium myrtillus L., 1753

Physionomie de l'habitat

Lande dominée par les buissons prostrés de Juniperus communis subsp. nana, accompagné de Vaccinium myrtillus, Arctostaphylos uva-ursi, Cotoneaster juranus, Cytisus polytrichus,Calluna vulgaris.

Dynamique de la végétation

Evolue vers des mélézeins d'adret du Juniperion nanae.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:176	Pineraie de pin à crochets silicicole montagnarde d'adret à genévrier nain	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Juniperion nanae Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Sissingh & Vlieger 1939
CORINE biotope	42.421	Forêts de Pins de montagne des Alpes internes
Natura 2000	9430	Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)
Cahiers d'habitats	9430-7	Pineraies sèches subalpines de Pin à crochets à Cotonéaster des Alpes
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Présence de Luzula pedemontana, endémique Alpes sud-ouest-Apennins-Corse.

Menaces
Exploitation forestière

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Pente d'adret, de 1500 à 1900 m. d'altitude, sur substrat siliceux, sol peu profond.

Physionomie de l'habitat

Forêt de pin à crochet dominant, accompagné du mélèze et du pin sylvestre, avec un sous-bois chaméphytique dominé par la myrtille, avec Juniperus sibirica, Rhododendron ferrugineum (rare), Calluna vulgaris, Luzula pedemontana, Viola riviniana, Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina, Rubus saxatilis, Veronica officinalis, Phyteuma betonicifolium.

Cortège floristique
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836
Homogyne alpina (L.) Cass., 1821
Juniperus communis subsp. nana (Hook.) Syme, 1868
Larix decidua Mill., 1768
Luzula pedemontana Boiss. & Reut., 1852
Phyteuma betonicifolium Vill., 1785
Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, 1936
Pinus sylvestris L., 1753
Rhododendron ferrugineum L., 1753
Vaccinium myrtillus L., 1753

Variabilité et affinité de l'habitat

Habitat stable. Série du pin cembro et du mélèze, sous-série xérophile, variante sur silice.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:190	Forêt de mélèze subalpine acidophile d'adret à genévrier nain	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Juniperion nanae Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Sissingh & Vlieger 1939
CORINE biotope	42.316	Forêts de Mélèzes et d'Arolles avec Genévriers nains
Natura 2000	9420	Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
A préciser.

Menaces
Peu menacé.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Versants secs exposés au sud, sur substrat siliceux, rocailleux ou avec affleurements rocheux, au-dessus de 1900 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Forêt dominée par le mélèze (Larix decidua), avec Pinus cembra, Pinus uncinata dans la strate arborescente, qui est peu à moyennement recouvrante. Le sous-bois est constitué par une lande dominée par Juniperus communis subsp. nana, avec Vaccinium myrtillus, Cotoneaster juranus, Arctostaphylos uva-ursi.

Dynamique de la végétation

Forêt s'installant à partir de la lande à Juniperus communis subsp. nana (Juniperion nanae).

Cortège floristique
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825
Cotoneaster juranus Gand., 1875
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836
Juniperus communis subsp. nana (Hook.) Syme, 1868
Larix decidua Mill., 1768
Pinus cembra L., 1753
Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, 1936
Vaccinium myrtillus L., 1753

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:51	Garide supraméditerranéenne thermophile à stéhéline douteuse, aspérule pourpre, genêt cendré

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Staehelino dubiae - Galietum purpureae Guinochet 1962	Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae Barbero, Loisel & Quézel 1972

CORINE biotope	32.62	Garrigues à Genista cinerea
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen,Supraméditerranéen

Répartition
Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Groupement très riche floristiquement. Grand intérêt pour l'entomofaune (habitat d'espèce pour Gortynia borelii).

Menaces
Fermeture du milieu (évolution vers la forêt).

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
GUINOCHET, 1975
LAPRAZ, 1976
LAPRAZ, 1984

Ecologie

Se rencontre à toutes les expositions, sur calcaire dur et marno-calcaire, sur les versants pierreux et dénudés, entre 400 et 1000 m. d'altitude.

Cortège floristique
Aphyllanthes monspeliensis L., 1753
Asperula purpurea (L.) Ehrend., 1973
Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772
Euphorbia spinosa L., 1753
Genista cinerea (Vill.) DC., 1805
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Staehelina dubia L., 1753

Physionomie de l'habitat

Garide d'apect très variable, floristiquement riche. Sur calcaire dur, elle est le plus souvent dominée par Genista cinerea, Euphorbia spinosa, et Staehelina dubia. Sur marno-calcaire, Aphyllanthes monspeliensis et Dorycnium pentaphyllum prennent un développement plus important. Sur les versants nord, un faciès ourlifié à Sesleria argentea et ombellifères n'est pas rare.

Dynamique de la végétation

Il s'agit d'un stade de dégradation des chênaies pubescentes méditerranéennes, des ostryaies semi-sempervirentes à chêne vert et frêne à fleurs, et des ostryaies supraméditerranéennes de basse altitude.

Variabilité et affinité de l'habitat

Se distingue de l'Euphorbio-Genistetum et de l'Ononido-Carlinetum par la présence de plusieurs espèces méditerranéennes comme Staehelina dubia, Dorycnium pentaphyllum, Aphyllanthes monspeliensis. Egalement décrit sous le nom de Dorycnio pentaphylli - Aphyllanthetum monspeliensis par Lapraz (1976), avec deux sous associations.
Variante d'ubac avec Peucedanum officinale, Sesleria argentea.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:53	Garide supraméditerranéenne mésophile à genêt cendré, lavande à feuilles étroites	
Rattachement phytosociologique au niveau association Ononido cenisiae - Carlinetum acanthifoliae Guinochet 1975		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae Barbero, Loisel & Quézel 1972
CORINE biotope	32.62	Garrigues à Genista cinerea
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Verdon,Var,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Intérêt entomologique.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie
GUINOCHET, 1975

Ecologie

Pentes et plateaux sur marno-calcaire, calcaire dur, entre 700-800 m jusqu'à 1400 m, suivant l'exposition.

Cortège floristique
Carlina acanthifolia All., 1773
Genista cinerea (Vill.) DC., 1805
Inula montana L., 1753
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Leontodon crispus Vill., 1779
Ononis cristata Mill., 1768

Physionomie de l'habitat

Végétation habituellement structurée par des chaméphytes et des arbrisseaux (Genista cinerea, Lavandula angustifolia). Présente parfois un aspect de pelouse où les grands chaméphytes se font discrets.

Dynamique de la végétation

Stade de dégradation des ostryaies supraméditerranéennes, chênaies pubescentes, pinèdes sylvestres.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:54	Garide oroméditerranéenne à genêt cendré	
Rattachement phytosociologique au niveau association Senecio doronici - Thalictretum foetidi Lacoste 1967		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae Barbero, Loisel & Quézel 1972
CORINE biotope	32.62	Garrigues à Genista cinerea
Natura 2000	4090	Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Verdon,Var,Cians,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pentes pierreuses calcaires, à partir de 1400 m. d'alt. en adret, jusqu'à 1700 (1800) m.

Physionomie de l'habitat

Garide dominée par Genista cinerea, accompagné de Lavandula angustifolia, Juniperus communis sous une forme prostrée, Helictotrichon sempervirens, Thalictrum foetidum (rare).

Dynamique de la végétation

Souvent associé à la pelouse à Helictotrichon sempervirens.

Etat de la connaissance

Moyenne

Cortège floristique
Cotoneaster integerrimus Medik., 1793
Genista cinerea (Vill.) DC., 1805
Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilg., 1938
Juniperus communis L. subsp. communis
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Senecio doronicum (L.) L., 1759
Thalictrum foetidum L., 1753

Code:55	Garide supraméditerranéenne xérophile interne à euphorbe épineuse, genêt cendré

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Euphorbio spinosae - Genistetum cinereae (Lacoste 1967) Gaultier 1989	Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae Barbero, Loisel & Quézel 1972

CORINE biotope	32.62	Garrigues à Genista cinerea
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Var,Cians,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Habitat rare en France, limité aux Alpes-Maritimes.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LACOSTE, 1967

Ecologie

Groupement xérophile des pentes pierreuses et arides des vallées internes des Alpes-Maritimes, sur calcaire dur et pélites rouges, jusqu'à 1400-1500 m. d'alt.

Cortège floristique
Euphorbia spinosa L., 1753
Genista cinerea (Vill.) DC., 1805
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Satureja montana L., 1753
Thymus vulgaris L., 1753

Physionomie de l'habitat

Garide dominée par des chaméphytes en boule : Euphorbia spinosa, Artemisia alba, Thymus vulgaris, accompagnés de Genista cinerea, Lavandula angustifolia.

Dynamique de la végétation

Stade de dégradation des chênaies pubescentes à buis ou à charme-houblon, des pinèdes de pin sylvestre.

Variabilité et affinité de l'habitat

Se distingue de l'Asperulo-Staehelinetum par l'absence d'espèces transgressives des garrigues mésoméditerranéenennes : Staehelina dubia, Dorycnium pentaphyllum.
Variante sur pélites rouges, au recouvrement faible à moyen laissant apparaître la roche, avec Artemisia campestris.

Etat de la connaissance

Moyenne. Variante sur pélites rouges non décrite.

Code:98	Herbier des étangs alpins à rubanier à feuilles étroites

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Callitricho palustris - Sparganietum angustifolii Braun-Blanq. ex Oberd. 1957	Littorellion uniflorae Koch 1926

CORINE biotope	22.3114	Communautés flottantes de Sparganium
Natura 2000	3130	Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des...
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Intérêt patrimonial fort.Habitat très diversifié sur le plan algologique (diatomées).

Menaces
Risque toutefois de comblement et d'assèchement à long terme, rendant cet habitat plus accessible aux brebis et le soumettant à un risque d'eutrophisation.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
DE FOUCAULT, 2010
GUINOCHET, 1938
VAN ES, 2003

Ecologie

Lacs alpins entre 2300 et 2500 m. d'altitude, aux bords en pente douce, dont la profondeur n'excède pas 1 m à 1,5 m., sur substrat siliceux, dans des eaux oligotrophes neutres à faiblement acides. Exondaison estivale des lacs les moins profonds.

Cortège floristique
Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785
Sparganium angustifolium Michx., 1803
Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske

Physionomie de l'habitat

Végétation aquatique amphibie formant des ceintures en bordure des lacs profonds et couvrant toute la surface des étangs, ou flaques de petites dimensions, constituée par Sparganium angustifolium, dont les feuilles flottent à la surface des eaux libres, et s'étalent sur la vase lors de l'exondaison.

Dynamique de la végétation

Groupement permanent

Etat de la connaissance

Bonne

Code:99	Végétation eutrophe alpine de plans d'eau asséchés à cresson d'Islande	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Littorellion uniflorae Koch 1926
CORINE biotope	22.31	Communautés amphibies pérennes septentrionales
Natura 2000	3130	Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des...
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée

Intérêt patrimonial
Habitat rare dans le PNM et méconnu.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
VAN ES, 2003

Ecologie

Vase humide exondée de petites dépressions inondables et berges de lac alpin, sur substrat siliceux, au-dessus de 2000 m. d'altitude.

Cortège floristique
Fossombronia foveolata Lindb.
Gnaphalium uliginosum L., 1753
Poa supina Schrad., 1806
Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) BorbÃ¡s, 1900

Physionomie de l'habitat

Végétation herbacée rase pauvre en espèces dominée par Rorippa islandica.

Variabilité et affinité de l'habitat

Variante observée au Lac Lagarot (Saint-Etienne-de-Tinée), avec Gnaphalium uliginosum et l'hépatique Fossombronia foveolata.

Etat de la connaissance

Faible

Code:59	Landine alpine acidophile à airelle des marais	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Loiseleurio procumbentis - Vaccinion uliginosi subsp. microphylli...
CORINE biotope	31.44	Landes à Empetrum et Vaccinium
Natura 2000		
Cahiers d'habitats	4060-3	Landes acidiphiles basses à Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum et Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Présence de Loiseleuria procumbens, très rare, dans la Vésubie.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pentes peu prononcées, replats rocheux, crêtes, sur substrat siliceux, à partir de 2150 m. d'alt.

Cortège floristique
Achillea erba-rotta All., 1773
Juncus trifidus L., 1753
Loiseleuria procumbens (L.) Desv., 1813
Luzula lutea (All.) DC., 1805
Vaccinium uliginosum L., 1753

Physionomie de l'habitat

Lande basse fragmentée composée de buissons bas de Vaccinium uliginosum, accompagnée de nombreuses espèces transgressives du Caricion curvulae.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:18	Pelouse piétinée des chemins forestiers à prunelle vulgaire et plantain majeur

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Prunello vulgaris - Plantaginetum majoris Falinski 1963	Lolio perennis - Plantaginion majoris Sissingh 1969

CORINE biotope	87.2	Zones rudérales
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Faible

Menaces

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Groupement anthropogène, se développant en linéaire dans les chemins forestiers frais. Communauté adaptée au piétinement.

Cortège floristique
Plantago major L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753

Physionomie de l'habitat

Pelouse caractérisée par Prunella vulgaris et Plantago major.

Variabilité et affinité de l'habitat

Association répandue en Europe, peu variable.

Etat de la connaissance

Faible

Code:19	Pelouse piétinée montagnarde des chemins forestiers à plantain majeur et gnaphale des forêts

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A définir	Lolio perennis-Plantaginion majoris Sissingh 1969

CORINE biotope	87.2	Zones rudérales
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial

Menaces

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Végétation des chemins piétinés et pistes d'exploitation traversant les sapinières montagnardes.

Physionomie de l'habitat

Pelouse peu élevée à floraison estivale caractérisée par Gnaphalium sylvaticum, Trifolium aureum, Plantago major.

Cortège floristique

Agrostis capillaris L., 1753
Gnaphalium sylvaticum L., 1753
Plantago major L., 1753
Sagina glabra (Willd.) Fenzl, 1833
Sagina procumbens L., 1753
Trifolium aureum Pollich, 1777
Trifolium repens L., 1753
Tussilago farfara L., 1753
Veronica serpyllifolia L., 1753

Etat de la connaissance

Faible.

Code:48	Ptéridaie sur silice à fougère aigle et oeillet de Séguier

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Melampyro pratensis - Holcetalia mollis Passarge 1979

CORINE biotope	31.86	Landes à Fougères
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Présence de Holandrea schotii, orophyte sud-européenne, localisée pour les Alpes-Maritimes dans la vallée de la Roya.

Menaces
Faibles.

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Restanques abandonnées, talus ou bords de chemin, ou sur pentes d'adret sous taillis de noisetier, sur substrat schisteux ou grès d'Annot, vers 1300-1400 m. d'altitude, ambiance sciaphile et mésohygrophile.

Cortège floristique
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Clinopodium vulgare L., 1753
Dianthus seguieri Vill., 1779
Holcus mollis L., 1759
Melittis melissophyllum L., 1753
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
Trifolium alpestre L., 1763

Physionomie de l'habitat

Ourlets en nappe dominé par les grandes frondes de la fougère aigle.
Composition floristique : Pteridium aquilinum, Brachypodium rupestre, Dianthus seguieri, Trifolium alpestre, Clinopodium vulgare, Melittis melissophyllum, Phyteuma scorzonerifolium, Holandrea schotii, Origanum vulgare, Vicia cracca subsp. incana, Helleborus foetidus, Holcus mollis.

Dynamique de la végétation

Série interne du pin sylvestre, variante sur silice.

Variabilité et affinité de l'habitat

Habitat souvent associé à des taillis de noisetier et/ou tremble.

Etat de la connaissance

Peu connu. Rattachement à une association phytosociologique à préciser.

Code:6	Pelouse semi-sèche supraméditerranéenne à montagnarde à brome érigé sur sol profond	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons.
CORINE biotope	34.3265	Mesobromion des Alpes sud-occidentales
Natura 2000	6210	Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites...
Cahiers d'habitats	6210-16	Pelouses calcicoles mésophiles du Sud-Est
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial

Menaces
Surpâturage, amendements, embroussaillement du à l'abandon des pratiques agro-pastorales.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Sol profond, sur calcaire ou marne. Pente nulle ou faible.

Physionomie de l'habitat

Pelouse dominée par Bromus erectus, riche en hémicryptophytes. La majorité de ces pelouses est soit fauchée soit pâturée (ovins, exceptionnellement bovins).

Dynamique de la végétation

Evolution dynamique progressive vers ourlet des Trifolio medii-Geranietea sanguinei, puis installation des ligneux avant le boisement (chênaie pubescente, ostryaie, pinède)

Cortège floristique
Astragalus danicus Retz., 1783
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868
Briza media L., 1753
Bromus erectus Huds., 1762
Centaurea scabiosa L., 1753
Galium verum L., 1753
Gentiana cruciata L., 1753
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Phyteuma orbiculare L., 1753
Plantago media L., 1753
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777
Salvia pratensis L., 1753
Trifolium montanum L., 1753

Etat de la connaissance

Moyenne. Etudier la variabilité.

Code:7	Pelouse basophile supraméditerranéenne à brome érigé riche en orchidées	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons.
CORINE biotope	34.3265	Mesobromion des Alpes sud-occidentales
Natura 2000	6210	Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites...
Cahiers d'habitats	6210-16	Pelouses calcicoles mésophiles du Sud-Est
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Var,Roya

Intérêt patrimonial
Très fort. Présence à Saorge de très nombreuses espèces d'orchidées.

Menaces
Embroussaillement rapide des pelouses insuffisamment entretenues. Risque de surpâturage.

Enjeu de conservation
Très fort

Bibliographie

Ecologie

Restanques pâturées ou fauchées sur des versants d'adret, entre 500 et 800 m d'altitude, sur sol marno-calcaire.

Physionomie de l'habitat

Pelouse peu élevée dominée par Bromus erectus, riche en orchidées.

Dynamique de la végétation

En l'absence d'entretien, embroussaillement par des ligneux : Dorycnium pentaphyllum, Spartium junceum. Puis évolution vers la chênaie pubescente.

Cortège floristique

Briza media L., 1753
Bromus erectus Huds., 1762
Catananche caerulea L., 1753
Centaurea scabiosa L., 1753
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826
Linum viscosum L., 1762
Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Ophrys apifera Huds., 1762
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802
Ophrys lutea Cav., 1793
Ophrys scolopax Cav., 1793
Orchis anthropophora (L.) All., 1785
Plantago media L., 1753
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910

Variabilité et affinité de l'habitat

Groupement correspondant peut-être à l'Orchido-Brometum Br.-Bl. 1938.

Etat de la connaissance

Faible.

Code:8	Pelouse montagnarde à subalpine thermophile à brachypode rupestre	
Rattachement phytosociologique au niveau association Diantho pavonii - Brachypodietum pinnati (Lacoste 1975) Royer 1987		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons.
CORINE biotope	34.3265	Mesobromion des Alpes sud-occidentales
Natura 2000	6210	Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites...
Cahiers d'habitats	6210-16	Pelouses calcicoles mésophiles du Sud-Est
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Espèces végétales d'intérêt patrimoniales ou protégées : Gentiana lutea (DHV), Gagea pratensis, Aster amellus, Inula bifrons, Dianthus pavonius, Narcissus poeticus
Espèces animales d'intérêt patrimonial : Zygaena nevadensis, Zygaena brizae vesubiana, Polyommatus amandus, Leptidea duponcheli.

Menaces
Certaines de ces pelouses sont entretenues par le pâturage de troupeaux ovins. Certains secteurs peuvent localement subir de trop fortes pressions de pâturage ou inversement être délaissés par les troupeaux, induisant un appauvrissement floristique de ces milieux.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LACOSTE, 1975

Ecologie

Habitat répandu de 1600 à 2100 m d'altitude, en adret ou aux expositions intermédiaires, sur des pentes moyennes à fortes, rapidement déneigées, sur calcaire précocément.

Cortège floristique
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Galium verum L., 1753
Gentiana lutea L., 1753
Rhinanthus pumilus (Sterneck) Soldano, 1986
Senecio doronicum (L.) L., 1759
Trifolium montanum L., 1753

Physionomie de l'habitat

Pelouse dominée par Brachypodium rupestre, accompagnée de prairiales, et de quelques espèces thermophiles transgressives des pelouses écorchées à avoines vivaces, ou d'espèces transgressives des pelouses subalpines à seslérie bleue ou à Nardus stricta.

Variabilité et affinité de l'habitat

Variante observée à l'Authion avec Sesleria argentea.

Etat de la connaissance

Moyenne. Variabilité à étudier sur la partie est du PNM.

Code:241	Pelouse basophile montagnarde à brome érigé et sainfoin des montagnes	
Rattachement phytosociologique au niveau association Brometo erecti - Onobrychidetum montanae Delpech 1994		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons.
CORINE biotope	34.3265	Mesobromion des Alpes sud-occidentales
Natura 2000	6210	Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites...
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye

Intérêt patrimonial
Richesse floristique de ces pelouses rassemblant de nombreuses espèces (en moyenne une quarantaine d'espèces)

Menaces

Enjeu de conservation

Bibliographie
DELPECH, 1994

Ecologie

Pentes de 3 à 80 °, exposées au sud (est ou ouest), de 1500 à 1930 m. d'altitude, sur sol calcaire peu profond.

Physionomie de l'habitat

Pelouses dominées par le Bromus erectus et Onobrychis viciifolia subsp. montana, possédant un fort contingent d'espèces des Festuco-Brometea mais également de nombreuses espèces des Seslerietalia coerulea, traduisant l'affinité orophile de ces pelouses.

Cortège floristique
Arabis ciliata Clairv., 1811
Asperula cynanchica L., 1753
Bromus erectus Huds., 1762
Bupleurum ranunculoides L., 1753
Centaurea scabiosa L., 1753
Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz & Thell., 1909
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812
Onobrychis viciifolia subsp. montana (DC.) Gams, 1924
Prunella grandiflora (L.) SchÃ¶ller, 1775
Salvia pratensis L., 1753

Etat de la connaissance

à préciser

Code:269	Pelouse mésoxérophile continentale à brome érigé et fétuque du Valais	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons.
CORINE biotope	34.3265	Mesobromion des Alpes sud-occidentales
Natura 2000	6210	Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites...
Cahiers d'habitats	6210-16	Pelouses calcicoles mésophiles du Sud-Est
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Verdon,Ubaye,Var

Intérêt patrimonial

Menaces

Enjeu de conservation

Bibliographie
ROYER, 2000

Ecologie

Pentes faibles exposées au sud, sur substrat calcaire, sous climat de montagne à continentalité marquée sous influence méditerranéenne. Etage supraméditerranéen jusqu'à 1500 m. d'altitude. Sol peu profond.

Cortège floristique
Bromus erectus Huds., 1762
Catananche caerulea L., 1753
Cirsium acaule Scop., 1769
Dianthus carthusianorum L., 1753
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin, 1811
Potentilla neumanniana Rchb., 1832
Prunella laciniata (L.) L., 1763
Seseli annuum subsp. carvifolium (Vill.) P.Fourn., 1937

Physionomie de l'habitat

Pelouse dominée par Bromus erectus, accompagné de Festuca vallesiaca, Seseli annuum subsp. carvifolium, Centaurea scabiosa, Potentilla neumaniana, Prunella laciniata, Dianthus carthusianorum. Présence d'espèces des garides et pelouses et garides supraméditerrannéennes comme Satureja montana, Linum suffruticosum subsp. appressum, Stipa eriocaulis, Serratula nudicaulis, Inula montana.

Dynamique de la végétation

Evolution vers un ourlet du Geranion sanguinei, puis des fruticées, et à terme vers la chênaie pubescente à buis ou son faciès de substitution à pin sylvestre.

Variabilité et affinité de l'habitat

Variante plus sèche avec Silene otites, Carex humilis, Inula montana, Stipa eriocaulis

Code:92	Prairie humide méditerranéenne à molinie bleue, scirpe à tête ronde	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Molinio arundinaceae - Holoschoenion vulgaris Braun-Blanq. ex Tchou 1948
CORINE biotope	37.4	Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes
Natura 2000	6420	Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Bevera

Intérêt patrimonial
Fort. Habitat rare dans le PNM.

Menaces
Assèchement des zones humides

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Mouillères de pente, zones humides près de sources, berges de ruisseaux ou de canaux sur un sol riches en carbonates, perméable ou non, et dont le niveau de la nappe phréatique est assez élevé. Humidité temporaire importante, avec dessèchement estival modéré. Etage supraméditerranéen, généralement en-dessous de 1200 m. d'altitude. Sur calcaire ou marne.

Cortège floristique
Carex flacca Schreb., 1771
Cirsium monspessulanum (L.) Hill, 1768
Juncus inflexus L., 1753
Mentha aquatica L., 1753
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Schoenus nigricans L., 1753
Scirpoides holoschoenus (L.) SojÃ¡k, 1972

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée haute, constituée par des grandes graminées, joncacées et cypéracées. Les espèces dominantes sont généralement Molinia caerulea, Scirpoides holoschoenus, Cirsium monspessulanum.

Dynamique de la végétation

Colonise les monticules de tuf en voie d'assèchement dont la prairie à molinie et choin constitue souvent un stade avancé.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:91	Prairie humide montagnarde pauvre en nutriments à molinie bleue et dactylorhize de mai

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A définir	Molinion caeruleae subsp. caeruleae Koch 1926 em. Braun-Blanquet 1947

CORINE biotope	37.311	Prairies à Molinie sur calcaires
Natura 2000	6410	Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Cians

Intérêt patrimonial
Présence d'espèces protégées : Ophioglossum vulgatum, Anacamptis coriophora subsp. coriophora.

Menaces
Assèchement des zones humides, surpâturage et eutrophisation du milieu par les troupeaux ovins.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Mouillères de pentes, talwegs humides, en exposition sud ou ouest, sur pélites rouges, entre 1400 et 1600 m. d'altitude. Sol profond et humide alimenté par des eaux carbonatés provenant des couches géologiques supérieures (calcaires du Trias).

Cortège floristique
Carex panicea L., 1753
Carex paniculata L., 1755
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794
Ophioglossum vulgatum L., 1753
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth, 1788
Trollius europaeus L., 1753

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée prairiale au fort recouvrement dominée par Molinia caerulea, accompagné de plusieurs espèces de cypéracées : Carex panicea, Carex paniculata, Carex tomentosa, ainsi que par Lotus maritimus. De nombreuses orchidées sont souvent présentes : Dactylorhiza majalis, Gymnadenia conopsea, Anacamptis coriophora subsp. coriophora, Herminium monorchis. Ces prairies humides d'un vert clair se reconnaissent de loin car tranchent nettement avec la végétation xérophile ou les affleurement rocheux de pélites situés à proximité.

Dynamique de la végétation

Evolution possible des fruticées basses à Rubus idaeus et Rubus sp. puis vers des formations arbustives plus fermées à Corylus avellana, ensuite vers des bosquets forestiers à Fraxinus excelsior, Salix capraea. Toutefois, les conditions écologiques présidant à l'édification de ces formations (humidité constante, pentes parcourues par des cours d'eau permanents) confèrent à ces prairies une stabilité de leur composition floristique.

Variabilité et affinité de l'habitat

Confusion avec les bas-marais alcalins du Caricetum davallianae, dominés par des petites cypéracées.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:34	Pelouse acidophile subalpine des pentes à laîche toujours verte, pâturin violacé	
Rattachement phytosociologique au niveau association Phyteumo michelii - Poetum violaceae Barbero 1972		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Nardion strictae Braun-Blanq. 1926
CORINE biotope	36.33	Pelouses siliceuses thermophiles subalpines
Natura 2000	6230	Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones...
Cahiers d'habitats	6230-13	Pelouses acidiphiles orophiles des Alpes méridionales
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	

Etages de végétation
Subalpin
Répartition
Cians,Roya
Intérêt patrimonial
Moyen
Menaces
Peu menacé
Enjeu de conservation
Moyen
Bibliographie
BARBERO, 1972

Ecologie

Pentes mésoxérophiles et croupes ventées, sur substrat calcaire ou siliceux, à toutes les expositions. Optimum altitudinal entre 1800 et 2200 m.

Cortège floristique

Bellardiochloa variegata (Lam.) KerguÃ©len, 1983
Carex sempervirens Vill., 1787
Meum athamanticum Jacq., 1776
Phyteuma michelii All., 1785
Tephroseris integrifolia subsp. capitata (Wahlenb.) B.Nord., 1978
Trifolium alpinum L., 1753

Physionomie de l'habitat

Pelouse au recouvrement élevé, dominée par Bellardiochloa vioacea ou Carex sempervirens.

Etat de la connaissance

Moyenne. Association méconnue.

Code:37	Pelouse acidophile subalpine à nard raide des pentes douces et replats	
Rattachement phytosociologique au niveau association Nigritello cornelianae - Nardetum strictae Barbero 1970 (=Nardetum alpigenum Br.-Bl. 1948 nom. inval. art. 1, Nardetum strictae Braun-Blanq. 1926)		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Nardion strictae Br.-Bl. 1949 nom. inval. art. 3b, Nardion strictae Braun-Blanq. 1926 Lacoste 1975
CORINE biotope	36.31	Gazons à Nard raide et groupements apparentés
Natura 2000	6230	Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones...
Cahiers d'habitats	6230-13	Pelouses acidiphiles orophiles des Alpes méridionales
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Présence de plusieurs espèces endémiques des Alpes sud-occidentales : Veronica allionii, Dianthus pavonius, Nigritella corneliana.

Menaces
Abandon du pâturage, ou au contraire surpâturage ovin.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BARBERO, 1972
LACOSTE, 1975

Ecologie

Plateaux, dépressions, combes et pentes douces d'ubac sur substrat calcaire ou siliceux, à l'étage subalpin, de 1700 à près de 2200 m. d'alt.

Physionomie de l'habitat

Pelouse structurée par Nardus stricta, formant parfois des tapis denses semblables à d'épaisses fourrures. Lorque son abondance est moindre, l'association est floristiquement divsersifiée avec une abondance des papilionacées : Trifolium alpinum, trifolium montanum, Lotus corniculatus et des espèces fourragères Phleum alpinum, Meum athamanticum.

Dynamique de la végétation

Après l'abandon du pâturage sur ces pelouses, celles-ci évoluent vers des prés-bois de mélèze ou sont colonisées par les landes à rhododendron. Les nardaies peuvent évoluer vers des prairies du Triseto-polygonion par fertilisation.

Cortège floristique
Arnica montana L., 1753
Carex sempervirens Vill., 1787
Dianthus pavonius Tausch, 1839
Geum montanum L., 1753
Leontodon pyrenaicus subsp. helveticus (MÃ©rat) Finch & P.D.Sell, 1975
Nardus stricta L., 1753
Nigritella corneliana (Beauverd) GÃ¶lz & Reinhard, 1986
Phyteuma michelii All., 1785
Trifolium alpinum L., 1753
Viola calcarata L., 1753

Etat de la connaissance

Bonne

Code:38	Pelouse acidophile subalpine à alpine des combes et dépressions à nard raide et vulpin des Alpes	
Rattachement phytosociologique au niveau association Ranunculo pyrenaei - Alopecuretum gerardii (Lippmaa 1933) Guinochet 1938		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Nardion strictae Braun-Blanq. 1926
CORINE biotope	36.31	Gazons à Nard raide et groupements apparentés
Natura 2000	6230	Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones...
Cahiers d'habitats	6230-13	Pelouses acidiphiles orophiles des Alpes méridionales
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Moyen

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
GUINOCHET, 1938
VAN ES, 2003

Ecologie

Combes et dépressions, pentes faibles, où la neige stagne longtemps, sur calcaire ou silice, entre 2000 et 2700 m. d'altitude.

Cortège floristique
Alopecurus alpinus Vill., 1786
Nardus stricta L., 1753
Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet, 1987

Physionomie de l'habitat

Les nardaies se distinguent aisément lors de la fonte des neiges par la couleur bleutée caractéristique du feuillage de Alopecurus gerardi et les fleurs blanches de Ranunculus kuepferi.

Dynamique de la végétation

Association permanente à l'étage alpin.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:100	Fourré thermophile à pistachier lentisque	
Rattachement phytosociologique au niveau association Calicotomo spinosae - Myrtetum communis Guinochet et Drouineau 1944		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Oleo sylvestris - Ceratonion siliquae Braun-Blanq. ex Guin. & Drouineau 1944
CORINE biotope	32.214	Fruticée à Lentisques
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Mésoméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Association répandue dans les Alpes-Maritimes mais rare et marginale dans le PNM. Présence de deux espèces protégées : Ceratonia siliqua et Coronilla valentina subsp. valentina.

Menaces
Incendies

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Stations thermophiles et xérophiles, sur calcaire, non loin de la mer.

Physionomie de l'habitat

Fourré sclérophylle sempervirent dense dominé par Rhamnus alaternus et Pistacia lentiscus, accompagnés de lianes : Smilax aspera, Rubia peregrina, Lonicera implexa.

Dynamique de la végétation

Manteau arbustif et stade de dégradation ou de reconquête des pinèdes de pin d'Alep et des yeuseraies mésoméditerranéennes.

Cortège floristique
Calicotome spinosa (L.) Link, 1822
Ceratonia siliqua L., 1753
Coronilla valentina L. subsp. valentina
Myrtus communis L., 1753
Phillyrea latifolia L., 1753
Pistacia lentiscus L., 1753
Rhamnus alaternus L., 1753
Smilax aspera L., 1753

Etat de la connaissance

Bonne

Code:10	Pelouse sèche sur alluvions à armoise champêtre

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A définir	Ononidetalia striatae Braun-Blanq. 1950

CORINE biotope		
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Var

Intérêt patrimonial
Présence d'une espèce protégée : Cleistogenes serotina. Groupement à rechercher dans les limites du PNM.

Menaces
Peu menacé.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Terrasse alluviale dans le lit des fleuves torrentiels, sur alluvions sableuses xérophiles, parsemées de galets, à l'étage supraméditerranéen.

Cortège floristique
Artemisia campestris L., 1753
Astragalus monspessulanus L., 1753
Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934
Euphorbia spinosa L., 1753
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847
Potentilla neumanniana Rchb., 1832
Satureja montana L., 1753
Thymus vulgaris L., 1753

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée basse de pelouse assez ouverte riche en chaméphytes, dominée par Artemisia campestris, avec Satureja montana, Thymus vulgaris, Euphorbia spinosa, Cleistogenes serotina. Présence d'annuelles dans les trouées : Cerastium pumilum, Hornungia petraea, Arenaria serpyllifolia.
Strate lichénique également présente dans les tonsures avec Psora decipiens, Fulgensia fulgens, Toninia sedifolia, Collema tenax (Toninio-Psoretum decipientis Stodiek 1937).

Dynamique de la végétation

Evolution vers une saulaie à Salix elaeagnos de niveau topographique élevé, riche en espèces de fruticées (Juniperus communis, Buxus sempervirens, Ligustrum vulgare). Pelouse susceptible d'être rajeunie lors des épisodes violents de crue.

Variabilité et affinité de l'habitat

Composition floristique proche de l'Euphorbio spinosae - Genistetum cinereae, dont ce groupement n'est peut-être qu'une variante.

Etat de la connaissance

Faible.

Code:11	Pelouse marnicole rase à globulaire à feuilles en coeur

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Ononidion cenisiae Barbero 1972

CORINE biotope		
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Ubaye,Var

Intérêt patrimonial
Groupement rare

Menaces
peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Croupe marno-calcaire xérophile en crête, sur sol superficiel.

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée rase de pelouse dominée par Globularia cordifolia, avec Potentilla neumaniana, Carex humilis, Teucrium montanum, Inula montana, Polygala calcarea, Fumana procumbens.

Cortège floristique

Carex humilis Leyss., 1758
Coronilla minima L. subsp. minima
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847
Globularia cordifolia L., 1753
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768
Helianthemum oelandicum subsp. italicum (L.) Ces., 1844
Inula montana L., 1753
Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837
Potentilla neumanniana Rchb., 1832
Teucrium montanum L., 1753

Dynamique de la végétation

Evolution vers une pinède sylvestre.

Variabilité et affinité de l'habitat

Faciès plus herbeux sur sol plus profond avec Brachypodium rupestre, Bromus erectus.

Etat de la connaissance

Faible. A étudier.

Code:30	Pelouse basophile oroméditerranéenne à avoine toujours verte ou avoine de Parlatore	
Rattachement phytosociologique au niveau association Centaureo triumfetti - Helictotrichetum sempervirentis Barbero 1968; Arenario cinereae - Helictotrichetum sempervirentis Barbero 1972		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Oreoselino - Helictotrichion sempervirentis Barbero 1968
CORINE biotope	36.432	Pelouses à Avoine et Seslérie des Alpes méridionales
Natura 2000	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
Cahiers d'habitats	6170-12	Pelouses calcicoles orophiles sèches et thermophiles des Alpes maritimes et ligures
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Présences d'espèces endémiques des Alpes sud-occidentales : Helictotrichon sempervirens, Dianthus furcatus.

Menaces
Menacé par la pratique de l'écobuage, qui induit un appauvrissement floristique.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO, 1972
VAN ES, 2003

Ecologie

Eboulis calcaires en voie de fixation, pentes rocailleuses d'adret. Sol pierreux, très sec en été, pauvre en argile et en humus mais riches en éléments de taille moyenne et petite. Sur calcaire ou flysch.

Cortège floristique
Bupleurum ranunculoides L., 1753
Cyanus triumfettii (All.) DostÃ¡l ex Ã•.LÃ¶ve & D.LÃ¶ve, 1961
Dianthus furcatus Balb., 1804
Galium obliquum Vill., 1785
Helianthemum oelandicum subsp. italicum (L.) Ces., 1844
Helictotrichon parlatorei (J.Woods) Pilg., 1938
Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilg., 1938
Knautia mollis Jord., 1848
Ononis striata Gouan, 1773
Scutellaria alpina L., 1753
Teucrium montanum L., 1753

Physionomie de l'habitat

Pelouse au recouvrement moyen, présentant un aspect écorché, dominé par les avoines vivaces Helictotrichon parlatorei, ou Helictotrichon sempervirens.

Variabilité et affinité de l'habitat

Dans les montagnes de Tende, le Centaureo triumfetti - Helictotrichetum sempervirentis se rencontre sous une variante à Helictotrichon parlatorei seul. Elle peut être confondue alors facilement avec le Hieracio villosi- Avenetum montanae, qui présente aussi un faciès à Helictotrichon parlatorei. Cette dernière association est dépourvu des éléments méditerranéens les plus thermophiles, et possède de nombreuses espèces du Seslerion caeruleae.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:31	Pelouse écorchée oroméditerranéenne à astragale toujours verte et onosma fastigié	
Rattachement phytosociologique au niveau association Astragalo sempervirentis - Onosmetum fastigiatae (Chaix 1954) Lacoste 1964		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Ononidion cenisiae Barbero 1972
CORINE biotope	31.7E	Landes épineuses à Astragalus sempervirens
Natura 2000	4090	Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux
Cahiers d'habitats	4090-5	Landes et pelouses épineuses méditerranéo-montagnardes des Alpes méridionales
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Var,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'une espèce protégée : Eryngium spina-alba.

Menaces
Les pelouses à Astragalus sempervirens peuvent être menacées par le surpâturage lorsqu'une charge trop importante en bétail ou une montée trop précoce des troupeaux ovins sur ces pelouses entraîne piétinement et/ou disparition d'espèces végétales. A l'inverse, un arrêt du pâturage entraînerait l'évolution naturelle de ces pelouses vers des garides puis des pinèdes sylvestres.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LACOSTE, 1975

Ecologie

Adrets chauds et secs, affleurements de calcaire ou de flysch, de 1800 à 2330 m. d'alt.

Physionomie de l'habitat

Pelouse rase dite écorchée en raison du faible recouvrement des espèces, laissant apparaître un sol rocailleux et érodé. Astragalus sempervirens est un xérophyte épineux en coussinet facilement reconnaissable dont les touffes plus ou moins fréquentes marquent la physionomie de cette pelouse. Il est accompagné de nombreux petits chaméphytes.

Cortège floristique
Anthyllis montana L., 1753
Astragalus sempervirens Lam., 1783
Dianthus subacaulis Vill., 1789
Eryngium spinalba Vill., 1779
Helianthemum oelandicum subsp. italicum (L.) Ces., 1844
Ononis cristata Mill., 1768
Ononis striata Gouan, 1773
Onosma fastigiata (Braun-Blanq.) Braun-Blanq. ex Lacaita, 1924

Dynamique de la végétation

En-dessous de 1800 m, la pelouse peut évoluer rapidement vers une garide à Genista cinerea, puis vers une pinède de pin sylvestre claire à Ononis cristata.

Variabilité et affinité de l'habitat

Onosma fastigiata est absent des massifs situés les plus au sud, et de la Roya.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:169	Pré-bois de pin sylvestre calcicole montagnard d'adret post-incendie à avoine de Parlatore

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Centaureo triumfetti - Helictotrichetum sempervirentis Barbero 1968	Ononidion cenisiae Barbero 1972

CORINE biotope	42.58 x 36.432	
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Faible

Menaces
Habitat favorisé par les incendies et l'écobuage.

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Pentes calcaires rocailleuses d'adret de l'étage montagnard.

Cortège floristique
Helictotrichon parlatorei (J.Woods) Pilg., 1938
Pinus sylvestris L., 1753

Physionomie de l'habitat

Boisement clair de pin sylvestre superposé à une pelouse dense post-incendie à Helictotrichon parlatorei. Cette graminée sociale semble favorisée par le passage du feu, et les tapis denses qu'elle constitue laissent peu de place aux autres espèces pour se développer.

Dynamique de la végétation

Habitat d'origine anthropique non stable.

Variabilité et affinité de l'habitat

La strate herbacée de cette pinède constitue une variante appauvrie de la pelouse du Centaureo triumfetti - Helictotrichetum sempervirentis.

Etat de la connaissance

Faible

Code:168	Pineraie de pin sylvestre xérophile sur terrasse alluviale à astragale esparcette	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Ononido rotundifolii - Pinion sylvestris Braun-Blanq. & R.Rich. 1950
CORINE biotope	42.53	Forêts steppiques intra-alpines à Ononis
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Var

Intérêt patrimonial
Grand intérêt de cet habitat rare et lié à la dynamique naturelle du fleuve Var.

Menaces
Aménagements dans le lit majeur du fleuve.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
OFFERHAUS B., 2009

Ecologie

Habitat xérophile colonisant des terrasses alluviales sèches. Sol superficiel, rocailleux, avec de nombreux galets de grandes dimensions.

Cortège floristique
Astragalus monspessulanus L., 1753
Astragalus onobrychis L., 1753
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Juniperus communis L., 1753
Ononis natrix L., 1753
Pinus sylvestris L., 1753
Salix eleagnos Scop., 1772

Physionomie de l'habitat

Forêt basse dominée par le pin sylvestre. Strate arbustive composée de Juniperus communis, Cytisophyllum sessilifolium, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb, Amelanchier ovalis, Ligustrum vulgare, Cotinus coggygria, Salix eleagnos. Sous bois herbacé caractérisé par l'abondance de Astragalus onobrychis, avec Astragalus monspessulanus, Ononis natrix, Genista pilosa, Artemisia campestris., Carex halleriana.

Dynamique de la végétation

Habitat stable

Etat de la connaissance

Faible

Code:32	Pelouse alpine calcicole basophile des crêtes à kobrésia queue de souris	
Rattachement phytosociologique au niveau association Elynetum myosuroidis Braun-Blanquet 1913		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Oxytropido - Elynion myosuroidis Br.-Bl. 1949
CORINE biotope	36.421	Pelouses alpines à Elyna
Natura 2000	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
Cahiers d'habitats	6170-6	Pelouses arcto-alpines des crêtes ventées, neutro-basophiles et cryophiles, des Alpes et des Pyrénées
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Roya

Intérêt patrimonial
Association peu répandue et pouvant abriter une espèce protégée : Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BARBERO, 1972
VAN ES, 2003

Ecologie

Croupes et crêtes exposées au vent, souvent libres de neiges en hiver, sur substrat calcaire, à l'étage alpin, au-dessus de 2100 m. d'altitude. Sol humique carbonaté, acidifié dans l'horizon supérieur.

Physionomie de l'habitat

Pelouse rase à aspect de gazon dressé en brosse dominée par Carex myosuroides (=Kobresia myosuroides).

Cortège floristique
Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh., 1825
Astragalus alpinus L., 1753
Carex atrata var. atrata
Carex capillaris L., 1753
Carex curvula subsp. rosae Gilomen, 1937
Carex curvula subsp. rosae Gilomen, 1937
Carex myosuroides Vill., 1779
Carex parviflora Host, 1801
Dryas octopetala L., 1753
Festuca quadriflora Honck., 1782
Minuartia sedoides (L.) Hiern, 1899
Oxytropis campestris (L.) DC., 1802
Phyteuma globulariifolium subsp. pedemontanum (R.Schulz) Bech., 1956
Sedum atratum L., 1763

Variabilité et affinité de l'habitat

Confusion possible avec la pelouse à Carex myosuroides et Carex curvula subsp. rosae du Caricion curvulae, qui s'en distingue par une faible présence des espèces basophiles, et par la présence d'espèces acidophiles du Caricion curvulae.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:245	Pelouse basophile alpine des crêtes à laîche des rochers	
Rattachement phytosociologique au niveau association Caricetum rupestris E. & S. Pignatti 1985		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Oxytropido-Elynion myosuroidis Braun-Blanq. 1949
CORINE biotope	36.433	Tapis de laîches en coussinets
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye

Intérêt patrimonial
Habitat composé d'espèces oligotrophes, cortège d'espèces particulièrement vulnérable, en régression dans le contexte actuel d'eutrophisation généralisée des milieux par les activités humaines.

Menaces
Habitat fragile, se développant dans un contexte micro-climatique très rude le rendant peu résiliant en cas de destruction ou altération. Semble peu menacé à l'échelle du PN mais pouvant l'être localement par l'utilisation de crête comme lieux de chôme par les troupeaux.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BENSETTITTI F., et al. (2002)
PIGNATTI E. , PIGNATTI, S. (1985)
VILLARET J.-C. (2006)

Ecologie

Association pionnière liée aux dalles et affleurements rocheux carbonatés (calcaires, brèches calcaires, cargneules), horizontaux à subhorizontaux, établies le plus souvent aux abords de cols, dans des conditions d'enneigement plus longues que celles des pelouses à Elyna myosuroides, à l'étage alpin et nival (au-dessus de 2 400 m). Végétation s'enracinant dans les lithosols accumulés au fond de fissures et anfractuosités rocheuses.

Cortège floristique
Carex parviflora Host, 1801
Carex rupestris All., 1785
Draba aizoides L., 1767
Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori, 1896
Sedum atratum L., 1763

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée rase (5 à 10 (20) cm), très ouverte (5 et 25 % de recouvrement), dominée par les rosettes serrées de Carex rupestris, occupant les fissures et anfractuosités, et Kobresia myosuroides, occupant les plages terreuses (riches en humus) plus étendues.

Dynamique de la végétation

Pelouse se développant dans un contexte microclimatique très contraignant ne montrant aucun signe d'évolution dynamique.

Etat de la connaissance

Faible.

Code:266 **Végétation des vieux murs en pierres secs et ensoleillés à orpin blanc et orpin à pétales dressés**

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Sedetum anopetalo-albi Focquet 1986	Parietario judaicae-Galion muralis Rivas Mart. ex Rivas Goday 1964

CORINE biotope		
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Vésubie

Intérêt patrimonial

Menaces

Enjeu de conservation

Bibliographie
FOCQUET, 1986

Ecologie

Vieux murs en pierres calcaires ou siliceuses, secs et exposés au soleil.

Physionomie de l'habitat

Groupement herbacé caractérisé par Sedum album et Sedum anopetalum, avec Asplenium ruta-muraria, Parietaria judaica, Asplenium trichomanes, Sedum dasyphyllum, Asplenium ceterach.

Cortège floristique
Asplenium ceterach L., 1753
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Asplenium trichomanes L., 1753
Parietaria judaica L., 1756
Sedum album L., 1753
Sedum anopetalum DC., 1808
Sedum dasyphyllum L., 1753

Code:76	Mégaphorbiaie montagnarde riveraine à pétasite hybride	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Petasition officinalis Sillinger 1933
CORINE biotope	37.714	Communautés riveraines à Pétasites
Natura 2000	6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Cahiers d'habitats	6430-3	Mégaphorbiaies à Pétasite hybride
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
A préciser.

Menaces
Modification du régime hydrologique des cours d'eau. Dégradation par stationnement prolongé des troupeaux bovins.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Bordure de ruisseaux et torrents alpins, en situation héliophile.

Cortège floristique
Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

Physionomie de l'habitat

Groupement facilement reconnaissable par les grandes feuilles de Petasites hybridus, formant des colonies denses quasi monospécifiques.

Etat de la connaissance

Faible. Rattachement phytosociologique à étudier.

Code:227	Eboulis et roubine calcaires montagnards à subalpins à éléments fins à fétuque dimorphe

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Petasitetum paradoxi (Br. Bl.) Beger 1922 athamantetosum Jenny-Lips 1930	Petasition paradoxi Zollitsch ex W.Lippert 1966

CORINE biotope	61.23	Eboulis calcaires fins
Natura 2000	8120	Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)
Cahiers d'habitats	8120-4	Éboulis calcaires montagnards à subalpins à éléments fins des Alpes et du Jura
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Var,Tinée

Intérêt patrimonial
Présence d'espèces protégées : Aquilegia bertolonii, Hedysarum boutignyanum.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Roubines (affleurements de marnes ravinées), de 800 à 2000 m d'altitude, sur des pentes relativement fortes, exposées nord à ouest. Eléments fins de nature marneuse à marno-calcaire, de couleur souvent sombre et pouvant se développer sur plusieurs centaines de mètres. Substrat meuble et friable à capacité de rétention en eau assez élevée et souvent parcourus par des écoulements temporaires.

Cortège floristique
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh., 1825
Athamanta cretensis L., 1753
Campanula alpestris All., 1773
Festuca dimorpha Guss., 1826
Saxifraga aizoides L., 1753
Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip., 1861
Valeriana montana L., 1753

Physionomie de l'habitat

Végétation des roubines au degré de recouvrement moyen voisin de 20 %, caractérisée par Festuca dimorpha, Valeriana montana, Adenostyles alpina, Athamanta cretensis.

Dynamique de la végétation

Au subalpin supérieur, les pentes moins soumises à érosion voient se développer des espèces compagnes telles Helictotrichon sedenense dont l'abondance préfigure parfois l'installation de pelouses du Seslerion caerulea pouvant évoluer vers des mélézeins clairs.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:73	Friche thermophile de pied de falaise calcaire mésoméditerranéenne	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Phlomido lychnitidis-Brachypodion retusi G.Mateo 1983
CORINE biotope	34.51	Pelouses xériques de la Méditerranée occidentale
Natura 2000	6220	Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Présence d'une espèce protégée : Lavatera maritima.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Corniche et pied de falaise calcaire à basse altitude, en exposition sud. Ambiance thermophile.

Cortège floristique
Asphodelus macrocarpus Parl., 1857
Iris lutescens Lam., 1789
Malva wigandii (Alef.) M.F.Ray, 1998
Ruta angustifolia Pers., 1805
Sedum album L., 1753

Physionomie de l'habitat

Pelouse légèrement nitrophile dominée par Iris lutescens et Asphodelus macrocarpus, avec Sedum album, Ruta angustifolia, Malva wigandii (=Lavatera maritima).

Dynamique de la végétation

Groupement stable.

Etat de la connaissance

Faible. A étudier.

Code:181	Pessière-sapinière montagnarde acidophile

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Phyteumo-Abietetum (Barbero et Bono 1970) Barbero et Quézel 1975	Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928

CORINE biotope	42.131	Sapinières acidiphiles intra-alpines
Natura 2000	9410	Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)
Cahiers d'habitats	9410-10	Sapinières à Épicéa à Véronique à feuilles d'Ortie des Alpes internes
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Cians,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Habitat d'espèces pour plusieurs oiseaux de l'annexe I de la Directive Oiseaux (pic noir, chouette de Tengmalm).
Habitat d'espèce pour Buxbaumia viridis et Orthotrichum rogeri, mousses de l'annexe II de la Directive Habitats.
Présence d'espèces végétales protéges : Epipogon aphyllum (protection nationale), Listera cordata (protection régionale)

Menaces
Exploitation forestière. Les forêts présentant des arbres âgés sont rares.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO & BONO, 1970
BARBERO et QUEZEL, 1975
BRESSET, 1975

Ecologie

Pentes d'ubac ou d'expositions intermédiaires, bas de versants, de 900 à 1800 m. d'altitude, sur substrat siliceux (grès, quartzite, pélite, flysch), sol profond, ambiance sciaphile, mésophile à mésohygrophile.

Cortège floristique
Abies alba Mill., 1768
Festuca flavescens Bellardi, 1792
Luzula nivea (L.) DC., 1805
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Prenanthes purpurea L., 1753
Saxifraga cuneifolia L., 1759
Vaccinium myrtillus L., 1753
Veronica urticifolia Jacq., 1773

Physionomie de l'habitat

Forêt mélangée pouvant présenter des faciès à épicéa ou à sapin. La strate arbustive assez clairsemée est riche en arbustes montagnards : Laburnum alpinum, Lonicera nigra, Rosa pendulina, Sorbus aucuparia.
Sous-bois herbacé acidophile à Vaccinium myrtillus, Veronica urticifolia, Festuca flavescens, Saxifraga cuneifolia, Luzula nivea, Prenanthes purpurea, Oxalis acetosella, Geranium nodosum, Melampyrum sylvaticum, Athyrium filix-femina, Orthilia secunda, Goodyera repens, Maianthemum bifolium. Les orchidées Epipogon aphyllum et Listera cordata sont parfois présentes.

Dynamique de la végétation

Série de la pessière-sapinière, sous-série acidiphile.

Variabilité et affinité de l'habitat

BRESSET (1975) distingue une variante mésophile à Saxifraga rotundifolia, Paris quadrifolia, Stellaria nemorum, Milium effusum, Lactuca alpina, Pulmonaria saccharata et une variante thermophile à Ranunculus aduncus, Hepatica nobilis, Sesleria argentea, Lathyrus linifolius subsp. montanus, Deschampsia flexuosa.
Forêt décrite sous le nom de "Abietetum sud-occidentale" par BARBERO et BONO (1970).

Etat de la connaissance

Bonne

Code:182	Pessière acidophile subalpine interne à myrtille	
Rattachement phytosociologique au niveau association Homogyno-Piceetum Zukrigl 73		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928
CORINE biotope	42.21	Pessières sub-alpines des Alpes
Natura 2000	9410	Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée

Intérêt patrimonial
Habitat d'espèces pour des oiseaux de l'annexe I de la Directive Oiseaux (pic noir, chouette de Tengmalm). Habitat d'espèces pour Buxbaumia viridis et Orthotrichum rogeri, mousses de l'annexe II de la Directive Habitats.

Menaces
Exploitation forestière. Forêts âgées à gros bois rares.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
LACOSTE, 1975
VAN ES, 2003

Ecologie

Stations fraîches et humides de l'horizon subalpin inférieur, entre 1700 et 2000 m. d'altitude, aux ubacs, sur des pentes moyennement inclinées, sur substrat calcaire (sol décarbonnaté) ou siliceux, à humus de type mor-moder.

Cortège floristique
Festuca flavescens Bellardi, 1792
Hieracium murorum L., 1753
Homogyne alpina (L.) Cass., 1821
Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth., 1909
Luzula sylvatica subsp. sieberi (Tausch) K.Richt., 1890
Melampyrum sylvaticum L., 1753
Orthilia secunda (L.) House, 1921
Oxalis acetosella L., 1753
Picea abies (L.) H.Karst. subsp. abies
Rhododendron ferrugineum L., 1753
Vaccinium myrtillus L., 1753

Physionomie de l'habitat

Pessières souvent accompagnées par Larix decidua peu abondant, et parfois Abies alba (limite altitudinale inférieure du groupement). Strate arbustive très clairsemée avec Sorbus aucuparia.
Sous-bois herbacé dominé par Vaccinium myrtillus avec Rhododendron ferrugineum (rare), Luzula luzulina, Melampyrum sylvaticum, Luzula sylvaticum subsp. sieberi, Homogyne alpina, Hieracium murorum, Festuca flavescens, Orthilia secunda, Ranunculus breyninus, Soldanella alpina, Solidago virgaurea, Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa, Astrantia minor.

Dynamique de la végétation

Stabilité stationnelle, habitat climacique (Série subalpine de l'épicea) mais rarement réalisé, largement substitué par des mélézeins pionniers de reconquête.

Variabilité et affinité de l'habitat

Forêt décrite dans la Tinée (LACOSTE, 1975) sous le nom de Piceetum subalpinum Braun-Blanquet 1938 myrtilletosum Braun-Blanquet 1954
Variante hygro-sciaphile se développant dans les situations les plus confinées, différenciée par Aconitum lycoctonum subsp. vulparia, Chaerophyllum villarsii, Geranium sylvaticum, Lilium martagon, Oxalis acetosella, Imperatoria ostrutium...

Etat de la connaissance

Bonne

Code:222	Eboulis et pierrier calcaires mésoméditerranéens thermophiles à centranthe rouge et géranium pourpre	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Pimpinello tragium - Gouffeion arenarioidis Braun-Blanq. in Braun-Blanq. ,...
CORINE biotope	61.32	Eboulis provençaux
Natura 2000	8130	Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Cahiers d'habitats	8130-22	Éboulis calcaires mésoméditerranéens et supraméditerranéens à éléments moyens, du Midi
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Mésoméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Groupement rare dans le PNM

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Eboulis calcaires exposés au sud, sous influence méditerranéenne marquée, à basse altitude (en-dessous de 500 m.)

Physionomie de l'habitat

Végétation au faible recouvrement, caractérisée par des espèces xéro-thermophiles : Centranthus ruber, Geranium robertianum subsp. purpureum, Cephalaria leucantha, Cheilanthes acrostica.

Cortège floristique
Asplenium ceterach L., 1753
Centranthus ruber (L.) DC., 1805
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818
Cheilanthes acrostica (Balb.) Tod., 1866
Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman, 1878
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon, 1876
Scrophularia provincialis Rouy, 1909
Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909

Etat de la connaissance

Faible

Code:17	Prairie subalpine eutrophe pâturée à pâturin des Alpes	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Poion alpinae Gams ex Oberdorfer 1950
CORINE biotope	36.52	Pâturages à Liondent hispide
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Cians,Roya

Intérêt patrimonial
Faible

Menaces

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie
VAN ES, 2003

Ecologie

Replats, faibles pentes souvent à proximité de bergeries mais parfois sur des crêtes éloignées. Indifférent à la nature du substrat

Cortège floristique
Achillea millefolium L., 1753
Festuca nigrescens Lam., 1788
Phleum alpinum subsp. rhaeticum Humphries, 1978
Poa alpina L., 1753
Trifolium repens L., 1753

Physionomie de l'habitat

Végétation herbacée entièrement recouvrante et haute de 20 à 30 cm, nettement dominée par des poacées (graminées), dont principalement Festuca nigrescens, Phleum alpinum subsp. rhaeticum et Poa alpina.

Dynamique de la végétation

Communauté liée à une forte pression de pâturage pouvant difficilement, sauf après abandon, évoluer vers des formations ligneuses. Dans le cas de création de reposoir, végétation en place pouvant évoluer transitoirement vers cette pelouse du Poion alpinae, avant d'évoluer vers celles du Rumicion pseudalpini.

Etat de la connaissance

Faible. Peu étudié.

Code:242	Pelouse piétinée subalpine à alpine à pâturin étalé	
Rattachement phytosociologique au niveau association Alchemillo monticolae - Poetum supinae Aichinger 1933		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Poion supinae Rivas Mart. & Géhu 1978
CORINE biotope	87.2	Zones rudérales
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye

Intérêt patrimonial
Non, habitat représentant un stade de dégradations de différentes pelouses.

Menaces
Habitat non menacé.

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Pelouses rases, denses à assez denses, établies le long des passages utilisés par le bétail ou les humains, notamment le long des itinéraires, sentiers et fond de dolines ou abords de bergeries et abreuvoirs, aux étages alpin inférieur et subalpin. Milieux associés souvent aux pelouses chionophiles à enneigement assez long et aux diverses formations des reposoirs nitrophiles.

Cortège floristique
Alchemilla vulgaris L., 1753
Carex ovalis Gooden., 1794
Carum carvi L., 1753
Gagea liotardii (Sternb.) Schult. & Schult.f., 1829
Phleum alpinum subsp. rhaeticum Humphries, 1978
Plantago major L., 1753
Poa alpina L., 1753
Poa supina Baumg., 1846
Scorzoneroides autumnalis subsp. autumnalis
Trifolium repens L., 1753
Veronica serpyllifolia proles humifusa (Dicks.) Rouy, 1909

Physionomie de l'habitat

La végétation y est pauvre et est caractérisée par la couleur vert-jaune tendre et le fort recouvrement impressionnant de Poa Supina.

Etat de la connaissance

Faible.

Code:206	Falaise calcaire méditerranéenne à polypode cambrien et bryophytes	
Rattachement phytosociologique au niveau association Polypodietum cambrici Braun-Blanquet 31 ex Braun-Blanquet, Roussine & Nègre 52		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Polypodion serrati Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
CORINE biotope	62.1115	Falaises méditerranéennes à Fougères
Natura 2000	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8210-26	Végétation humo-épilithique des parois calcaires méditerranéennes
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Aassociation très rare dans le PNM.

Menaces
Purges des falaises

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Parois calcaires ombragées sous couvert forestier et bénéficiant d'un microclimat humide avec de faibles écarts de température et d'hygrométrie. Etage mésoméditerranéen supérieur, jusqu'à 500 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Végétation dominée par Polypodium cambricum, associé à de nombreuses bryophytes humo-épilitiques.

Cortège floristique
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey., 1964
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.
Neckera crispa Hedw.
Plasteurhynchium meridionale (Schimp.) M.Fleisch.
Polypodium cambricum L., 1753
Porella arboris-vitae (With.) Grolle
Porella platyphylla (L.) Pfeiff.
Scorpiurium circinatum (Bruch) M.Fleisch. & Loeske

Dynamique de la végétation

Groupement stable

Etat de la connaissance

Bonne

Code:215	Falaise calcaire subalpine à alpine à raiponce de Charmeil	
Rattachement phytosociologique au niveau association Phyteumo charmelii - Bupleuretum petraeae Lacoste 1975		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Potentillion caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	62.151	Falaises calcaires ensoleillées des Alpes
Natura 2000	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8210-12	Falaises calcaires subalpines à alpines, des Alpes
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Ubaye,Var,Tinée

Intérêt patrimonial
Présence d'espèces protégées : Minuartia rupestris, Primula marginata, Saxifraga diapensioides

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LACOSTE, 1975

Ecologie

Barres et falaises de calcaire compact (jurassique, crétacé) et de grès d'Annot, de 1600 m. à 2500 m. d'altitude, à toutes les expositions, sauf à l'étage alpin, où l'association se cantonne aux expositions chaudes.

Physionomie de l'habitat

Végétation des fissures de falaises, au faible recouvrement (10 %).

Cortège floristique
Bupleurum petraeum L., 1753
Globularia repens Lam., 1779
Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard, 1940
Hieracium lawsonii Vill., 1779
Minuartia rupestris (Scop.) Schinz & Thell. subsp. rupestris
Phyteuma charmelii Vill., 1785
Primula marginata Curtis, 1792
Rhamnus alpina L., 1753
Saxifraga diapensioides Bellardi, 1792

Variabilité et affinité de l'habitat

Sous-association sur grès d'Annot, caractérisée par Draba dubia, au-dessus de 2000 m. d'altitude.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:258	Falaise calcaire alpine à primevère marginée et valériane à feuilles de saule	
Rattachement phytosociologique au niveau association Primulo marginatae - Valerianetum saliuncae Lavagne 1963		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Potentillion caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	62.151	Falaises calcaires ensoleillées des Alpes
Natura 2000	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8210-12	Falaises calcaires subalpines à alpines, des Alpes
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée

Intérêt patrimonial
Intérêt patrimonial fort pour cet habitat abritant des espèces endémiques.

Menaces
Habitat peu soumis aux activités humaines ; non menacé.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LAVAGNE, 1963

Ecologie

Végétation chasmophytique cryophile alpine des rochers et parois et calcaires des Alpes internes méridionales (Ubaye et Queyras), entre 2450 et 2950 m. d'alt. composée de plantes en coussinet ou succulentes à enracinement profonds, se développant dans les fissures riches en humus noir de type mull. Le groupement s'enrichit en espèces de pelouse en fonction de l'altitude, l'exposition et la largeur des fissures. Peut-être considéré comme une variante méridionale de l'Androsacetum helveticae.

Cortège floristique
Androsace pubescens DC., 1805
Artemisia genipi Weber, 1775
Artemisia glacialis L., 1763
Artemisia umbelliformis Lam., 1783
Primula marginata Curtis, 1792
Valeriana saliunca All., 1785

Physionomie de l'habitat

Végétation herbacée très ouverte (

Dynamique de la végétation

Habitat à caractère permanent.

Etat de la connaissance

Faible, le lien entre cet habitat et d'autres habitats de parois calcaires doit être étudié.

Code:104	Fruticée à spartier en jonc	
Rattachement phytosociologique au niveau association Spartio juncei - Clematidetum vitalbae (Ozenda 66) Loisel 76		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Pruno spinosae - Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954
CORINE biotope	32.A	Champs de Spartium junceum
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen,Supraméditerranéen

Répartition
Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Intérêt floristique faible. Intérêt faunistique (avifaune).

Menaces
Peu menacé.

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie
LOISEL, 1976

Ecologie

Restanques abandonnées, talwegs frais, sur calcaire, entre 400 et 800 m. d'altitude.

Cortège floristique
Clematis vitalba L., 1753
Coriaria myrtifolia L., 1753
Cotinus coggygria Scop., 1771
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
Spartium junceum L., 1753

Physionomie de l'habitat

Groupement arbustif dominé par Spartium junceum, constituant des fruticées denses et impénétrables, surmonté de draperies de Clematis vitalba.

Dynamique de la végétation

Evolue vers des boisements thermophiles dominés par Quercus pubescens.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:106	Fruticée à sumac fustet et corroyère à feuilles de myrte	
Rattachement phytosociologique au niveau association Rubo ulmifolii - Coriarietum myrtifoliae de Bolos 1954 ostryetosum de Bolos 1970		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Pruno spinosae - Rubion ulmifolii de Bolos 1954
CORINE biotope	31.89	Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens sud-occidentaux
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen,Supraméditerranéen

Répartition
Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Intérêt floristique limité. Intérêt faunistique (avifaune).

Menaces
Peu menacé.

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie
BOLOS (DE), 1970
LOISEL, 1976

Ecologie

Stations fraîches, ubacs, talwegs, restanques à l'abandon, sur calcaire, aux étages méso et supraméditerranéen.

Cortège floristique
Coriaria myrtifolia L., 1753
Cotinus coggygria Scop., 1771
Ligustrum vulgare L., 1753
Lonicera etrusca Santi, 1795
Ostrya carpinifolia Scop., 1772
Prunus spinosa L., 1753
Rubus ulmifolius Schott, 1818
Spartium junceum L., 1753

Physionomie de l'habitat

Fourré caducifolié souvent dominé par Cotinus coggygria, avec la ronce Rubus ulmifolius, Coriaria myrtifolia.

Dynamique de la végétation

Cette fruticée s'inscrit dans la dynamique de la série de l'ostrya, à l'étage supraméditerranéen.

Variabilité et affinité de l'habitat

Confusion avec les fruticées xérophiles à Cotinus coggygria.

Etat de la connaissance

Habitat proche du Junipero oxycedri - Cotinetum coggygriae Biondi, Allegrezza et Gujtian 1988, association de l'alliance du Cytision sessilifolii, dépourvue de Coriaria myrtifolia.

Code:128	Pinède calcicole de pin maritime	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molinier 1934
CORINE biotope	42.823	Forêts de Pins mésogéens franco-italiennes
Natura 2000	9540	Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen,Supraméditerranéen

Répartition
Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Moyen

Menaces
Incendies

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pentes d'adret, crêtes orientées à l'est, vallons ouverts ou pentes orientés à ouest-sud-ouest. Sols superficiels (crêtes) à relativement profonds (versants orientés ouest et vallons). Le substrat géologique est pauvre en calcaire actif (calcaires gréseux). De 450 à 1100 m. d'altitude.

Cortège floristique
Asparagus acutifolius L., 1753
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Daphne gnidium L., 1753
Genista pilosa L., 1753
Lonicera implexa Aiton, 1789
Pinus halepensis Mill., 1768
Pinus pinaster Aiton, 1789
Pistacia terebinthus L., 1753
Quercus ilex L., 1753
Smilax aspera L., 1753

Physionomie de l'habitat

Pinède clairiérée de pin maritime. La strate arborée est composée de Pinus pinaster accompagné parfois de Pinus halepensis. La strate arbustive est parfois peu fournie (pinèdes sur garrigues), ou comprend des arbustes et lianes sclérophylles méditerranéens : Arbutus unedo, Erica arborea, Erica scoparia, Rhamnus alaternus. La strate herbacée est généralement plus riche que dans les pinèdes de pin d'Alep avec Pteridium aquilinum, Genista pilosa, Stachys officinalis.

Dynamique de la végétation

Forêts pionnières généralement mises en place à la suite d'incendies.
Dynamique progressive conduisant soit aux Chênaies blanches méso-xérophiles à Ostrya carpinifolia (crêtes et pentes d'adret) soit aux yeuseraies à frêne à fleur (pentes ouest sur sol plus profond). Dynamique régressive (liée aux attaques de Matsucoccus feytaudi ou aux incendies) conduisant à divers stades arbustifs (Fourrés calcicoles à Spartium junceum et Clematis vitalba, Fourrés thermophiles à Pistacia lentiscus et Rhamnus alaternus, Garrigues à Cistus albidus?) et de pelouses (Friches - Ourlets à Dianthus balbisi et Brachypodium rupestre, Lavandaies à Euphorbia spinosa et Genista cinerea).

Etat de la connaissance

Faible

Code:129	Chênaie pubescente supraméditerranéenne à buis	
Rattachement phytosociologique au niveau association Buxo sempervirentis - Quercetum pubescentis Br.-Bl. (31-32) in Br.-Bl. et al. 52		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932
CORINE biotope	41.711	Bois occidentaux de Quercus pubescens
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Var,Cians,Tinée

Intérêt patrimonial
Intérêt entomologique et chiroptérologique très fort en présence d'arbres âgés et sénescents et d'une strate arbustive réduite.

Menaces
La plupart des chênaies dans le PNM ne sont plus exploitées d'un point de vue sylvicole.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BRAUN-BLANQUET, ROUSSINE et NEGRE, 1952

Ecologie

Pentes et plateaux, sur substrat calcaire, entre 500 et 1200 m d'altitude, exceptionnellement jusqu'à 1600 m d'alt (haute vallée du Var), à toutes les expositions.

Physionomie de l'habitat

Forêt dominée par le chêne pubescent avec Acer opalus, Sorbus aria, Pinus sylvestris. La strate arbustive est bien développée et dominée par le buis, accompagné de Amelanchier ovalis, Cytisophyllum sessilifolium, Hippocrepis emerus, Viburnum lantana. La strate herbacée est souvent fournie, avec Hepatica nobilis, Primula vulgaris, Sanicula europaea, Festuca heterophylla, Melampyrum vaudense, Melittis melissophyllum, Campanula trachelium, Campanula persicifolia.

Dynamique de la végétation

Les stades de dégradation sont des fruticées à buis et des garides à Genista cinerea et Lavandula angustifolia.

Cortège floristique
Acer opalus Mill., 1768
Anemone hepatica L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Melittis melissophyllum L., 1753
Pinus sylvestris L., 1753
Primula veris subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm., 1908
Quercus pubescens Willd., 1805
Sanicula europaea L., 1753
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

Etat de la connaissance

Bonne

Code:130	Chênaie pubescente supraméditerranéenne thermophile à sumac fustet	
Rattachement phytosociologique au niveau association	Buxo sempervirentis - Quercetum pubescentis Br.-Bl. (31-32) in Br.-Bl. et al. 52	Rattachement phytosociologique au niveau alliance Cotino coggygriae - Quercion pubescentis Br.-Bl. (31-32) in Br.-Bl. et al. 52
CORINE biotope	41.711	Bois occidentaux de Quercus pubescens
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Var

Intérêt patrimonial
Intérêt entomologique et chiroptérologique très fort en présence d'arbres âgés et sénescents et d'une strate arbustive réduite.

Menaces
La plupart des chênaies dans le PNM ne sont plus exploitées d'un point de vue sylvicole.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BANNES-PUYGIRON (DE), 1933

Ecologie

Versants d'adrets xérothermophiles sur calcaire ou pélites rouges, jusqu'à 1000 m. d'altitude environ.

Physionomie de l'habitat

Forêt dominée par Quercus pubescens dans la strate arborescente, généralement sous forme de taillis peu élevés. La strate arbustive est généralement riche en Cotinus coggygria, avec Juniperus oxycedrus, Prunus mahaleb, Lonicera etrusca. La strate herbacée est dominée par Brachypodium rupestre.

Cortège floristique
Aristolochia pistolochia L., 1763
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Buxus sempervirens L., 1753
Cotinus coggygria Scop., 1771
Inula conyza DC., 1836
Juniperus oxycedrus L., 1753
Lonicera etrusca Santi, 1795
Prunus mahaleb L., 1753
Quercus pubescens Willd., 1805

Etat de la connaissance

Bonne

Code:131	Chênaie pubescente acidocline à luzule blanc de neige

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932

CORINE biotope	41.71	Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Var

Intérêt patrimonial
Habitat original et rare dans le PNM.

Menaces
Peu menacé.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Forêt se développant sur substrat siliceux : pélites ou quartzites, de 800 à 1100 m d'altitude en ubac, sur pentes relativement fortes au sol peu profond et frais.

Physionomie de l'habitat

Forêt dominée par le chêne pubescent et le pin sylvestre accompagnés par Castanea sativa, Betula pendula, Tilia platyphyllos. La strate arbustive est structurée par Corylus avellana et la strate herbacée dominée par Luzula nivea.

Cortège floristique
Betula pendula Roth, 1788
Castanea sativa Mill., 1768
Corylus avellana L., 1753
Festuca heterophylla Lam., 1779
Luzula nivea (L.) DC., 1805
Pinus sylvestris L., 1753
Quercus pubescens Willd., 1805
Tilia platyphyllos Scop., 1771
Trifolium alpestre L., 1763
Vicia cracca subsp. incana (Burnat) Rouy, 1899

Etat de la connaissance

Faible

Code:146	Châtaigneraie thermophile sur pélites	
Rattachement phytosociologique au niveau association		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932
CORINE biotope	41.9	Bois de Châtaigniers
Natura 2000	9260	Forêts de Castanea sativa
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
A préciser

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Sur pentes en exposition chaude, sur pélites rouges, de 450 à 900 m d'altitude, souvent sur anciennes restanques.

Physionomie de l'habitat

Forêt dominée par Castanea sativa accompagné de Quercus pubescens, Tilia platyphyllos, Sorbus aria, Acer opalus. La strate arbustive est structurée par Buxus sempervirens avec Cytisophyllum sessilifolium, Hippocrepis emerus, Cotinus coggygria, Prunus mahaleb.

Le sous-bois herbacé est fragmentaire et comprend un fort contingent d'espèces neutrophiles des ourlets : Geranium sanguineum, Melittis melissophyllum, Stachys officinalis

Cortège floristique

Acer opalus Mill., 1768
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Buxus sempervirens L., 1753
Castanea sativa Mill., 1768
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Geranium sanguineum L., 1753
Melittis melissophyllum L., 1753
Quercus pubescens Willd., 1805
Stachys officinalis (L.) TrÃ©vis., 1842
Tilia platyphyllos Scop., 1771

Dynamique de la végétation

Cette châtaigneraie semble s'intégrer à la série occidentale du chêne pubescent (carte de végétation des Alpes, feuille de Castellane (BARBERO et al., 1977)).

Etat de la connaissance

Faible

Code:147	Châtaigneraie - chênaie pubescente mésohydrique à luzule blanc de neige

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A définir	Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932

CORINE biotope	41.9	Bois de Châtaigniers
Natura 2000	9260	Forêts de Castanea sativa
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Diversité floristique élevée au niveau des essences arborées et du sous-bois herbacé.

Menaces
Exploitation sylvicole (niveau de menace faible : propriété privé, accès difficile)

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pentes des expositions intermédiaire sur pélites rouges, sol moyennement profond, de 600 à 800 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Forêt mélangée dominée par Castanea sativa et Quercus pubescens accompagnés de Tilia platyphyllos, Acer opalus, Sorbus aria.

La strate arbustive est constituée de Prunus mahaleb, Cytisophyllum sessilifolium, Buxus sempervirens, Cotinus coggygria, Hippocrepis emerus, Ligustrum vulgare.

Le sous-bois herbacé est acidophile avec Luzula nivea, Festuca heterophylla, Saxifraga cuneifolia, Veronica officinalis, Melica uniflora, Geranium nodosum, Solidago virgaurea, Melittis melissophyllum.

Cortège floristique

Acer opalus Mill., 1768
Castanea sativa Mill., 1768
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Festuca heterophylla Lam., 1779
Luzula nivea (L.) DC., 1805
Quercus pubescens Willd., 1805
Saxifraga cuneifolia L., 1759
Solidago virgaurea L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771
Veronica officinalis L., 1753

Code:151	Forêt de feuillus montagnarde à chêne pubescent, frêne commun, alisier blanc

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Querco pubescentis - Aceretum opali Br.-Bl. 1952 ?	Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932

CORINE biotope	41.711	Bois occidentaux de Quercus pubescens
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Var

Intérêt patrimonial
Forêt montagnarde originale composée de diverses essences arborées.

Menaces

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BRAUN-BLANQUET, 1952
BARBERO, 1977

Ecologie

Fonds de vallée (le Var, la Gardivole, le Tuébi), sur bas de versants peu pentus, sol calcaire ou marno-calcaire assez profond, ambiance mésophile, de 900 à 1600 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Forêt de feuillus mélangée prenant le compartiment écologique de la hêtraie à l'étage montagnard et composée de Quercus pubescens, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Acer opalus, Acer pseudoplatanus, Sorbus aria.
La strate arbustive comprend Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Lonicera xylosteum.
La strate herbacée est composée d'espèces mésophiles, elle est riche et diversifiée : Campanula persicifolia, Primula veris subsp. columnae, Helleborus foetidus, Melittis melissophyllum, Trifolium medium, Laserpitium latifolium, Clinopodium vulgare, Chrysanthemum corymbosum, Campanula trachelium, Aquilegia atrata, Viola riviniana...

Cortège floristique
Acer opalus Mill., 1768
Campanula persicifolia L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Helleborus foetidus L., 1753
Melittis melissophyllum L., 1753
Primula veris subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm., 1908
Quercus pubescens Willd., 1805
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

Etat de la connaissance

Très faible. Rattachement phytosociologique à élucider.

Code:159	Pineraie de pin sylvestre supraméditerranéenne, type préalpin occidental	
Rattachement phytosociologique au niveau association		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932
CORINE biotope	42.591	Forêts péri-alpines à Buis de Pins sylvestres
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Var,Tinée

Intérêt patrimonial
Pas de données

Menaces
Faibles

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Pentes d'adret, de 800 à 1600 m. d'altitude, sur substrat calcaire, sol rocailleux et peu profond, ambiance sèche.

Physionomie de l'habitat

Boisement pionnier de Pinus sylvestris dominant accompagné par Quercus pubescens et Acer opalus.
La strate arbustive est constituée par Buxus sempervirens, Amelanchier ovalis, Genista cinerea.
La strate herbacée comprend de nombreuses espèces résiduelles des garides du Lavandulo-Genistion avec Lavandula angustifolia, Brachypodium rupestre, Scabiosa triandra, Genista hispanica, Thymus vulgaris, Euphorbia spinosa...

Cortège floristique
Acer opalus Mill., 1768
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Buxus sempervirens L., 1753
Genista cinerea (Vill.) DC., 1805
Genista hispanica L., 1753
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Pinus sylvestris L., 1753
Quercus pubescens Willd., 1805

Dynamique de la végétation

Ces pinèdes de pin sylvestre pionnières s'intègrent dans la série occidentale du chêne pubescent, sous-série normale. Les stades de dégradation sont représentés par des garides du Lavandulo-genistion physionomiquement dominées par Lavandula angustifolia ou Genista cinerea.

Etat de la connaissance

Faible

Code:160	Pinède sylvestre supraméditerranéenne calcicole d'ubac à feuillus	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932
CORINE biotope	42.591	Forêts péri-alpines à Buis de Pins sylvestres
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Diversité floristique tant en essences arborées que dans le sous-bois herbacé.

Menaces
Faibles (accès difficile pour exploitation sylvicole)

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Bas de versant et pentes d'ubac, de 800 à 1200 m. d'altitude, sur substrat calcaire, ambiance mésohygrophile fraîche.

Physionomie de l'habitat

Forêt mélangée à Pinus sylvestris avec de nombreux feuillus dont Acer opalus, Sorbus aria, Tilia platyphyllos, Betula pendula.
La strate arbustive comprend Buxus sempervirens, Cytisophyllum sessilifolium, Amelanchier ovalis, Genista cinerea.
La strate herbacée est composée d'espèces neutrophiles : Geranium nodosum, Paris quadrifolia, Viola reichenbachiana, Euphorbia dulcis, Polygonatum verticillatum, Salvia glutinosa, Mercurialis perennis, Hepatica nobilis, Carex digitata, Lilium martagon, Listera ovata...

Dynamique de la végétation

Ces pinèdes de pin sylvestre pionnières s'intègrent dans la série occidentale du chêne pubescent, sous-série normale. Les stades de dégradation sont représentés par des garides du Lavandulo-genistion physionomiquement dominées par Lavandula angustifolia ou Genista cinerea.

Cortège floristique
Acer opalus Mill., 1768
Buxus sempervirens L., 1753
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Euphorbia dulcis L., 1753
Geranium nodosum L., 1753
Hepatica nobilis Schreb., 1771
Mercurialis perennis L., 1753
Pinus sylvestris L., 1753
Salvia glutinosa L., 1753
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763
Tilia platyphyllos Scop., 1771
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857

Etat de la connaissance

Faible

Code:149	Chênaie sessile-châtaigneraie-pinède sylvestre sur quartzites	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Quercion roboris Malcuit 1929
CORINE biotope	41.9	Bois de Châtaigniers
Natura 2000	9260	Forêts de Castanea sativa
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Habitat d'espèce pour les chauves-souris arboricoles (gîtes).
Grande diversité floristique des essences de la strate arborée et du sous-bois herbacé.

Menaces
Exploitation sylvicole (menace faible en raison de la difficulté d'accès)

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Croupes et pentes modérées d'ubac sur quartzite, sol rocheux peu profond, altitude de 600 à environ 1300 m.

Physionomie de l'habitat

Castanea sativa est codominant dans la strate arborescente avec Quercus petraea et Pinus sylvestris, accompagné de Betula pendula, Populus tremula, Sorbus aria, Acer opalus, Tilia platyphyllos. La strate arbustive est dominée par Erica arborea, accompagné de Prunus avium, Buxus sempervirens, Amelanchier ovalis, Corylus avellana, Juniperus communis. Le sous-bois herbacé peut présenter un faciès à Sesleria argentea, sinon il est dominé par des espèces neutrophiles et/ou acidoclines avec Prenanthes purpurea, Solidago virgaurea, Lathyrus niger, Luzula nivea, Luzula pedemontana, Festuca heterophylla, Vicia cracca subsp. incana, Genista pilosa, Campanula persicifolia, Melica uniflora, Hepatica nobilis, Geranium nodosum, Veronica hederifolia, Melittis melissophyllum, Primula vulgaris, Salvia glutinosa, Saxifraga cuneifolia...
Ce type de forêt peut également se développer sur une lande à Vaccinium myrtillus, Arctostaphyllos uva-ursi, Calluna vulgaris et Genista pilosa.

Cortège floristique
Castanea sativa Mill., 1768
Erica arborea L., 1753
Festuca heterophylla Lam., 1779
Genista pilosa L., 1753
Luzula nivea (L.) DC., 1805
Luzula pedemontana Boiss. & Reut., 1852
Melittis melissophyllum L., 1753
Pinus sylvestris L., 1753
Prenanthes purpurea L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Quercus petraea Liebl., 1784

Dynamique de la végétation

Série de la chênaie acidiphile de l'étage collinéen de type médioeuropéen (carte de végétation des Alpes, feuille de Castellane (BARBERO et al., 1977)).

Variabilité et affinité de l'habitat

Ce type de groupement forestier peut présenter un faciès sans châtaignier (il n'est pas alors considéré comme habitat d'intérêt communautaire dans les sites Natura 2000).

Code:150	Chênaie sessile-châtaigneraie à noisetier	
Rattachement phytosociologique au niveau association		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Quercion roboris Malcuit 1929
CORINE biotope	41.9	Bois de Châtaigniers
Natura 2000	9260	Forêts de Castanea sativa
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Rareté de Quercus petraea dans les Alpes-Maritimes.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pentes d'ubac sur pélite, de 800 à 900 m. d'altitude, sol profond sur anciennes restanques.

Physionomie de l'habitat

Castanea sativa est accompagné de Quercus petraea (dominant), Fraxinus excelsior, Prunus avium, Populus tremula. Corylus avellana constitue des taillis très denses en sous-bois, avec Crataegus monogyna, Prunus brigantina, Sambucus nigra (dans les vallons). La strate herbacée est essentiellement constituée par un ourlet de l'Alliarion petiolatae à développement spatial, avec Alliaria petiolata, Geranium robertianum subsp. robertianum, Brachypodium sylvaticum, Urtica dioica, Galeopsis tetrahit, Lapsana communis, Moehringia trinervia, Mycelis muralis, Aegopodium podagraria.

Dynamique de la végétation

Série du charme (carte de végétation des Alpes, feuille de Castellane, BARBERO et al., 1977)
Série très polymorphe, sans faciès à Carpinus betulus sur la commune de Roure.

Cortège floristique
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Castanea sativa Mill., 1768
Corylus avellana L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Geranium robertianum L. subsp. robertianum
Lapsana communis L., 1753
Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811
Prunus avium (L.) L., 1755
Quercus petraea Liebl., 1784

Etat de la connaissance

Faible

Code:101	Matorral à genévrier rouge et buis

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Buxo sempervirentis - Juniperetum phoeniceae Rivas-Martinez 1969	Rhamno lycioidis - Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975

CORINE biotope	32.1321	Matorral arborescent, intérieur, à Juniperus phoenicea
Natura 2000	5210	Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Cahiers d'habitats	5210-3	Junipéraies à genévrier rouge
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen,Supraméditerranéen

Répartition
Var,Cians,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Intérêt surtout faunistique (paysage semi-ouvert thermophile favorables aux reptiles et à l'avifaune).

Menaces
Incendies

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pentes rocheuses, crêtes et parois, de 400 à 1650 m d'altitude, aux expositions chaudes. Répandu sur calcaire, mais présent également sur silice.

Cortège floristique
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Buxus sempervirens L., 1753
Erica arborea L., 1753
Juniperus oxycedrus L., 1753
Juniperus phoenicea L., 1753
Phillyrea latifolia L., 1753
Pistacia terebinthus L., 1753
Quercus ilex L., 1753
Rhamnus alaternus L., 1753

Physionomie de l'habitat

Fourré arbustif de 2-3 m. de haut, dominé par Juniperus phoenicea, accompagné de Buxus sempervirens, Quercus ilex, Phillyrea latifolia, Amelanchier ovalis.

Dynamique de la végétation

Selon les conditions stationnelles, habitat stable, ou pouvant évoluer vers des boisements xérophiles à Chêne pubescent.

Variabilité et affinité de l'habitat

Sur substrat siliceux, le groupement en enrichi en Erica arborea qui peut former un faciès lorqu'il est abondant.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:102	Matorral à genévrier oxycèdre	
Rattachement phytosociologique au niveau association Buxo sempervirentis - Juniperetum phoeniceae Rivas-Martinez 1969		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Rhamno lycioidis - Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975
CORINE biotope	32.1311	Matorral arborescent interne à Juniperus oxycedrus
Natura 2000	5210	Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Cahiers d'habitats	5210-1	Junipéraies à genévrier oxycèdre
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen,Supraméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Intérêt surtout faunistique (paysage semi-ouvert thermophile favorables aux reptiles et à l'avifaune).

Menaces
Incendies.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Versants arides, rocheux, sur calcaire

Cortège floristique
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Juniperus oxycedrus L., 1753
Juniperus phoenicea L., 1753
Phillyrea latifolia L., 1753
Pistacia terebinthus L., 1753

Physionomie de l'habitat

Fourré arbustif dominé par Juniperus oxycedrus, lui conférant une couleur bleutée caractéristique bien visible à distance.

Dynamique de la végétation

Habitat non permanent, s'insèrant généralement dans la dynamique forestière de la chênaie pubescente supraméditerranéenne.

Variabilité et affinité de l'habitat

Constitue un faciès du Buxo sempervirentis - Juniperetum phoeniceae, riche en genévrier oxycèdre.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:103	Fourré mésoméditerranéen à supraméditerranéen xérophile à sumac fustet et prunier de Sainte-Lucie	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Rhamno lycioidis - Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975
CORINE biotope	32.21A3	Fourrés occidentaux à Phillyrea
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Mésoméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
A préciser

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Pentes pierreuses calcaires d'adret, entre 650 et 750 m d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Fourré xérothermophile semi-caducifolié dominé par Cotinus coggygria et Prunus mahaleb, accompagné d'arbustes sclérophylles ou caducifoliés méditerranéens : Phillyrea latifolia, Pistacia terebinthus, Jasminum fruticans, Juniperus oxycedrus.

Cortège floristique
Cotinus coggygria Scop., 1771
Jasminum fruticans L., 1753
Juniperus oxycedrus L., 1753
Phillyrea latifolia L., 1753
Pistacia terebinthus L., 1753
Prunus mahaleb L., 1753

Dynamique de la végétation

Evolue vers des boisements thermophiles à Quercus pubescens.

Variabilité et affinité de l'habitat

Physionomiquement proche du Pruno mahaleb - Cotinetum coggygriae, qui s'en distingue par l'absence ou la rareté des arbustes méditerranéens.

Etat de la connaissance

Observé seulement à Saorge près du village. Investigations complémentaires nécessaires pour valider l'individualisation de ce groupement, par rapport aux autres communautés à Cotinus coggygria.

Code:125	Yeuseraie saxicole à buis, genévrier rouge

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Junipero phoeniceae - Quercetum ilicis (Barbero) Loisel 1976	Rhamno lycioidis - Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975

CORINE biotope	45.32	Forêts de Chênes verts supra-méditerranéennes
Natura 2000	9340	Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
Cahiers d'habitats	9340-5	Yeuseraies calcicoles supraméditerranéennes à Buis
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Habitat d'espèce pour des oiseaux nicheurs en falaise mais également pour certaines espèces de chauves souris

Menaces
Confortement et sécurisation des falaises bordant les routes.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Crêtes, parois des gorges et barres rocheuses calcaires abruptes, en exposition chaude ou non, de 200 m à 1000 m. d'altitude.

Cortège floristique
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Juniperus phoenicea L., 1753
Phillyrea latifolia L., 1753
Pistacia terebinthus L., 1753
Quercus ilex L., 1753
Rhamnus alaternus L., 1753

Physionomie de l'habitat

Peuplements arbustifs ou arborescents bas de chêne vert, accompagné de Juniperus phoenicea et de divers arbustes et lianes sclérophylles.

Variabilité et affinité de l'habitat

Identique sur le plan floristique au Buxo-Juniperetum phoeniceae. S'en distingue par sa structure (présence d'une strate arborescente basse) et son écologie strictement rupicole.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:57	Lande subalpine acidophile d'ubac à rhododendron ferrugineux, airelle des marais	
Rattachement phytosociologique au niveau association	Rhododendro ferruginei - Vaccinietum myrtilli Braun-Blanquet 1927 apud Braun-Blanquet, Sissingh & Vlieger 1939	Rattachement phytosociologique au niveau alliance Rhododendro ferruginei - Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930
CORINE biotope	31.42	Landes à Rhododendron
Natura 2000	4060	Landes alpines et boréales
Cahiers d'habitats	4060-4	Landes subalpines acidiphiles hautes à Rhododendron ferrugineux
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Habitat important du point de vue ornithologique (tétras-lyre, lagopède).

Menaces
Menacé par des écobuages à vocation pastorale, pour regagner des pâturages.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LACOSTE, 1975
VAN ES, 2003

Ecologie

Versants frais, de 1600 à 2300 m. d'alt., sur substrat siliceux ou décarbonaté.

Cortège floristique
Astrantia minor L., 1753
Festuca flavescens Bellardi, 1792
Homogyne alpina (L.) Cass., 1821
Rhododendron ferrugineum L., 1753
Vaccinium myrtillus L., 1753
Vaccinium uliginosum L., 1753

Physionomie de l'habitat

Lande dominée par Rhododendron ferrugineus, avec Vaccinium uliginosum, Vaccinium myrtillus.

Dynamique de la végétation

Evolue vers la forêt de mélèze et pin cembro.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:120	Fourré acidophile subalpin à pin mugo, rhododendron ferrugineux	
Rattachement phytosociologique au niveau association Rhododendro ferruginei - Vaccinietum myrtilli Braun-Blanquet 1927 apud Braun-Blanquet, Sissingh & Vlieger 1939 Pinetalia Schmid. 1930		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Rhododendro ferruginei - Vaccinion myrtilli Br.-Bl. 1930
CORINE biotope	31.42	Landes à Rhododendron
Natura 2000	4070	Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
Cahiers d'habitats	4070 / 4060 -2	
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	

Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Habitat très rare en France. Pinus mugo est une espèce protégée.

Menaces
En théorie faible car l'espèce Pinus mugo est protégée par la loi.

Enjeu de conservation
Très fort

Bibliographie

Ecologie

Versants d'ubac à l'étage subalpin supérieur, dans des stations rocheuses en forte pente, sur substrat siliceux (gneiss).

Cortège floristique
Juniperus communis subsp. nana (Hook.) Syme, 1868
Pinus mugo Turra subsp. mugo
Rhododendron ferrugineum L., 1753
Vaccinium myrtillus L., 1753
Vaccinium uliginosum L., 1753

Physionomie de l'habitat

Formation arbustive basse composée d'une strate arbustive de pin mugho superposée sur une lande dominée par Rhododendron ferrugineum.

Dynamique de la végétation

Formation stable.

Variabilité et affinité de l'habitat

Proche de la lande acidophile subalpine répandue à Rhododendron et myrtille (Rhododendro ferruginei - Vaccinietum myrtilli).

Etat de la connaissance

Bonne

Code:171	Pineraie de pin sylvestre acidophile montagnarde d'ubac à myrtille	
Rattachement phytosociologique au niveau association		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930
CORINE biotope	42.5	Forêts de Pins sylvestres
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Type forestier très rare

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
OFFERHAUS B., FRACHON C., 2008

Ecologie

Bas de versant de vallon, en exposition nord, sur pente faible à moyenne, sur substrat siliceux. entre 1400 et 1550 m. d'altitude.

Cortège floristique
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Luzula pedemontana Boiss. & Reut., 1852
Pinus sylvestris L., 1753
Rhododendron ferrugineum L., 1753
Vaccinium myrtillus L., 1753

Physionomie de l'habitat

Forêt dominée par Pinus sylvestris dans la strate arborescente.
Sous-bois constitué par des tapis de Vaccinium myrtillus, accompagné de Rhododendron ferrugineum, Luzula pedemontana, Calluna vulgaris, Viola canina subsp. ruppii, Dryopteris affinis, Erica carnea, Oxalis acetosella, Athyrium filix-femina, Potentilla rupestris, Chaerophyllum villarsii, Polystichum aculeatum.

Variabilité et affinité de l'habitat

Cette forêt peut s'interpréter comme une variante mésophile de la Pineraie de pin sylvestre acidophile montagnarde d'adret (Deschampsio - Pinetum sylvestris).

Etat de la connaissance

Faible.

Code:177	Pineraie de pin à crochets silicicole montagnarde d'ubac à rhododendron ferrugineux	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930
CORINE biotope	42.41	Forêts de Pins de montagne à Rhododendron ferrugineux
Natura 2000	9430	Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Habitat d'espèce pour le Tétras-lyre, oiseau de l'annexe I de la Directive Oiseaux.
Habitat d'espèce potentiel pour Buxbaumia viridis, mousse de l'annexe II de la Directive Habitats.

Menaces
Exploitation forestière.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Pentes d'ubac ou d'expositions intermédiaires de 1500 à 1850 m. d'altitude, sur substrat siliceux moyennement profond.

Physionomie de l'habitat

Forêt dominée par le pin à crochet. La strate herbacée se compose d'une lande à Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus, avec Luzula pedemontana, Homogyne alpina, Viola canina subsp. ruppii, Athyrium filix-femina, Oxalis acetosella, Dryopteris affinis.

Dynamique de la végétation

Série du pin cembro et du mélèze, sous-série mésophile, variante sur silice.

Cortège floristique
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979
Homogyne alpina (L.) Cass., 1821
Luzula pedemontana Boiss. & Reut., 1852
Oxalis acetosella L., 1753
Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, 1936
Rhododendron ferrugineum L., 1753
Vaccinium myrtillus L., 1753
Viola canina subsp. ruppii (All.) SchÃ¼bler & G.Martens, 1834

Etat de la connaissance

Faible

Code:186	Forêt de mélèze subalpine calcicole	
Rattachement phytosociologique au niveau association Rhododendro ferruginei - Vaccinietum Braun-Blanquet 1927 alchemilletosum Lacoste 1975		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930
CORINE biotope	42.3	Forêts de Mélèzes et d'Arolles
Natura 2000	9420	Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée

Intérêt patrimonial
Habitat d'espèce pour le Tétras-lyre, oiseau de l'annexe I de la directive Oiseaux.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LACOSTE, 1975
VAN ES, 2003

Ecologie

Pentes calcaires, rarement gréseuses, entre 1900 et 2200 m. d'altitude, aux expositions fraîches. Sol humique carbonaté.

Physionomie de l'habitat

Forêt de mélèze (Larix decidua). Sous-bois herbacé composé par Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus, Festuca flavescens, Homogyne alpina, et d'espèces basophiles transgressives des pelouses subalpines : Alchemilla alpigena (ou d'autres représentants de la section alpina), Sesleria coerulea, Hieracium bifidum, Polygonum viviparum, Aster bellidiastrum.

Cortège floristique
Alchemilla alpigena Buser, 1894
Festuca flavescens Bellardi, 1792
Hieracium bifidum Kit., 1815
Homogyne alpina (L.) Cass., 1821
Larix decidua Mill., 1768
Rhododendron ferrugineum L., 1753
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763
Vaccinium myrtillus L., 1753

Dynamique de la végétation

Association climacique de l'étage subalpin supérieur sur calcaire.

Variabilité et affinité de l'habitat

Proche de de la forêt de mélèze et pin cembro subalpine acidophile à rhododendron ferrugineux, dont elle se distingue par la moindre abondance et recouvrement des éricacées (rhododendron, myrtille), et par la présence d'espèces basophiles.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:187	Forêt de mélèze et pin cembro subalpine acidophile à calamagrostide velue	
Rattachement phytosociologique au niveau association Vaccinio myrtilli-Pinetum cembrae (Pallman et Haffter 1933) em. Oberd. 1962 calamagrostietosum villosae		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930
CORINE biotope	42.3	Forêts de Mélèzes et d'Arolles
Natura 2000	9420	Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
Cahiers d'habitats	9420-3	Cembraies à Calamagrostis villeux
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Tinée,Vésubie

Intérêt patrimonial
Habitat rare dans le PNM.

Menaces
Peu menacé.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BENSETTITI et al., 2001

Ecologie

Versants en pente faible, dans des talwegs, en exposition fraîche, au-dessus de 2000 m. d'altitude, sur substrat siliceux.

Cortège floristique
Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmel., 1791
Larix decidua Mill., 1768
Pinus cembra L., 1753
Rhododendron ferrugineum L., 1753
Vaccinium myrtillus L., 1753

Physionomie de l'habitat

Forêt de résineux dominée par Larix decidua, accompagné par Pinus cembro, le plus souvent disséminé ou rarement co-dominant. Sous-bois dominé par un tapis graminéen constitué par Calamagrostis villosa, accompagné de Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus, Festuca flavescens, Luzula sylvatica subsp. sieberi, Lonicera caerulea, Homogyne alpina.

Dynamique de la végétation

Serait un type forestier non mature, dont l'évolution conduirait vers la forêt de mélèze et pin cembro au sous-bois recouvert par les éricacées (rhododendron, myrtille).

Variabilité et affinité de l'habitat

Proche de la Forêt de mélèze et pin cembro subalpine acidophile à rhododendron ferrugineux.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:188	Forêt de mélèze et pin cembro subalpine acidophile à rhododendron ferrugineux	
Rattachement phytosociologique au niveau association	Vaccinio myrtilli-Pinetum cembrae (Pallman et Haffter 1933) em. Oberd. 1962 rhododendretosum ferruginei	Rattachement phytosociologique au niveau alliance Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930
CORINE biotope	42.3	Forêts de Mélèzes et d'Arolles
Natura 2000	9420	Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
Cahiers d'habitats	9420-1	Cembraies à Myrtille et Rhododendron
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Habitat d'espèce pour le Tétras-lyre, oiseau de l'annexe I de la directive Oiseaux.

Menaces
Exploitation forestière.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LACOSTE, 1975

Ecologie

Versants frais d'ubac, sur des pentes d'inclinaison variée, de 1900 à 2300 m. d'altitude, substrat siliceux (migmatites, granites, quartzites), sol acide peu profond et caillouteux.

Cortège floristique
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836
Festuca flavescens Bellardi, 1792
Homogyne alpina (L.) Cass., 1821
Juniperus communis subsp. nana (Hook.) Syme, 1868
Larix decidua Mill., 1768
Lonicera caerulea L., 1753
Luzula sylvatica subsp. sieberi (Tausch) K.Richt., 1890
Pinus cembra L., 1753
Rhododendron ferrugineum L., 1753
Vaccinium myrtillus L., 1753
Vaccinium uliginosum L., 1753

Physionomie de l'habitat

Forêt de résineux dominée par Larix decidua, accompagné par Pinus cembro, le plus souvent disséminé ou rarement co-dominant. Sous-bois dominé par des éricacées : Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum accompagnés par Festuca flavescens, Luzula sylvatica subsp. sieberi, Lonicera caerulea, Homogyne alpina, Juniperus communis subsp. nana, Melampyrum sylvaticum, Hieracium murorum.

Dynamique de la végétation

Association climacique. Série du cembro et du mélèze, sous-série sur silice.

Variabilité et affinité de l'habitat

- variante et faciès à Pinus cembra bien développé dans quelques stations du bassin supérieur de la Vésubie.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:189	Forêt de mélèze acidophile du subalpin sur pente forte, à fétuque jaunâtre

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Groupement à Larix decidua et Festuca flavescens Sandoz & Barbero 1974	Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930

CORINE biotope	42.3	Forêts de Mélèzes et d'Arolles
Natura 2000	9420	Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'îlots de très vieux mélèzes dans la haute Bendola.

Menaces
Faibles

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
SANDOZ & BARBERO, 1974

Ecologie

Fortes pentes d'ubac, de 1700 à 2100 m. d'altitude, sur des substrats décalcifiés ou de nature siliceuse, sols bien drainés, lessivés.

Physionomie de l'habitat

Mélézein caractérisé par un sous-bois herbacé constitué d'un tapis recouvrant de Festuca flavescens, accompagné par des espèces mésoxérophiles : Juniperus communis subsp. nana, Daphne mezereum, Achillea millefolium et des espèces mésophiles : Carex ferruginea subsp. tenax, Lonicera alpigena, Ranunculus aduncus, Clematis alpina, Luzula sylvatica subsp. sieberi, Veronica urticifolia, Rubus idaeus, Rosa pendulina, Polystichum lonchitis, Luzula nivea, Orthilia secunda, Melampyrum sylvaticum, Homogyne alpina, et quelques acidophiles : Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum.

Cortège floristique
Carex ferruginea subsp. tenax (H.Christ) K.Richt., 1890
Festuca flavescens Bellardi, 1792
Homogyne alpina (L.) Cass., 1821
Larix decidua Mill., 1768
Luzula nivea (L.) DC., 1805
Melampyrum sylvaticum L., 1753
Orthilia secunda (L.) House, 1921
Rubus idaeus L., 1753
Veronica urticifolia Jacq., 1773

Dynamique de la végétation

Série du Cembro-mélèze

Etat de la connaissance

Moyen

Code:119	Fourré calcicole subalpin à pin mugo et bruyère des neiges	
Rattachement phytosociologique au niveau association	Rhoddodendro hirsuti - Pinetum mughi Br. Bl. 1939 (= Pinetum mughi ligusticum Br.-Bl. 1967)	Rattachement phytosociologique au niveau alliance Rhododendro hirsuti - Pinion mugo Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Diáz,...
CORINE biotope	31.53	Fourrés bas de Pins mugo des Alpes sud-occidentales
Natura 2000	4070	Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
Cahiers d'habitats	4070 / 4060 -1	
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Habitat en limite d'aire occidentale en France, possédant un fort intérêt patrimonial. Habitat d'espèce : Gentiana ligustica (DH2) peut se rencontrer au sein de cet habitat, en compagnie d'autres relictuelles de pelouses. Espèces protégées : Pinus mugo, Erica carnea, Daphne striata.

Menaces
Pression pastorale pour ré-ouvrir des pâturages gagnés par le pin mugo.

Enjeu de conservation
Très fort

Bibliographie
BONO et al., 1967

Ecologie

Pentes rocheuses calcaires de l'étage subalpin en station primaire.

Cortège floristique
Daphne striata Tratt., 1814
Erica herbacea L., 1753
Pinus mugo subsp. mugo

Physionomie de l'habitat

Fourrés impénétrables peu élevés constitués par Pinus mugo, accompagné dans la strate herbacé par Erica herbacea (= E. carnea), Daphne striata.

Dynamique de la végétation

Les peuplements colonisant les pentes rocheuses et érodées sont stables. Le pin mugho a tendance à également coloniser les pâturages dans des stations secondaires. Ces formations peuvent évoluer vers des mélézeins.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:50	Garrigue à ciste cotonneux, jasmin buissonnant

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A définir	Rosmarinion officinalis Br.-Bl. Ex Molinier 1934

CORINE biotope	32.431	Garrigues à Cistus albidus
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Mésoméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LAPRAZ, 1973
GUINOCHET, 1975

Ecologie

Versants d'adret à l'étage mésoméditerranéen, sur calcaire et marno-calcaire, souvent sur pentes fortes rocheuses et escarpements.

Cortège floristique
Cistus albidus L., 1753
Euphorbia spinosa L., 1753
Jasminum fruticans L., 1753
Ruta angustifolia Pers., 1805
Thymus vulgaris L., 1753

Physionomie de l'habitat

Végétation de garrigue, dominée par des chaméphytes et arbrisseaux : Cistus albidus et Jasminum fruticans.


Dynamique de la végétation

Stade de dégradation des forêts de chêne vert sur sol superficiel à Juniperus phoenicea.

Etat de la connaissance

Faible

Code:127	Pinède xérophile pionnière de pin d'Alep	
Rattachement phytosociologique au niveau association Fumano thymifoliae - Rosmarinetum officinalis Lapraz 1973		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Rosmarinion officinalis Br.-Bl. Ex Molinier 1934
CORINE biotope	42.843	Forêts de Pins d'Alep provenço-liguriennes
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Moyen

Menaces
Incendies

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LAPRAZ, 1973
GUINOCHET 1975

Ecologie

Versants d'adret ou crêtes à l'étage mésoméditerranéen, sur calcaire, marno-calcaire et roubines marneuses, souvent sur pentes fortes et caillouteuses.

Cortège floristique
Cistus albidus L., 1753
Coris monspeliensis L., 1753
Cotinus coggygria Scop., 1771
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb, 1838
Globularia alypum L., 1753
Jasminum fruticans L., 1753
Pinus halepensis Mill., 1768
Quercus ilex L., 1753
Rosmarinus officinalis L., 1753
Stipa offneri Breistr., 1950

Physionomie de l'habitat

Forêts clairiérées dominées par le pin d'Alep, accompagné par le chêne vert. La strate arborescente se développe sur des garrigues dominées par des chaméphytes et arbrisseaux : Rosmarinus officinalis, Cistus albidus, Jasminum fruticans, Globularia alypum. Plusieurs faciès peuvent se rencontrer en fonction de l'espèce dominante. Le faciès à Globularia alypum est lié aux escarpements rocheux marno-calcaires.

Dynamique de la végétation

Stade de reconquête forestière post-incendie des garrigues à Cistus albidus. Ces pinèdes pionnières évoluent ensuite vers des chênaies vertes de l'Ostryo-Quercetum ilicis. Les peuplements installés sur des croupes et roubines de marne constituent un paraclimax (dynamique bloquée vers la chênaie).

Variabilité et affinité de l'habitat

L'association de la garrigue : Fumano thymifoliae - Rosmarinetum officinalis Lapraz 1973 est identique au Rosmarino officinalis - Fumanetum thymifoliae décrit par Guinochet (1975).

Etat de la connaissance

Bonne

Code:140	Peupleraie noire sèche sur alluvions

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Rubo caesii - Populion nigrae Passarge 1985

CORINE biotope	44.141	Galeries méditerranéennes de Saules blancs
Natura 2000	92A0	Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
Cahiers d'habitats	92A0-3	Peupleraies noires sèches méridionales
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Var,Tinée

Intérêt patrimonial
Les ripisylves accueillent de nombreux chiroptères (corridors écologiques, lieux de chasse, gîtes pour les espèces arboricoles) et oiseaux inféodés aux rivières et zones humides.

Menaces
Aménagements, travaux d'entretien des berges, modification du régime hydrique des cours d'eau, création de seuils et de micro-centrales hydroélectriques, endiguement.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Banquettes alluvionnaires formées en retrait du lit vif des cours d'eau, quelquefois dans des coudes de la rivière créés par d'anciens cheminements du lit ; sol sablo-limoneux profond et meuble, plus ou moins sec, de 450 à 550 m d'altitude.

Cortège floristique
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Buxus sempervirens L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Fraxinus excelsior L., 1753
Juniperus communis L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Pinus sylvestris L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755

Physionomie de l'habitat

Forêt riveraine ne formant pas de liseré mais s'étendant dans des coudes du lit majeur des cours d'eau.
Strate arborescente dominée par Populus nigra, Populus alba et Fraxinus excelsior accompagnés par des essences hygrophiles telles Alnus glutinosa, Tilia platyphyllos mais aussi par des essences des stades plus évolués : Pinus sylvestris, Ostrya carpinifolia, Prunus avium...
La strate arbustive est elle aussi caractérisée par une xéricité plus marquée avec la dominance de Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Cotinus coggygria, Hippocrepis emerus, Lonicera xylosteum, Juniperus communis...

Dynamique de la végétation

Liée aux crues majeures du cours d'eau touchant le lit majeur. Les stades pionniers sont favorisés par les remaniements du lit majeur des cours d'eau notamment les saulaies arbustives à Salix eleagnos et Salix purpurea.

Etat de la connaissance

Faible

Code:68	Mégaphorbiaie nitrophile subalpine à patience alpine

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Rumicion pseudalpini Rübel ex Scharfetter 1938 corr. Loidi & Biurrun 1996

CORINE biotope	37.88	Communautés alpines à Patience alpine
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Faible

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie
VAN ES, 2003

Ecologie

Groupement lié au stationnement des troupeaux. On le rencontre souvent à proximité de vacheries ou de bergeries, à l'étage subalpin.

Physionomie de l'habitat

Communauté de hautes herbes dominée par Rumex alpinus.

Cortège floristique
Chenopodium bonus-henricus L., 1753
Cirsium spinosissimum (L.) Scop., 1769
Festuca pratensis subsp. apennina (De Not.) Hegi, 1908
Galeopsis ladanum L., 1753
Imperatoria ostruthium L., 1753
Rumex alpinus L., 1759
Urtica dioica L., 1753

Etat de la connaissance

Bonne

Code:123	Fourré subalpin mésohygrophile à saule à feuilles hastées	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Salicion helveticae Rübel ex Theurillat in Theurillat, Aeschimann, P. Küpfer &...
CORINE biotope	31.6211	Brousses à Saules bas des Alpes
Natura 2000	4080	Fourrés de Salix spp. subarctiques
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée

Intérêt patrimonial
Saulaie de caractère relictuel présentant un très fort intérêt patrimonial.

Menaces

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
LACOSTE, 1975

Ecologie

Pentes d'éboulis siliceux stabilisée en pied de paroi rocheuse, soumise à des écoulements, à une altitude de 2250 m. Sol superficiel humide, légèrement acide

Physionomie de l'habitat

Fourré arbustif dense composé de Salix hastata. Strate herbacée composée d'espèces des éboulis alpins siliceux et d'espèces des mégaphorbiaies subalpines.

Cortège floristique
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871
Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb., 1831
Descurainia tanacetifolia (L.) Prantl, 1892
Doronicum clusii (All.) Tausch, 1828
Imperatoria ostruthium L., 1753
Oreochloa seslerioides (All.) K.Richt., 1890
Salix hastata L., 1753
Viola biflora L., 1753

Dynamique de la végétation

Formation stable.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:44	Combe à neige alpine acidophile à saule herbacé	
Rattachement phytosociologique au niveau association Salicetum herbaceae (Rübel 1912) Braun-Blanquet 1913; Alopecuro gerardi - Caricetum [illegible] Braun-Blanquet 1954		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et H. Jenny 1926
CORINE biotope	36.1112	Communautés acidiphiles des combes à neige alpines à Saule nain
Natura 2000	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Fort

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
GUINOCHET, 1938
VAN ES, 2005

Ecologie

Combes à neiges longuement enneigées (8 à 9 mois en moyenne), dépressions et pentes faibles exposées au nord, sur substrat siliceux, à l'étage alpin, au-dessus de 2300 m. d'altitude.

Cortège floristique
Cardamine alpina Willd., 1800
Gnaphalium supinum L., 1768
Polytrichum juniperinum Hedw.
Salix herbacea L., 1753
Sedum alpestre Vill., 1779
Sibbaldia procumbens L., 1753

Physionomie de l'habitat

Pelouse rase à fort recouvrement dominée par les tapis de Salix herbacea, accompagné de plantes naines à feuilles en rosettes ou plaquées au sol.

Dynamique de la végétation

Association le plus souvent permanente.

Variabilité et affinité de l'habitat

Variante à Viola nummularifolia sur pentes ébouleuses.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:45	Combe à neige alpine acidophile à Polytrichum sexangulare	
Rattachement phytosociologique au niveau association Polytrichetum sexangularis (Braun 1913) Frey 1948		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	36.1111	Communautés acidiphiles des combes à neige alpines à mousses
Natura 2000	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Fort

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BARBERO, 1972
GUINOCHET, 1938

Ecologie

Berges de lacs alpins, cuvettes et combes à neige longuement enneigées, sur silice, au-dessus de 2500 m. d'altitude. Sol riche en éléments fins (sables et limons).

Cortège floristique
Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis.
Gnaphalium supinum L., 1768
Kiaeria falcata (Hedw.) I.Hagen
Pohlia obtusifolia (Vill. ex Brid.) L.F.Koch
Polytrichastrum sexangulare (Brid.) G.L.Sm.
Salix herbacea L., 1753
Sibbaldia procumbens L., 1753

Physionomie de l'habitat

Pelouses rases dominées par des bryophytes : tapis verts foncés de Polytrichastrum sexangulare contrastant avec les colonies gris blanc de Anthelia juratzkana. La végétation vasculaire présente un faible recouvrement, avec Salix herbacea, Gnaphalium supinum, Sibbaldia procumbens.

Dynamique de la végétation

Groupement permanent.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:247	Pelouse de combe à neige alpine acidiphile à vulpin de Gérard et laîche fétide	
Rattachement phytosociologique au niveau association Alopecureto alpini - Caricetum foetidae Guinochet 1938		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	36.1113	Communautés acidiphiles de combes à neige alpines à Carex-Gnaphalium
Natura 2000	6150	Pelouses boréo-alpines siliceuses
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Fort

Menaces

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Dépressions longuement enneigées à sol hydromorphe, en bordure de lacs alpins, au-dessus de 2400 m. d'altitude, sur substrat siliceux.

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée au fort recouvrement, constituant des tapis denses de 15 à 20 cm. de haut constitués par Carex foetida et Alopecurus alpinus, accompagnés par des espèces de petites taille : Salix herbacea, Gnaphalium supinum, Sibbaldia procumbens.

Cortège floristique
Alopecurus alpinus Vill., 1786
Carex foetida All., 1785
Gnaphalium supinum L., 1768
Salix herbacea L., 1753
Sibbaldia procumbens L., 1753

Code:248	Pelouse de combe à neige alpine acidiphile hygrophile à pâturin étalé et céreste faux céreste	
Rattachement phytosociologique au niveau association Poo supinae - Cerastietum cerastioidis (Söyrinki 1954) Oberdorfer 1957		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	36.111	Communautés acidiphiles des combes à neige alpines
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye

Intérêt patrimonial
Fort

Menaces
Eutrophisation du milieu en lien avec les activités pastorales.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Végétation pionnière des dépressions très longuement enneigées (durée supérieure à 9-10 mois) sur sol mouillé en permanence riche en humus, remplaçant les groupements à Carex foetida quand la durée d'enneigement augmente.

Cortège floristique
Cerastium cerastoides (L.) Britton, 1894
Poa alpina L., 1753
Poa supina Baumg., 1846
Sagina saginoides (L.) H.Karst., 1882
Veronica alpina L., 1753

Physionomie de l'habitat

Tapis herbacé très ras haut de quelques centimètres, clairsemé, dominé par des dicotylédones (hémicryptophytes stolonifères)à forte croissance végétative et une monocotylédone spécialisée (Poa supina).

Variabilité et affinité de l'habitat

- transition avec les bas-marais acide (Caricion fuscae);
- transition avec des végétations fontinales.

Code:124	Saulaie à saule drapé

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Salicetum elaeagno - purpureae Sillinger 1933	Salicion incanae Aichinger 1933

CORINE biotope	44.11	Saussaies pré-alpines
Natura 2000	3240	Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
Cahiers d'habitats	3240-1	Saulaies riveraines à Saule drapé des cours d'eau des Alpes et du Jura
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Var,Tinée,Roya

Intérêt patrimonial
Habitat important du point de vue de l'entomofaune. Les saules sont des plantes hôtes pour de nombreuses espèces de lépidoptères (microlépidoptères, Catocalinae, Notodontidae, Sphingidae), et présentent à la floraison un grand intérêt mellifère pour les hyménoptères. Habitat potentiel pour le Sphinx de l'argousier (Hyles hippophaes, protection nationale, annexe IV de la Directive Habitats), dont la chenille se nourrit de l'argousier (Hippophae rhamnoides), un arbuste présent dans cet habitat.

Menaces
- rectification du lit des des cours d'eau par endiguement (empierrement des rives).
- ouverture et exploitation de gravières.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Lit de rivière et de torrent alpin, pouvant être soumis à de fortes crues, sur alluvions grossières (galets) et sableuses, aux étages supraméditerranéen et montagnard.

Cortège floristique
Salix eleagnos Scop., 1772
Salix purpurea L., 1753

Physionomie de l'habitat

Fourré arbustif de 2-4 m. de hauteur, structuré par Salix eleagnos et Salix purpurea, et accompagné par des individus juvéniles d'essences de ripisylve : Alnus incana, Alnus glutinosa, Populus nigra. Myricaria germanica est parfois présent, ainsi que Hippophae rhamnoides.

Dynamique de la végétation

Formations pionnières succédant à la végétation herbacée de l'Epilobion fleischeri, et susceptibles d'évoluer vers des aulnaies blanches, frênaies-aulnaies glutineuses ou des peupleraies noires. Ces saulaies sont soumises à la dynamique torrentielle des cours d'eau. Elles peuvent être emportées lors des crues violentes pour ensuite se reconstituer sur des bancs de gravier exondés nouvellement créés.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:117	Clairière forestière montagnarde à sureau à grappes

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Senecio fuschii - Sambucetum racemosae (Noirf. 1949) Oberd. 57	Sambuco racemosae - Salicion capreae Tüxen & Neumann in Tüxen 1950

CORINE biotope	31.872	Clairières à couvert arbustif
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Verdon,Cians

Intérêt patrimonial
A préciser

Menaces
Peu menacé. Habitat favorisé par l'exploitation forestière.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
OBERDORFER, 1957

Ecologie

Trouées forestières anciennes, coupes, chablis. Sol frais, riche en azote. Etage montagnard, dans la série de la hêtraie-sapinière et de la pessière-sapinière acidophile.

Cortège floristique
Epilobium angustifolium L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus racemosa L., 1753
Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803
Sorbus aucuparia L., 1753

Physionomie de l'habitat

Fourré arbustif dominé par Sambucus racemosa, avec Sorbus aucuparia, Salix capraea. Strate herbacée composée de Epilobium angustifolium, Senecio ovatus, Rubus idaeus.

Dynamique de la végétation

Phase pionnière plus ou moins fugace évoluant vers des sapinières et pessières montagnardes.

Variabilité et affinité de l'habitat

Association proche de l'Epilobio angustifolii - Salicetum capreae, qui est dominé par Salix capraea.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:118	Clairière forestière montagnarde à saule marsault	
Rattachement phytosociologique au niveau association Epilobio angustifolii - Salicetum capreae Oberdorfer 1957		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Sambuco racemosae - Salicion capreae Tüxen & Neumann in Tüxen 1950
CORINE biotope	31.872	Clairières à couvert arbustif
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Verdon,Ubaye,Cians,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Bien qu'abritant en majorité des espèces banales, cette association est un habitat d'espèce pour Orthotrichum rogeri (annexe II directive Habitats), qui colonise les troncs et branches éclairés de Salix capraea, Sorbus aucuparia, Laburnum alpinum.

Menaces
Peu menacé. Favorisé par l'exploitation forestière.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
OBERDORFER, 1957

Ecologie

Trouées forestières, coupes, chablis, lisières. Sol frais, pauvre en humus, riche en éléments grossiers. Etage montagnard, dans la série de la hêtraie-sapinière et de la pessière-sapinière acidophile.

Cortège floristique
Epilobium angustifolium L., 1753
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835
Orthotrichum rogeri Brid.
Rubus idaeus L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sorbus aucuparia L., 1753

Physionomie de l'habitat

Fourré arbustif dominé par Salix capraea, avec Sorbus aucuparia, Laburnum alpinum, Betula pendula, Populus tremula. Strate herbacée composée de Epilobium angustifolium, Senecio ovatus, Rubus idaeus.

Dynamique de la végétation

Phase pionnière plus ou moins fugace évoluant vers des sapinières et pessières montagnardes.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:1	Pelouse xérothermophile méditerranéenne à andropogonées	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Saturejo graecae - Hyparrhenion hirtae O. Bolos 1962
CORINE biotope	34.634	Steppes à Andropogon
Natura 2000	6220	Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Habitat rare sur le territoire du PNM.
Présence d'une espèce protégée au niveau régional : Cleistogenes serotina, et de Andropogon distachyos, espèce rare en France en limite nord de son aire sur le site.

Menaces
Envahissement par des xénophytes (Opuntia sp.).

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Pentes rocailleuses calcaires chaudes exposées au sud, entre 400 et 500 m. d'alt.

Cortège floristique
Andropogon distachyos L., 1753
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981
Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty, 1960
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf, 1919

Physionomie de l'habitat

Pelouse vivace dominée par des graminées xérothermophiles dont Hyparrhenia hirta et Andropogon distachyos.

Dynamique de la végétation

Pelouse évoluant lentement vers une cistaie à Cistus albidus puis vers un matorral à Juniperus phoenicea et Juniperus oxycedrus.

Etat de la connaissance

Faible

Code:207	Falaise calcaire supraméditerranéenne à subalpine à saxifrage à feuilles en languette	
Rattachement phytosociologique au niveau association Saxifragetum lingulatae Quézel & Rioux in Rioux & Quézel 1949		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951
CORINE biotope	62.13	Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins
Natura 2000	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8210-8	Falaises calcaires supraméditerranéennes à subalpines du Sud-Est
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Association endémique du sud-est de la France et de la Ligurie, abritant des espèces endémiques, pour la plupart protégées.

Menaces
Falaises en bordure de route menacées par les purges pour la mise en sécurité

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
RIOUX & QUEZEL, 1949
QUEZEL, 1950
BARBERO, 1969

Ecologie

Parois, barres et rochers calcaires héliophiles, jusqu'à 2000 m. d'altitude. Se rencontre également sur pélites rouges (gorges de Daluis).

Physionomie de l'habitat

Communauté marqué par l'abondance de Saxifraga callosa aux longs panicules pendants de fleurs blanches, associé à de nombreuses plantes endémiques colonisant les fissures de la roche.

Cortège floristique
Asperula hexaphylla All., 1785
Hormathophylla halimifolia (Boiss.) P.KÃ¼pfer, 1974
Micromeria marginata (Sm.) Chater, 1971
Moehringia lebrunii Merxm., 1965
Potentilla caulescens subsp. petiolulata (Gaudin) Nyman, 1878
Primula marginata Curtis, 1792
Saxifraga callosa Sm., 1791
Saxifraga cochlearis Rchb., 1832

Variabilité et affinité de l'habitat

Trois sous associations décrites :
- occidentale Quézel 1950. Variante appauvrie, étages supraméditerranéen et montagnard. Vallées du Var et de l'Ubaye.
- orientale Quézel 1950. Etage montagnard. Avec Micromeria marginata et Asperula hexaphylla.
- subalpinum Barbero 1969. Roya. Avec Phyteuma charmelii, et Asperula hexaphylla abondant.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:210	Balme calcaire mésoméditerranéenne à montagnarde à primevère d'Allioni et Moehringie à feuilles d'orpin	
Rattachement phytosociologique au niveau association Primuletum allionii Quézel & Rioux in Rioux & Quézel 1949		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951
CORINE biotope	62.13	Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins
Natura 2000	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8210-6	Encorbellements des falaises calcaires du Sud-Est
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Présence de deux espèces endémiques des Alpes maritimes franco-italiennes et protégées : Primula allionii, Moehringia sedoides.

Menaces
Les menaces les plus importantes pour la flore rupicole sont les purges de sécurisation des falaises suivies de la pose de grillages métalliques de protection.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
QUEZEL, 1949

Ecologie

Balmes et encorbellements formés dans les calcaires et cargneules du Muschelkalk à structure souvent vacuolaire, abrités de la pluie, en exposition intermédiaire ou sud. Optimum à l'étage supraméditerranéen, mais également présent dans le montagnard sous une forme appauvrie jusqu'à plus de 1500 m. d'altitude.

Cortège floristique
Campanula rotundifolia subsp. macrorhiza (J.Gay ex A.DC.) Bonnier & Layens, 1894
Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.
Moehringia sedoides (Pers.) Cumino ex Loisel., 1807
Parietaria judaica L., 1756
Primula allionii Loisel., 1809

Physionomie de l'habitat

Formation herbacée chasmophytique composée d'espèces spécialisées ornant les plafonds et parois de balmes, caractérisée par les coussinets de Primula allioni, accompagné de Moehringia sedoides, Parietaria judaica, Campanula rotundifolia subsp. macrorrhiza, et la mousse tufogène Eucladium verticillatum.

Dynamique de la végétation

Groupement stable.

Variabilité et affinité de l'habitat

- Variante appauvrie montagnarde avec seulement Moerhingia sedoides (Tende, vallon de Caramagne, Mont Chajol).

Etat de la connaissance

Bonne

Code:211	Falaise calcaire méso à supraméditerranéenne à potentille saxifrage	
Rattachement phytosociologique au niveau association Potentilletum saxifragae Rioux & Quézel 1949		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951
CORINE biotope	62.13	Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins
Natura 2000	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8210-7	Falaises calcaires mésoméditerranéennes à supraméditerranéennes du Sud-Est
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Mésoméditerranéen,Supraméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Plusieurs espèces endémiques des Alpes maritimes et ligures

Menaces
Purges de sécurisation des falaises suivies de la pose de grillages métalliques de protection. Pratique de l'escalade.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
QUEZEL, 1950

Ecologie

Parois calcaires des gorges et ravins soumis à une forte humidité atmosphérique. Optimum altitudinal vers 600 m.

Cortège floristique
Ballota frutescens (L.) J.Woods, 1850
Campanula rotundifolia subsp. macrorhiza (J.Gay ex A.DC.) Bonnier & Layens, 1894
Hypericum coris L., 1753
Potentilla saxifraga Ardoino ex De Not., 1848
Saxifraga cochlearis Rchb., 1832

Physionomie de l'habitat

Végétation chasmophytique caractérisée par l'abondance des coussinets de Potentilla saxifraga, accompagné par Ballota frutescens, Saxifraga cochlearis, Hypericum coris.

Variabilité et affinité de l'habitat

Variante (très rare) à Pinguicula longifolia subsp. reichenbachiana, occupant des bas de falaises soumis à des percolations.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:212	Falaise calcaire thermophile à ballote buissonnante	
Rattachement phytosociologique au niveau association Ballotetum frutescentis Quézel 1950		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951
CORINE biotope	62.13	Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins
Natura 2000	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8210-7	Falaises calcaires mésoméditerranéennes à supraméditerranéennes du Sud-Est
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Mésoméditerranéen,Supraméditerranéen

Répartition
Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Présence d'espèces endémiques et protégées

Menaces
Purges de sécurisation des falaises suivies de la pose de grillages métalliques de protection.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
QUEZEL, 1950

Ecologie

Gorges et falaises calcaires à basse et moyenne altitude, de 400 à 700 m. d'altitude, le plus souvent dans des expositions chaudes, mais toutefois soumises à une humidité atmosphérique assez importante.

Cortège floristique
Ballota frutescens (L.) J.Woods, 1850
Campanula rotundifolia subsp. macrorhiza (J.Gay ex A.DC.) Bonnier & Layens, 1894
Euphorbia spinosa L., 1753
Hesperis laciniata All., 1785
Hormathophylla halimifolia (Boiss.) P.KÃ¼pfer, 1974
Hypericum coris L., 1753
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, 2005

Physionomie de l'habitat

Végétation chasmophytique caractérisée par les tapis de Ballota frutescens enracinés dans la roche. Les espèces associées sont Hormathophylla halimifolia, Campanula rotundifolia subsp. macrorhiza, ainsi que des espèces thermophiles comme Euphorbia spinosa, Jacobaea maritima (=Senecio cineraria).

Variabilité et affinité de l'habitat

Le Ballotetum frutescentis présente comme unique caractéristique Ballota frutescens dans le territoire du PNM. Cependant cette espèce est également présente dans le Potentilletum saxifragae, association des gorges humides, dans des situations plus confinées et ombragées.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:213	Falaise calcaire supraméditerranéenne à saxifrage à feuilles en cuiller	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951
CORINE biotope	62.13	Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins
Natura 2000	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8210-7	Falaises calcaires mésoméditerranéennes à supraméditerranéennes du Sud-Est
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard
Répartition
Roya
Intérêt patrimonial
Fort. Présence d'espèces protégées : Saxifraga cochlearis, Primula marginata
Menaces
Peu menacé
Enjeu de conservation
Moyen
Bibliographie

Ecologie

Parois calcaires héliophiles exposées au sud ou en exposition intermédiaire, non en situation confinées. S'élève jusqu'à 1500 m. d'altitude.

Cortège floristique

Campanula rotundifolia subsp. macrorhiza (J.Gay ex A.DC.) Bonnier & Layens, 1894
Hypericum coris L., 1753
Primula marginata Curtis, 1792
Saxifraga callosa Sm., 1791
Saxifraga cochlearis Rchb., 1832

Physionomie de l'habitat

Végétation des fissures de paroi et de rochers calcaires dominée par Saxifraga cochlearis. Les espèces compagnes sont Saxifraga callosa, Primula marginata, Campanula macrorhiza, Hypericum coris

Variabilité et affinité de l'habitat

Ce groupement semble être une variante appauvrie du Potentilletum saxifragae, dans des stations moins confinées et s'élevant plus haut en altitude.

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:214	Falaise calcaire subalpine des Alpes ligures à siléne campanule et saxifrage fausse diapensie	
Rattachement phytosociologique au niveau association Silenetum campanulae Quézel 1950		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951
CORINE biotope	62.13	Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins
Natura 2000	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8210-8	Falaises calcaires supraméditerranéennes à subalpines du Sud-Est
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Très fort intérêt patrimonial, par la présence de nombreuses espèces endémiques et protégées.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
QUEZEL, 1950
BARBERO, 1969

Ecologie

Rochers et falaises calcaires de l'étage subalpin et la base de l'étage alpin, de 1800 à 2500 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Végétation des fissures de rochers calcaires, caractérisée par Silene campanula, Saxifraga diapensoides, Phyteuma cordatum

Cortège floristique
Bupleurum petraeum L., 1753
Helianthemum lunulatum (All.) DC., 1805
Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard, 1940
Micromeria marginata (Sm.) Chater, 1971
Phyteuma cordatum Balb., 1809
Primula marginata Curtis, 1792
Rhamnus pumila Turra, 1764
Saxifraga callosa Sm., 1791
Saxifraga diapensioides Bellardi, 1792
Silene campanula Pers., 1805

Variabilité et affinité de l'habitat

Deux variantes sont reconnaissables en fonction de l'exposition : variante d'adret avec Saxifraga diapensioides (Tende, Mont Chajol), Bupleurum petraeum, Rhamnus pumila ; variante d'ubac dominée par Silene campanula, Phyteuma cordatum, avec en outre Viola biflora, Cystopteris fragilis. Cette association remplace à l'étage subalpin des Alpes ligures le Phyteumo charmelii - Bupleuretum petraeae Lacoste 1975, répandu dans les hautes vallées du Var et de la Tinée.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:220	Falaise siliceuse subalpine d'adret à silene à feuilles en coeur et gaillet de Tende	
Rattachement phytosociologique au niveau association Silenetum cordifoliae Lacoste 1975 em. Focquet 1982		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Saxifragion pedemontanae Barbero & Bono 1967
CORINE biotope	62.23	Falaises siliceuses des Alpes sud-occidentales
Natura 2000	8220	Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8220-9	Falaises siliceuses subalpines à alpines des Alpes-Maritimes
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'espèces endémiques du massif de l'Argentera.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Fissures de rochers et falaises siliceux aux étages subalpin et alpin, en exposition chaude, jusqu'à 3000 m. d'altitude.

Cortège floristique
Androsace vandellii (Turra) Chiov., 1919
Galium tendae Rchb.f., 1855
Phyteuma globulariifolium subsp. pedemontanum (R.Schulz) Bech., 1956
Silene cordifolia All., 1785

Physionomie de l'habitat

Végétation chasmophytique au faible recouvrement caractérisée par Silene cordifolia et Galium tendae. Présence de communautés bryophytiques et lichéniques associées diversifiées.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:221	Falaise siliceuse subalpine à alpine d'ubac à saxifrage du piémont et saxifrage à fleurs nombreuses

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Saxifragetum pedemontanae Focquet 1982	Saxifragion pedemontanae Barbero & Bono 1967

CORINE biotope	62.23	Falaises siliceuses des Alpes sud-occidentales
Natura 2000	8220	Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8220-9	Falaises siliceuses subalpines à alpines des Alpes-Maritimes
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Alpin

Répartition
Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'espèces endémiques du massif de l'Argentera. Présence d'une espèce protégée DH2 : Saxifraga florulenta.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
FOCQUET, 1982

Ecologie

Falaises siliceuses alpines orientées au nord, de 2200 à 2900 m. d'altitude.

Cortège floristique
Gagea serotina (L.) Ker Gawl., 1816
Saxifraga bryoides L., 1753
Saxifraga florulenta Moretti, 1823
Saxifraga pedemontana All., 1785

Physionomie de l'habitat

Végétation chasmophytique au faible recouvrement, caractérisée par les rosettes de Saxifraga florulenta implantées dans les fissures de la roche, et par Saxifraga pedemontana. Nombreuses communautés bryophytiques et lichéniques diversifiées associées.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:225	Eboulis calcaire montagnard d'ubac frais à gymnocarpium herbe-à-Robert	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Scrophulurion juratensis Béguin ex Richard 1971
CORINE biotope	61.3123	Eboulis calcaires à Fougères
Natura 2000	8160	Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
Cahiers d'habitats	8160-3	Éboulis calcaires collinéens à montagnards ombragés, de la moitié est de la France
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	

Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Formation rare, uniquement connue de Tende (vallon de Caramagne).

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Eboulis calcaires frais des ubacs, à éléments moyens, en pied de falaise, à la partie supérieure de l'étage montagnard

Cortège floristique
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh., 1825
Festuca dimorpha Guss., 1826
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, 1851
Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799
Rumex scutatus L., 1753

Physionomie de l'habitat

Ce groupement rassemble des fougères, des plantes typiques des éboulis mais aussi de grandes herbes à larges feuilles que l'on peut également trouver dans les mégaphorbiaies montagnardes

Dynamique de la végétation

Cet habitat s'intègre à la série mésophile du pin sylvestre, faciès à pin à crochet

Etat de la connaissance

Faible

Code:226	Eboulis calcaire supraméditerranéen à montagnard frais à géranium à racine épaisse	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Scrophularion juratensis Béguin ex Richard 1971
CORINE biotope	61.3123	Eboulis calcaires à Fougères
Natura 2000	8160	Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
Cahiers d'habitats	8160-3	Éboulis calcaires collinéens à montagnards ombragés, de la moitié est de la France
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Geranium macrorrhizum qui est une espèce constante de ces éboulis est protégée au niveau régional .

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Formation d'éboulis se rencontrant dans les pentes rocheuses d'ubac de 700 à 1600 m d?altitude, en ambiance froide et humide.

Cortège floristique
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh., 1825
Geranium macrorrhizum L., 1753
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, 1851
Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799
Scrophularia canina subsp. juratensis (Schleich. ex Wydler) Bonnier & Layens, 1894

Physionomie de l'habitat

Eboulis calcaire à blocs de dimensions moyennes colonisé par Geranium macrorrhizum qui est souvent abondant, accompagné de plusieurs espèces de fougères.

Dynamique de la végétation

En phase de fixation, ce sont d'abord les pourtours des éboulis montagnards des ubacs frais qui sont lentement colonisés par des essences arbustives et forestières pionnières des tiliaies sèches du Tilion platyphylli telles que Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Laburnum alpinum, Tilia platyphyllos, Acer opalus

Etat de la connaissance

Faible

Code:5	Pelouse de dalle siliceuse montagnarde à crassulacées	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Sedo albi - Scleranthion biennis Br.-Bl. 1955
CORINE biotope	36.2	Communautés des affleurements et rochers désagrégés alpins
Natura 2000	8230	Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii
Cahiers d'habitats	8230-1	Pelouses pionnières montagnardes à subalpines des dalles siliceuses des Alpes et des Vosges
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Cians,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Présence fréquente d'une espèce protégée : Jovibarba allionii.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pelouses particulièrement répandues sur les affleurements de pélites rouges de l'étage montagnard, qui leur offrent un biotope ouvert et rocheux très favorable. Le sol est généralement très superficiel

Physionomie de l'habitat

Pelouse rase, souvent ouverte et écorchée, dominée par des espèces crassulescentes des genres Sempervivum, Sedum, Jovibarba. On y observe parfois un certain nombre d'espèces annuelles se développant dans les tonsures. La strate muscinale est généralement bien développée.

Cortège floristique
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Jovibarba globifera subsp. allionii (Jord. & Fourr.) J.Parn., 1990
Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell., 1907
Polytrichum juniperinum Hedw.
Polytrichum piliferum Hedw.
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.
Riccia ciliifera Link ex Lindenb.
Scleranthus perennis L., 1753
Sedum annuum L., 1753
Sempervivum arachnoideum L., 1753
Silene rupestris L., 1753
Trifolium arvense L., 1753
Veronica fruticans Jacq., 1762

Dynamique de la végétation

Les pelouses observées sur dalle rocheuse ou au sommet de rochers peuvent être considérées comme primaires et permanentes. Les grandes surfaces de Sedo - Scleranthion présentes sur pélites rouges résultent probablement de pratiques pastorales séculaires, et s'insèrent dans des séries dynamiques forestières de l'étage montagnard, bien que la colonisation par les ligneux soit très lente en apparence.

Variabilité et affinité de l'habitat

Habitat également présent ponctuellement sur des dalles rocheuses siliceuses cristallines (migmatites...) où il occupe généralement de petites surfaces, en mosaïque avec des pelouses du Nardion strictae ou du Festucion variae.

Etat de la connaissance

Faible. Association(s) à décrire.

Code:233	Eboulis siliceux subalpin thermophile à éléments moyens	
Rattachement phytosociologique au niveau association Saxifrago exaratae - Brassicetum montanae Lacoste 1975		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Senecionion leucophylli Br.-Bl. 1948
CORINE biotope	61.11	Eboulis siliceux alpins
Natura 2000	8110	Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Tinée,Vésubie

Intérêt patrimonial
Présence en Tinée d'une espèce rare ; Woodsia alpina

Menaces

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LACOSTE, 1975
VAN ES, 2003

Ecologie

Eboulis siliceux (gneiss et grès) thermophiles, se développant sur des pentes de 25 à 40°, de préférence exposées au sud, entre 1700 et 2200 m. d'altitude. Elements de taille variable, peu mouvants, recouvrant une couche inférieure de terre et de débris fins à dominante sableuse.

Cortège floristique
Achillea erba-rotta All., 1773
Cardamine resedifolia L., 1753
Coincya cheiranthos subsp. montana (DC.) Greuter & Burdet, 1983
Epilobium collinum C.C.Gmel., 1826
Poa nemoralis L., 1753
Saxifraga exarata Vill., 1779
Sedum annuum L., 1753
Senecio viscosus L., 1753
Viola valderia All., 1785
Woodsia alpina (Bolton) Gray, 1821

Physionomie de l'habitat

Végétation herbacée au recouvrement faible à moyen (15 à 30 %), caractérisé par Coincya cheiranthos subsp. montana, Saxifraga exarata, Sedum anuum et Woodsia alpina.

Dynamique de la végétation

Groupement pouvant évoluer lentement vers la pelouse écorchée subalpine du Festuco scabriculmis-Potentilletum valderiae.

Variabilité et affinité de l'habitat

Dans l'horizon supérieur de l'étage subalpin, vers 2200 m., le groupement s'enrichit en espèces de l'Androsacion alpinae : Adenostyles leucophylla, Doronicum clusii, caractéristiques des éboulis siliceux alpins.

Etat de la connaissance

Moyen

Code:23	Pelouse basophile subalpine thermophile à avoine de Parlatore, seslérie bleue, épervière tomenteuse

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Hieracio villosi - Avenetum montanae Barbero	Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926

CORINE biotope	36.43	Pelouses en gradins et en guirlandes
Natura 2000	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Pelouse originale, spécifique à la Roya.
Habitat d'espèce de Gentiana ligustica (DH2).

Menaces

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
BARBERO, 1972

Ecologie

Pentes calcaires exclusivement, à des expositions sud ou intermédiaires, de 1900 à 2200 m d'alt.

Physionomie de l'habitat

Pelouse écorchée, dominée par Helictotrichon parlatorei ou Sesleria caerulea, avec Hieracium tomentosum, Hieracium villosum, Gentiana ligustica, Iberis sempervirens.

Cortège floristique
Gentiana ligustica R.Vilm. & Chopinet, 1956
Helictotrichon parlatorei (J.Woods) Pilg., 1938
Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard, 1940
Hieracium tomentosum L., 1755
Hieracium villosum Jacq., 1762
Iberis sempervirens L., 1753
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763

Variabilité et affinité de l'habitat

- variante du subalpin inférieur avec des espèces thermophiles, et variante du subalpin supérieur
- faciès plus interne à Helictotrichon parlatorei
- faciès à Sesleria coerulea

Etat de la connaissance

Bonne.

Code:25	Pelouse subalpine en gradins à seslérie bleue et avoine des montagnes	
Rattachement phytosociologique au niveau association Seslerio caeruleae - Avenetum montanae (Lippmaa 1933) Guinochet 1938		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	36.43	Pelouses en gradins et en guirlandes
Natura 2000	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
Cahiers d'habitats	6170-7	Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur sols peu évolués
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Moyen

Menaces
Peu menacé, si ce n'est par le surpâturage ovin.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pentes calcaires raides rapidement déneigées, de 1700 m (en ubac) à 2400 m. Présent uniquement en adret à l'étage alpin.

Cortège floristique
Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub, 1970
Onobrychis viciifolia subsp. montana (DC.) Gams, 1924
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763

Physionomie de l'habitat

Pelouse le plus souvent ouverte, à aspect en gradins, alternant des bandes de végétation dominées par Sesleria caerulea, et des bandes de sol caillouteux nu. Recouvrement variable.

Dynamique de la végétation

Colonise les pierriers du Thlapsion rotundifolii.

Variabilité et affinité de l'habitat

- variante à Astragalus sempervirens (Alpes-de-Haute-provence)

Etat de la connaissance

Bonne

Code:27	Pelouse calcicole subalpine des vires et crêtes rocheuses à laîche des rochers	
Rattachement phytosociologique au niveau association Caricetum firmae Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & Jenny 1926 [fragmentaire]		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	36.433	Tapis de laîches en coussinets
Natura 2000	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
Cahiers d'habitats	6170-9	Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur lithosols
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Fort. Présence d'espèces protégées : Chamorchis alpina, Carex mucronata.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BARBERO & CHARPIN, 1970

Ecologie

Type de pelouse se rencontrant sur de faibles surfaces, généralement sur des vires rocheuses au sein de falaises calcaires, sur des dalles calcaires compactes ou au niveau de crêtes.

Cortège floristique
Carex mucronata All., 1785
Carex rupestris All., 1785
Chamorchis alpina (L.) Rich., 1817
Dryas octopetala L., 1753
Oxytropis neglecta Ten., 1831
Pedicularis rosea Wulfen, 1781
Saxifraga caesia L., 1753

Physionomie de l'habitat

Gazons ras dominés par Carex rupestris, avec Dryas octopetala, Pedicularis rosea, Oxytropis neglectus, Carex mucronata, Chamorchis alpina.

Variabilité et affinité de l'habitat

Forme appauvrie du Caricetum firmae des Alpes orientales.

Etat de la connaissance

moyenne

Code:29	Pelouse calcicole subalpine des crêtes et croupes rocheuses à androsace velue	
Rattachement phytosociologique au niveau association Androsaco villosae - Gentianetum angustifoliae Ritter 1969		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	36.43	Pelouses en gradins et en guirlandes
Natura 2000	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
Cahiers d'habitats	6170-9	Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur lithosols
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Var

Intérêt patrimonial
Groupement très rare dans le PNM. Présence d'une espèce rare : Androsace villosa.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Groupement thermophile, colonisant les crêtes rapidement déneigées, sur sol superficiel et rocheux, de 1835 à 2035 m d?altitude, sur calcaire dur du Trias.

Cortège floristique
Androsace villosa L., 1753
Anthyllis montana L., 1753
Carex humilis Leyss., 1758
Globularia cordifolia L., 1753
Leontopodium alpinum Cass., 1822
Serratula nudicaulis (L.) DC., 1805

Physionomie de l'habitat

Pelouse écorchée rase, à aspect de corbeilles fleuries, dominée par les coussinets de fleurs blanches de Androsace villosa, les tapis bleutés de Globularia cordifolia, et les tapis de fleurs rose de Anthyllis montana.

Etat de la connaissance

Moyenne.

Code:244	Pelouse basophile alpine en gradins à fétuque à quatre fleurs	
Rattachement phytosociologique au niveau association Festucetum quadriflorae (Braun-Blanquet 13) Beguin 1972		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Seslerion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & H. Jenny 1926
CORINE biotope	36.432	Pelouses à Avoine et Seslérie des Alpes méridionales
Natura 2000	6170	Pelouses calcaires alpines et subalpines
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye

Intérêt patrimonial
Habitat abritant de nombreuses espèces oligotrophes, espèces en régression dans le contexte actuel d'eutrophisation généralisée des milieux par les activités humaines.

Menaces
Habitat fragile, se développant dans un contexte micro-climatique très rude le rendant peu résiliant en cas de destruction ou altération. Globalement assez peu menacé à l'échelle du PN mais pouvant l'être localement par une pression de pâturage trop importante, notamment par temps pluvieux rendant plus fragile au piétinement la végétation et le sol, ou par l'établissement de lieux de chôme des troupeaux aux abords des crêtes.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BEGUIN C. (1972)
BENSETTITTI F., et al. (2002)
LAVAGNE A., ARCHILOQUE A., et al (1983)
VAN ES (2003)
VILLARET J.-C. (2006)

Ecologie

Pelouse pionnière se développant à l'étage alpin, sur de fortes pentes indifféremment exposées et situées à proximité de crêtes, balayées par les vents, à enneigement court et soumises à un microclimat rude, marqué par de fortes variations annuelles et journalières de température, sur des sols squelettiques édifiés sur substrats carbonatés.

Cortège floristique
Achillea nana L., 1753
Festuca quadriflora Honck., 1782
Festuca scabriculmis (Hack.) K.Richt., 1890
Galium megalospermum All., 1785

Physionomie de l'habitat

Végétation peu recouvrante (de l'ordre de 50%), atteignant environ 5 à 10 cm de haut et dominée par les hémicryptophytes poacées (graminées), en particulier Festuca quadriflora et Festuca scabriculmis ; développement des touffes de ces espèces en alignements perpendiculaires à la pente, appelés festons ou guirlandes, séparés les uns des autres par des surfaces terreuses presque entièrement dépourvues de végétation, au niveau desquelles peuvent se maintenir des espèces d'éboulis à éléments fins (Achillea nana, Galium megalospermum, Leontodon montanus).

Dynamique de la végétation

Habitat se développant le plus souvent dans des conditions micro-climatiques rudes et ne présentant pas de signe particulier d'évolution.

Variabilité et affinité de l'habitat

Variante établie aux expositions les plus froides marquées par la présence d'espèces chionophile comme Festuca violacea.

Etat de la connaissance

Bonne pour la partie 04.

Code:26	Pelouse mésophile supraméditerranéenne à montagnarde à seslérie bleue des vires et pentes rocheuses calcaires d'ubac	
Rattachement phytosociologique au niveau association		Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Fritillario involucratae - Seslerietum coeruleae var. elegantissima (Molinier 1934) Barbero, Loisel & Quézel 1972		Seslerion bielzii (Vanden Berghen 1963) Barbero, Loisel & Quézel 1972
CORINE biotope	36.431	Versants à Seslérie et Laîches sempervirentes
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Fort intérêt patrimonial, par le caractère de refuge de cet habitat dans les Préalpes de Menton pour certaines espèces protégées comme Gentiana ligustica, Rhaponticoides alpina (=Centaurea alpina).

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BARBERO, LOISEL & QUEZEL, 1972

Ecologie

Vires et pentes rocheuses de calcaire compact exposées au nord, de 600 m. jusqu'à 1500 m. d'altitude environ, souvent en contexte sylvatique (pinède de pin sylvestre, ostryaie de pente).

Physionomie de l'habitat

Pelouses mésophiles de faibles dimensions généralement, dominées par Sesleria coerulea, avec Carex ferruginea subsp. tenax, Teucrium lucidum, Fritillaria involucrata, Solidago virgaurea, Crepis albida, Buphthalmum salicifolium, Rosa pimpinellifolia, Hiercaium rionii (=Hieracium bifidum auct.).

Cortège floristique
Buphthalmum salicifolium L., 1753
Carex ferruginea subsp. tenax (H.Christ) K.Richt., 1890
Crepis albida Vill., 1779
Fritillaria involucrata All., 1789
Gentiana ligustica R.Vilm. & Chopinet, 1956
Hieracium rionii Gremli, 1883
Phyteuma orbiculare L., 1753
Plantago argentea Chaix, 1785
Rhaponticoides alpina (L.) M.V.Agab. & Greuter, 2003
Rosa pimpinellifolia L., 1759
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763
Solidago virgaurea L., 1753
Teucrium lucidum L., 1759

Variabilité et affinité de l'habitat

Groupement pouvant se trouver sous une strate arborée de pin sylvestre, où le caractère sciaphile et mésophile s'accentue avec l'apparition d'espèces sylvatiques comme Anemone hepatica, Euphorbia dulcis.

Etat de la connaissance

Faible. Connaissance insuffisante de l'association sur le territoire du PNM et dans les Alpes-Maritimes. Relevés phytosociologiques nécessaires.

Code:70	Ourlet nitrophile annuel de pied de falaise à herbe de Sainte-Sophie, brome des toits	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Sisymbrion officinalis Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950
CORINE biotope	87.2	Zones rudérales
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Cians

Intérêt patrimonial
Habitat rare dans le PNM.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Corniches et pied de falaises thermophiles, parcourues par des animaux sauvages ou domestiques, riches en déjections.

Cortège floristique
Bromus tectorum L., 1753
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891
Hordeum murinum L., 1753

Physionomie de l'habitat

Groupement de friche nitrophile composé d'espèces annuelles et bisannuelles, dominé par Descurainia sophia.

Dynamique de la végétation

Groupement stable.

Etat de la connaissance

Faible

Code:223	Eboulis calcaire supraméditerranéen à montagnard à calamagrostide argentée	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Stipion calamagrostis Jenny-Lips ex Quantin 1932
CORINE biotope	61.311	Eboulis à Stipa calamagrostis
Natura 2000	8130	Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Cahiers d'habitats	8130-1	Éboulis calcaires et calcaro-marneux des Préalpes du Sud et de Bourgogne
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Var,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial

Menaces

Enjeu de conservation

Bibliographie

Ecologie

Eboulis calcaires à éléments grossiers et moyens, à toutes les expositions, de 400 à 1300 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Végétation clairsemée dominée par les touffes de la graminée Achnatherum calamagrostis, avec Laserptium gallicum, Centranthus angustifolius, Cephalaria leucantha, Galeopsis reuteri, Scrophularia provincialis, Iberis linifolia.

Cortège floristique
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812
Centranthus angustifolius (Mill.) DC., 1805
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818
Epilobium dodonaei Vill. subsp. dodonaei
Galeopsis reuteri Rchb.f., 1858
Iberis linifolia L., 1759
Laserpitium gallicum L., 1753
Rumex scutatus L., 1753
Saponaria ocymoides L., 1753
Scrophularia provincialis Rouy, 1909
Teucrium lucidum L., 1759

Variabilité et affinité de l'habitat

variante d'ubac caractérisée par une présence plus constante de Teucrium lucidum et Rumex scutatus

Code:224	Eboulis supraméditerranéen à montagnard thermophile à centranthe à feuilles étroites	
Rattachement phytosociologique au niveau association Achnathero calamagrostis - Centranthetum angustifolii Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Roussine & Nègre, 1952		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Stipion calamagrostis Jenny-Lips ex Quantin 1932
CORINE biotope	61.311	Eboulis à Stipa calamagrostis
Natura 2000	8130	Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Cahiers d'habitats	8130-1	Éboulis calcaires et calcaro-marneux des Préalpes du Sud et de Bourgogne
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard,Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée,Vésubie

Intérêt patrimonial
Habitat abritant des espèces endémiques et dans la partie orientale du PN une espèce protégée avec Molopospermum peloponnesiacum.

Menaces

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LACOSTE, 1975
VAN ES, 2003

Ecologie

Pierriers éboulis calcaires riches en éléments grossiers, en exposition chaude, de 1300 m. à 2000 m. d'altitude, sur des pentes de 30 à 40 °.

Cortège floristique
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812
Centranthus angustifolius (Mill.) DC., 1805
Epilobium dodonaei Vill. subsp. dodonaei
Festuca dimorpha Guss., 1826
Laserpitium gallicum L., 1753
Nepeta nepetella L., 1759

Physionomie de l'habitat

Végétation clairsemée colonisant les éboulis calcaires, dominée par les graminées Achnatherum calamagrostis et Festuca dimorpha, et caractérisé en outre par Centranthus angustifolius, Nepeta nepetella.

Dynamique de la végétation

Après fixation de l'éboulis, évolution possible vers des habitats de pelouses comme celles à Helictotrichon sempervirens ou Festuca dimorpha. Evolution possible à terme vers des pinèdes, notamment de Pinus uncinata

Variabilité et affinité de l'habitat

Confusion avec les formes de l'association de plus basse altitude, où Centranthus angustifolius se raréfie, et enrichie en espèces plus méditerranéennes.

Etat de la connaissance

Sous-association Festucetosum dimorphae définie dans la Tinée

Code:228	Eboulis calcaire subalpin à alpin à éléments fins et roubine à bérardie laineuse	
Rattachement phytosociologique au niveau association Berardio subacaulis - Brassicetum repandae Guinochet 1938		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Thlaspion rotundifolii Jenny 1930
CORINE biotope	61.2322	Eboulis à Berardia
Natura 2000	8120	Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)
Cahiers d'habitats	8120-3	Éboulis calcaires subalpins à alpins à éléments fins des Alpes
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Var,Tinée

Intérêt patrimonial
Intérêt fort

Menaces
Aménagements dans les stations de ski d'altitude

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
VAN ES, 2003

Ecologie

Eboulis calcaires à éléments fins, roubines marneuses xérophiles, entre 2200 et 2500 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Végétation au faible recouvrement, dominée par des hémicryptophytes à rosettes étroitement appliquées au substrat mouvant.

Cortège floristique
Achillea nana L., 1753
Berardia subacaulis Vill., 1779
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. repanda
Campanula alpestris All., 1773
Leontodon hispidus subsp. hyoseroides (Welw. ex Rchb.) Gremli, 1885
Leontodon montanus Lam., 1779
Minuartia rupestris (Scop.) Schinz & Thell., 1907
Ranunculus seguieri Vill., 1779
Valeriana saliunca All., 1785

Variabilité et affinité de l'habitat

Enrte 2000 m. et 2200 m. d'altitude, on observe des formes de passages entre cette association et le Petasitetum paradoxi athamantetosum, d'optimum subalpin

Etat de la connaissance

Bonne

Code:229	Eboulis calcaire subalpin à alpin à éléments moyens à tabouret à feuillles rondes	
Rattachement phytosociologique au niveau association Thlaspeetum rotundifolii Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & Jenny 1926 austro-occidentale		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Thlaspeetum rotundifolii Jenny 1928
CORINE biotope	61.2	Eboulis calcaires alpiens
Natura 2000	8120	Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)
Cahiers d'habitats	8120-2	Éboulis calcaires subalpins à alpins à éléments moyens des Alpes
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Subalpin,Alpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Tinée,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Intérêt fort, par la présence d'espèces endémiques (Heracleum pumilum, Iberis aurosica, Allium narcissiflorum).

Menaces
Parcours des troupeaux ovins.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
VAN ES, 2003

Ecologie

Pentes d'éboulis calcaires mouvant, à éléments grossiers à moyens, aux étages subalpin supérieur et alpin, de 2000 m. jusqu'à 2700 m. d'altitude, à toutes les expositions.

Physionomie de l'habitat

Végétation au très faible recouvrement, caractérisée par Noccaea rotundifolia, Doronicum grandiflorum, Viola cenisia, Crepis pygmaea.

Dynamique de la végétation

Habitat le plus souvent permanent en raison des apports constants de nouveaux matériaux rajeunissant l?éboulis (chutes de pierres) ; dans les situations rendant possible l?accumulation d?éléments fins et la fixation de l?éboulis (faible pente et faible apport d?éléments), évolution très lente vers des pelouses alpines.

Cortège floristique
Allium narcissiflorum Vill., 1779
Cerastium latifolium L., 1753
Crepis pygmaea L., 1753
Doronicum grandiflorum Lam., 1786
Galium megalospermum All., 1785
Heracleum pumilum Vill., 1779
Iberis aurosica Chaix, 1785
Linaria alpina (L.) Mill., 1768
Noccaea rotundifolia (L.) Moench subsp. rotundifolia
Petrocallis pyrenaica (L.) R.Br., 1812
Poa cenisia All., 1789
Saussurea alpina subsp. depressa (Gren.) Gremli, 1878
Trisetum distichophyllum (Vill.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., 1817
Viola cenisia L., 1763

Variabilité et affinité de l'habitat

Variante des sols cryoturbés à Ranunculus glacialis se développant sur des replats, au niveau desquels la cryoturbation tient le rôle habituellement joué par la gravité dans la mise en mouvement des éléments ; présence d?espèces des pelouses de combe à neige de l?Arabidion caeruleae, avec Arabis caerulea et Saxifraga androsacea.

Etat de la connaissance

Bonne

Code:142	Frênaie-érablaie de ravin supraméditerranéenne	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Tilio platyphylli - Acerion pseudoplatani Klika 1955
CORINE biotope	41.43	Forêts de pente alpiennes et péri-alpiennes
Natura 2000	9180	Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Var

Intérêt patrimonial
Habitat d'espèce pour Buxbaumia viridis qui se développe sur des troncs pourrissants de Pinus sylvestris tombés au fond du vallon depuis les versants surplombants.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
OFFERHAUS B., 2009

Ecologie

Talweg de vallon encaissé, sol calcaire profond, ambiance fraîche, de 800 à 1100 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Forêt de ravin structurée par des essences arborées nomades : Fraxinus excelsior, Acer opalus, Tilia platyphyllos, Populus tremula, Sorbus aria. La strate arbustive est dominée par Buxus sempervirens et Corylus avellana.
La strate herbacée est composée d'espèces neutrophiles : Primula vulgaris, Hepatica nobilis, Geranium nodosum, Aegopodium podagraria, Mercurialis perennis, Carex digitata, Melica nutans, Mycelis muralis, Listera ovata, Aquilegia atrata, Cephalanthera longifolia, Equisetum arvense, Melittis melissophyllum, Prenanthes purpurea, Poa nemoralis, Dactylorhiza fuschii, Astrantia major.

Cortège floristique
Acer opalus Mill., 1768
Aegopodium podagraria L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Carex digitata L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Geranium nodosum L., 1753
Hepatica nobilis Schreb., 1771
Melica nutans L., 1753
Mercurialis perennis L., 1753
Primula vulgaris Huds., 1762
Tilia platyphyllos Scop., 1771

Dynamique de la végétation

Climax stationnel.

Etat de la connaissance

Faible

Code:143	Forêt de ravin montagnarde à barbe de bouc	
Rattachement phytosociologique au niveau association Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani Moor 1952		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Tilio platyphylli - Acerion pseudoplatani Klika 1955
CORINE biotope	41.43	Forêts de pente alpiennes et péri-alpiennes
Natura 2000	9180	Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Cians,Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'espèces protégées : Asperula taurina, Lathraea squamaria, Polystichum setiferum.

Menaces
Dégradations due à l'exploitation sylvicole des forêts de sapin

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Ravins et vallons en pentes raides exposés au nord à l'étage montagnard, sur éboulis fins mêlés de terre argileuse, sur substrat calcaire, pélites rouges et flysch. Strate herbacée composée d'un cortège d'espèces mésophiles et méso-hygrophiles de mull forestier et mésophiles de mull eutrophe.

Physionomie de l'habitat

Forêt dont la strate arborescente présente un recouvrement variable, composée d'essences nomades : Acer pseudoplatanus, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior. Strate herbacée fournie et diversifiée, avec Aruncus dioicus, Stellaria nemorum, Adoxa moschatellina, Polygonatum multiflorum, Milium effusum etc.

Cortège floristique
Acer pseudoplatanus L., 1753
Adoxa moschatellina L., 1753
Aruncus dioicus (Walter) Fernald, 1939
Asperula taurina L., 1753
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, 1769
Fraxinus excelsior L., 1753
Milium effusum L., 1753
Petasites albus (L.) Gaertn., 1791
Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785
Ranunculus lanuginosus L., 1753
Stellaria nemorum L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771
Ulmus glabra Huds., 1762

Etat de la connaissance

Faible dans le département des Alpes-Maritimes

Code:144	Erablaie-tiliaie à scolopendre et lunaire vivace	
Rattachement phytosociologique au niveau association Phyllitido scolopendri - Aceretum pseudoplatani Moor 1945		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Tilio platyphylli - Acerion pseudoplatani Klika 1955
CORINE biotope	41.4	Forêts mixtes de pentes et ravins
Natura 2000	9180	Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Les forêts de ravin sont un habitat d'espèce pour la mousse Buxbaumia viridis qui croît sur les troncs pourrissants de conifères (troncs provenant des arbres alentour qui chutent dans le fond du ravin). L'atmosphère humide qui règne dans ces forêts est également propice à la présence de l'amphibien endémique Hydromantes strinatii.
Plusieurs plantes protégées se rencontrent dans cet habitat : Phyllitis scolopendrium (protection régionale), Polystichum setiferum (protection régionale).

Menaces
Peu menacé, cet habitats se localisant dans des stations difficiles d'accès.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
OFFERHAUS B., FRACHON C., 2009

Ecologie

Bas de versants et fonds de vallons encaissés, souvent sur éboulis grossiers, sur substrat calcaire. Aambiance hygrosciaphile, de 550 à 1500 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

La strate arborescente est caractérisée par Ulmus glabra, Acer opalus, Acer pseudoplatanus, Tilia platyphyllos.
La strate arbustive comprend Buxus sempervirens, Euonymus latifolius, Taxus baccata, Sambucus nigra, Corylus avellana.
La strate herbacée, mésohygrophile, est caractérisée par un groupement à dentaires (Cardamine heptaphylla, Cardamine pentaphyllos), Phyllitis scolopendrium, et Lunaria rediviva, accompagnés de Actaea spicata, Polystichum setiferum, Polystichum aculeatum, Festuca altissima, Geranium nodosum, Oxalis acetosella, Petasites albus, Melica uniflora.
Les rochers et parois présents au sein de cette forêt de ravin sont occupés par des groupements à base de fougères du Cystoperidion fragilis.

Cortège floristique
Acer opalus Mill., 1768
Acer pseudoplatanus L., 1753
Actaea spicata L., 1753
Asplenium scolopendrium L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, 1769
Corylus avellana L., 1753
Lunaria rediviva L., 1753
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799
Tilia platyphyllos Scop., 1771
Ulmus glabra Huds., 1762

Dynamique de la végétation

Climax stationnel.

Etat de la connaissance

Faible dans le département des Alpes-Maritimes

Code:145	Tiliaie hygrosciaphile à buis et ruscus hypoglosse	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Tilio platyphylli - Acerion pseudoplatani Klika 1955
CORINE biotope	41.43	Forêts de pente alpiennes et péri-alpiennes
Natura 2000	9180	Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Très fort. Habitat uniquement présent en france dans la vallée de la Bendola. Présence d'une espèce (Ruscus hypoglossum) très rare en France, ainsi que des lichens foliicoles de répartition océanique à subtropicale.

Menaces

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
KOSIR & al., 2008
OFFERHAUS et al., 2007

Ecologie

Canyon calcaire, dans les parties les plus encaissées où règne une hygrométrie très élevée et des températures douces en hiver. Entre 450 et 550 m d'altitude, sur des pentes calcaires très raides. Ambiance sombre et très humide.

Cortège floristique
Aruncus dioicus (Walter) Fernald, 1939
Buxus sempervirens L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Cornus mas L., 1753
Euonymus latifolius (L.) Mill., 1768
Ilex aquifolium L., 1753
Lunaria rediviva L., 1753
Ostrya carpinifolia Scop., 1772
Ruscus hypoglossum L.
Tilia cordata Mill., 1768

Physionomie de l'habitat

La strate arborescente est structurée par Tilia cordata et Ostrya carpinifolia. La strate arbustive est riche en buis (Buxus sempervirens) qui constitue des fourrés intraforestiers très denses, accompagné de Corylus avellana, Evonymus latifolius, Cornus mas, Ilex aquifolium. La strate herbacée est marquée par l'abondance de Ruscus hypoglossum, accompagné par diverses espèces montagnardes mésohygrophiles.

Dynamique de la végétation

Formation stable (climax stationnel), bloquée dans son évolution vers le climax climatique (ostryaie supraméditerranéenne).

Variabilité et affinité de l'habitat

Ce type de forêt de ravin présente des affinités floristiques fortes avec des formations similaires décrites dans les montagnes du sud-est de l'Europe (Apennin et Balkans) et du sud des Alpes centrales, et se rattache à une sous-alliance du Tilio-Acerion récemment décrite, propre à ces régions : l'Ostryo carpinifoliae - Tilienion platyphyllii.

Etat de la connaissance

Faible

Code:141	Tiliaie sèche à buis sur pente rocheuse ou éboulis calcaire

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	Tilion platyphylli Moor 1973

CORINE biotope	41.45	Forêts thermophiles alpiennes et péri-alpiennes mixtes de Tilleuls
Natura 2000	9180	Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire prioritaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen,Montagnard

Répartition
Var,Cians,Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'une espèce protégée : Geranium macrorrhizum.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
OFFERHAUS B., FRACHON C., 2009

Ecologie

Bordures stabilisées de grands éboulis calcaires, ravins et pentes rocheuses calcaires ou de pélites rouges, généralement en exposition nord, aux étages supraméditerranéen et à la base de l'étage montagnard, de 600 m. à 1300 m. d'altitude.

Cortège floristique
Acer opalus Mill., 1768
Buxus sempervirens L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Rhamnus alpina L., 1753
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763
Tilia platyphyllos Scop., 1771

Physionomie de l'habitat

Formation arborescente constituée par de petits boisements développés sur de faibles surfaces linéaires, dominée par Tilia platyphyllos, accompagné dans la strate arborescente de Sorbus aria, Acer opalus, Laburnum alpinum. La strate arbustive est dominée par Corylus avellana ou Buxus sempervirens, avec Viburnum lantana, Rhamnus alpina, Lonicera xylosteum, Amelanchier ovalis, Sorbus aucuparia. La strate herbacée se développe sur un tapis de bryophytes colonisant les blocs rocheux calcaires, avec Geranium macrorrhizum (en Roya), Teucrium lucidum, Festuca dimorpha, Saxifraga cuneifolia, Geranium nodosum, Rubus saxatilis, Polystichum lonchitis, Moehringia muscosa, Orthilia secunda, Festuca heterophylla.

Dynamique de la végétation

Formation stable (climax stationnel), bloquée dans son évolution vers le climax climatique (ostryaie, sapinière).

Etat de la connaissance

Faible

Code:15	Prairie montagnarde d'adret à siléne fleur de Jupiter et fétuque méditerranéenne	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. & Tüxen ex Marschall 1947
CORINE biotope	38.3	Prairies de fauche de montagne
Natura 2000	6520	Prairies de fauche de montagne
Cahiers d'habitats	6520-4	Prairies fauchées montagnardes et subalpines des Alpes et du Jura
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Groupement original et localisé.

Menaces
Surpâturage et piétinement par le passage des troupeaux de bovins dans le vallon de Caramagne

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Pentes faibles, en adret ou en exposition intermédiaire, sur substrat siliceux, à l'étage montagnard et la base du subalpin.

Physionomie de l'habitat

Prairie structurée par Silene flos-jovis et Festuca marginata subsp. laevis.

Dynamique de la végétation

Evolution de ces prairies vers des pineraies de pin sylvestre, de pin à crochet, ou des mélézeins.

Cortège floristique
Dianthus carthusianorum subsp. atrorubens (All.) Hegi, 1910
Festuca marginata subsp. laevis (Hack.) Jauzein & J.M.Tison, 2010
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell., 1913
Festuca pratensis subsp. apennina (De Not.) Hegi, 1908
Malva moschata L., 1753
Persicaria bistorta (L.) Samp., 1913
Phyteuma betonicifolium Vill., 1785
Silene flos-jovis (L.) Greuter & Burdet, 1982
Veronica chamaedrys L., 1753

Variabilité et affinité de l'habitat

type de prairie assez original par sa composition floristique, présentant un caractère mixte des syntaxons suivants : Meo athamantici - Trisetetum flavescentis, Mesobromenion erecti et Hypochaerido uniflorae - Festucetum paniculatae.

Etat de la connaissance

Faible.

Code:16	Prairie montagnarde mésohydrique à trolle d'Europe, bistorte, et géranium des bois

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
Meo athamantici - Trisetetum flavescentis Lacoste 1975	Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. & Tüxen ex Marschall 1947

CORINE biotope	38.3	Prairies de fauche de montagne
Natura 2000	6520	Prairies de fauche de montagne
Cahiers d'habitats	6520-4	Prairies fauchées montagnardes et subalpines des Alpes et du Jura
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
Présence d'espèces rares : Traunsteneira globosa.

Menaces
Surpâturage, abandon de la fauche.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
LACOSTE, 1975

Ecologie

Prairies mésohydriques à mésohygrophiles se développant sur des replats, des combes ou pentes douces entre 1500 et 2000 m. d'altitude, sur des sols profonds issus aussi bien de substrat calcaire que siliceux.

Physionomie de l'habitat

Prairie dominée par Trollius europaeus, Persicaria bistorta, avec Meum athamanticum, Geranium sylvaticum, pâturée ou fauchée.

Cortège floristique
Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937
Crepis pontana Dalla Torre, 1882
Festuca pratensis subsp. apennina (De Not.) Hegi, 1908
Geranium sylvaticum L., 1753
Meum athamanticum Jacq., 1776
Persicaria bistorta (L.) Samp., 1913
Phleum alpinum subsp. rhaeticum Humphries, 1978
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Trollius europaeus L., 1753
Veratrum album subsp. lobelianum (Bernh.) K.Richt., 1890

Variabilité et affinité de l'habitat

- variante sans Meum athamanticum

Etat de la connaissance

Moyenne (variabilité de l'association sur le territoire du PNM à étudier).

Code:216	Paroi montagnarde à subalpine sciaphile moussue à asplenium vert et cystoptéris fragile	
Rattachement phytosociologique au niveau association Asplenio viridis - Cystopteridetum fragilis Oberdorfer (1936) 1949		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Violo biflorae - Cystopteridion alpinae F. Casas 1970
CORINE biotope	62.152	Falaises calcaires médio-européennes à Fougères
Natura 2000	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8210-17	Falaises calcaires montagnardes à subalpines riches en mousses et en fougères, des Alpes et du Jura
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Verdon,Ubaye,Var,Cians,Tinée,Vésubie,Bevera,Roya

Intérêt patrimonial
A préciser

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Blocs et parois rocheuses calcaires ou de pélites, froids et humides, ombragés, dans les sapinières et pessières-sapinières. Ses exigences vis à vis de l'hygrométrie en font une association typiquement intraforestière, bien qu'on puisse la rencontrer également à l'étage subalpin en situation asylvatique dans des couloirs rocheux et à la base de parois exposées au nord.

Cortège floristique
Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah.
Asplenium viride Huds., 1762
Bartramia halleriana Hedw.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.
Neckera crispa Hedw.
Plagiopus oederianus (Sw.) H.A.Crum & L.E.Anderson

Physionomie de l'habitat

Communauté caractérisée par les fougères Cystopteris fragilis et Asplenium viride, accompagnés par plusieurs groupements bryophytiques ou bryolichéniques, se développant à la surface de la roche ou dans les fentes humifères des rochers.


Dynamique de la végétation

En relation avec les groupements bryo-lichéniques associés.

Etat de la connaissance

Bien connu ; connaissances à poursuivre pour la partie 04.

Code:217	Microphorbiaie à violette à deux fleurs et saxifrage à feuilles rondes	
Rattachement phytosociologique au niveau association Saxifrago rotundifoliae - Violetum biflorae de Foucault & Delpech 1985		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Violo biflorae - Cystopteridion alpinae F. Casas 1970
CORINE biotope	62.152	Falaises calcaires médio-européennes à Fougères
Natura 2000	8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Cahiers d'habitats	8210-17	Falaises calcaires montagnardes à subalpines riches en mousses et en fougères, des Alpes et du Jura
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Cians,Roya

Intérêt patrimonial
Groupement original, abritant des espèces protégées : Chrysosplenium alternifolium, Sedum fragrans.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
FOUCAULT (DE), DELPECH, 1985

Ecologie

Base ombragée exiguë et humide de parois calcaires ou de quartzite, anfractuosités, niches et petits couloirs rocheux confinés, souvent situés près d'une source d'humidité (suintement, cascade).

Cortège floristique
Arabis alpina L., 1753
Chrysosplenium alternifolium L., 1753
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805
Imperatoria ostruthium L., 1753
Minuartia villarii (Balb.) Wilczek & Chenevard, 1912
Petasites albus (L.) Gaertn., 1791
Saxifraga rotundifolia L., 1753
Silene pusilla Waldst. & Kit., 1812
Veronica urticifolia Jacq., 1773
Viola biflora L., 1753

Physionomie de l'habitat

Groupement composé d'espèces de petites tailles à limbe feuillé orbiculaire, comme Viola biflora et Saxifraga rotundifolia. Ces espèces sont souvent accompagnées par des plantes de mégaphorbiaies montagnardes à subalpines représentées par des individus à vitalité réduite, dont l'exiguïté des stations empêche le développement optimal.

Dynamique de la végétation

Groupement stable.

Variabilité et affinité de l'habitat

Une variante intéressante de ce groupement a été observée avec Sedum fragrans, dans des stations protégées des écoulements par un surplomb rocheux.

Etat de la connaissance

Habitat méconnu

Code:154	Tiliaie - châtaigneraie mésophile, faciès à châtaignier

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance

CORINE biotope	41.9	Bois de Châtaigniers
Natura 2000	9260	Forêts de Castanea sativa
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Forêt floristiquement diversifiée avec de nombreuses essences arborées et un riche sous-bois herbacé.

Menaces
Exploitation sylvicole (niveau de menace faible, difficultés d'accès).

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BARBERO et al., 1977

Ecologie

Pentes d'ubac sur pélite, de 650 à 1050 m. d'altitude, sol relativement profond et frais.

Physionomie de l'habitat

Forêt mélangée, où le châtaignier est spontané et est accompagné de Tilia platyphyllos, Quercus pubescens, Acer opalus, Sorbus aria.
La strate arbustive est dominée par Buxus sempervirens, avec Corylus avellana, Ilex aquifolium. Le sous bois herbacé comprend notamment Geranium nodosum, Melica uniflora, Primula vulgaris, Hepatica nobilis, Euphorbia dulcis, Hedera helix, Salvia glutinosa.

Cortège floristique
Acer opalus Mill., 1768
Buxus sempervirens L., 1753
Castanea sativa Mill., 1768
Corylus avellana L., 1753
Geranium nodosum L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Melica uniflora Retz., 1779
Primula vulgaris Huds., 1762
Quercus pubescens Willd., 1805
Salvia glutinosa L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771

Dynamique de la végétation

Série du charme (étage collinéen de type médioeuropéen) d'après la carte de végétation des Alpes, feuille de Castellane (BARBERO et al., 1977).

Etat de la connaissance

Faible

Code:155	Tiliaie - châtaigneraie mésophile, faciès à tilleul à grande feuilles

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance

CORINE biotope	41.G	Bois de Tilleuls
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Diversité floristique élevée des essences arborées et du sous-bois herbacé.
Présence d'une espèce végétale protégée dans le sous-bois herbacé : Lathraea squamaria (protection régionale)

Menaces
Exploitation sylvicole

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
BARBERO et al., 1977

Ecologie

Bas de versant au bord de ruisseaux, fonds de vallon, sur replats ou pente modérée, sol profond sur pélites, ambiance fraîche et humide, de 650 à 1200 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Strate arborescente dominée par Tilia platyphyllos accompagné de Prunus avium, Acer opalus, Betula pendula, Sorbus aria, Sorbus aucuparia.
Strate arbustive dominée par Buxus sempervirens et Corylus avellana avec Cornus sanguinea, Fraxinus excelsior...
Sous-bois herbacé neutrophile riche avec Geranium nodosum, Salvia glutinosa, Aegopodium podagraria, Oxalis acetosella, Lathraea squamaria, Polystichum aculeatum, Hepatica nobilis, Listera ovata, Mycelis muralis, Melica uniflora, Carex digitata, Cardamine impatiens, Euphorbia dulcis, Tamis communis, Mercurialis perennis, Paris quadrifolia, Alliaria petiolata, Lilium martagon, Primula vulgaris,...

Cortège floristique
Acer opalus Mill., 1768
Aegopodium podagraria L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Geranium nodosum L., 1753
Lathraea squamaria L., 1753
Listera ovata (L.) R.Br., 1813
Mercurialis perennis L., 1753
Paris quadrifolia L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Salvia glutinosa L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771

Dynamique de la végétation

Série du charme (étage collinéen de type médioeuropéen) d'après la carte de végétation des Alpes, feuille de Castellane (BARBERO et al., 1977).

Etat de la connaissance

Faible

Code:163	Pineraie de pin sylvestre supraméditerranéenne acidocline à bruyère arborescente, buis	
Rattachement phytosociologique au niveau association		Rattachement phytosociologique au niveau alliance
CORINE biotope	42.591	Forêts péri-alpines à Buis de Pins sylvestres
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Habitat original de pinède sylvestre acidophile

Menaces
Faibles

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Pentes fortes d'ubac, de 600 à 1200 m. d'altitude, sur substrat non calcaire (pélites), sur sol peu profond, ambiance mésoxérophile à mésohydrique.

Physionomie de l'habitat

Forêt de pin sylvestre accompagnée de Betula pendula, Acer opalus, Sorbus aria, Quercus pubescens, introgressé par Quercus petraea.
La strate arbustive est dominée par Erica arborea et Buxus sempervirens, avec Hippocrepis emerus, Cotinus coggygria, Prunus mahaleb, Amelanchier ovalis, Cytisophyllum sessilifolium.

Dynamique de la végétation

Série occidentale du chêne pubescent, sous-série normale (variante sur silice).

Cortège floristique
Acer opalus Mill., 1768
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Betula pendula Roth, 1788
Buxus sempervirens L., 1753
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Erica arborea L., 1753
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
Pinus sylvestris L., 1753
Quercus pubescens Willd., 1805
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

Etat de la connaissance

Pinède non décrite au niveau de l'association phytosociologique

Code:175	Pineraie de pin à crochet montagnarde sur silice à myrtille

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance

CORINE biotope	42.41	Forêts de Pins de montagne à Rhododendron ferrugineux
Natura 2000	9430	Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Var

Intérêt patrimonial
Les pinèdes de pin à crochet de la forêt communale de Péone peuvent être considérés comme des peuplements subnaturels (pas d'exploitation forestière depuis plus de 60 ans). Habitat potentiel pour le Tétras-lyre (annexe I de la Directive Oiseaux).

Menaces
Faibles (pas d'exploitation forestière programmée dans le dernier aménagement forestier de 1992).

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
OFFERHAUS, 2009

Ecologie

Pentes d'ubac sur grès d'Annot, de 1650 à 2000 m. d'altitude. Sol moyennement profond, ambiance mésophile.

Cortège floristique
Androsace adfinis Biroli, 1820
Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836
Larix decidua Mill., 1768
Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, 1936
Pinus sylvestris L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Vaccinium myrtillus L., 1753

Physionomie de l'habitat

Forêt de pin à crochet dominant, accompagné du mélèze et du pin sylvestre, avec un sous-bois dominé par la myrtille, avec Rubus idaeus, Antennaria dioïca, Androsace adfinis, Deschampsia flexuosa.


Variabilité et affinité de l'habitat

Affinité avec la pinède de pin à crochet silicicole à rhododendron, observée en Roya.

Etat de la connaissance

Faible

Code:191	Forêt de mélèze et de sapin du subalpin inférieur à sous-bois de hautes herbes	
Rattachement phytosociologique au niveau association Groupement à Larix decidua, Geranium sylvaticum et Chaerophyllum hirsutum		Rattachement phytosociologique au niveau alliance Sandoz & Barbero 1974
CORINE biotope	42.3	Forêts de Mélèzes et d'Arolles
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Var,Vésubie,Roya

Intérêt patrimonial
Diversité floristique du sous-bois herbacé.

Menaces
Surpâturage bovin.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie
LAVAGNE, 1964
SANDOZ & BARBERO, 1974

Ecologie

Pentes douces d'ubac, de 1350 à 2000 m. d'altitude, sur substrat calcaire, sol profond et humide, ambiance mésohygrophile.

Physionomie de l'habitat

Mélézein au sous-bois luxuriant, riche en hautes herbes mésohygrophiles, se rencontrant à la frange supérieure de l'étage montagnard, et à la base du subalpin. Srate herbacée riche en espèces de mégaphorbiaies : Chaerophyllum villarsii, Rumex arifolius, Polygonatum verticillatum, Senecio ovatus (parfois très dominant), Geranium sylvaticum, Veratrum lobelianum, Imperatoria ostruthium, Achillea macrophylla, et en espèces de sous-bois : Stellaria nemorum, Rubus idaeus, Hieracium prenanthoides, Ranunculus aduncus,Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Adoxa moschatellina, Dryopteris expansa.

Dynamique de la végétation

Ce mélézein résulte souvent de la transformation des prés-bois du Triseto-Polygonion (SANDOZ & BARBERO, 1974). Cet habitat englobe des mélézeins montagnards à rattacher à la série de la hêtraie-sapinière (observés entre 1400 et 1600 m), et d'autres plus alticoles (1400-1800 m) se rapportant à la série subalpine du sapin ou à la série subalpine de l'épicéa.

Cortège floristique
Aconitum lycoctonum L., 1753
Chaerophyllum hirsutum L., 1753
Geranium sylvaticum L., 1753
Larix decidua Mill., 1768
Myosotis sylvatica Hoffm., 1791
Rumex arifolius All., 1773
Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803
Veratrum album subsp. lobelianum (Bernh.) K.Richt., 1890

Etat de la connaissance

Moyenne

Code:72	Friche nitrophile montagnarde de pied de falaise à lamier du Mont Gargano et népéta petit népéta	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance A préciser
CORINE biotope	87.1	Terrains en friche
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
A préciser.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Faible

Bibliographie

Ecologie

Pied des falaises calcaires montagnardes, en adret, fréquentées activement par les troupeaux sauvages et domestiques (chamois, chèvres) et enrichi en azote par leurs déjections.

Physionomie de l'habitat

Friche composée de Lamium garganicum subsp. longiflorum, Nepeta nepetella, Calamintha nepeta, Carduus nigrescens.

Cortège floristique
Antirrhinum latifolium Mill., 1768
Bromus tectorum L., 1753
Carduus nigrescens Vill., 1779
Carduus nutans L., 1753
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891
Lamium garganicum subsp. longiflorum (Ten.) KerguÃ©len, 1987
Nepeta nepetella L., 1759
Papaver dubium L., 1753
Verbascum thapsus L., 1753

Etat de la connaissance

Une seule observation : falaise du Mont Chajol (Tende)

Code:82	Mégaphorbiaie subalpine eutrophe à myrrhis odorant et céphalaire alpine	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance A préciser
CORINE biotope	37.81	Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes
Natura 2000	6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Cahiers d'habitats	6430-8	Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines des Alpes, du Jura, des Vosges et du Massif central
Statut	Intérêt communautaire	

Etages de végétation
Subalpin

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Cephalaria alpina et Anthriscus nitida, espèces patrimoniales très rares dans les Alpes-maritimes.

Menaces
Habitat ponctuel, localisé près des points d'eau et sensible au piétinement.

Enjeu de conservation
Fort

Bibliographie

Ecologie

Sources, bords des ruisseaux, pentes d'ubac dans des clairières de mélézein ou d'essences pionnières, sur sol calcaire humide et eutrophe, de 1500 à 1700 m. d'altitude.

Physionomie de l'habitat

Il s'agit d'un groupement de hautes herbes, à caractère nitrophile. Il est caractérisé par l'abondance de l'ombellifère aromatique Myrrhis odorata et de la grande Cephalaria alpina, accompagnés de Senecio ovatus, Cirsium erisithales, Chaerophyllum hirsutum s.l., Rubus idaeus, Rosa villosa, Rumex arifolius, Epilobium angustifolium, Achillea macrophylla, Pimpinella major, Anthriscus nitida, Astrantia major, Chaerophyllum aureum, Heracleum sphondylium, Crepis pyrenaica, Veratrum lobelianum, Geum urbanum, Phyteuma ovatum, Urtica dioica, Rosa pimpinellifolia, Valeriana officinalis, Polygonatum verticillatum, Dactylis glomerata?

Dynamique de la végétation

Série subalpine du sapin.

Cortège floristique
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl., 1864
Cephalaria alpina (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818
Chaerophyllum aureum L., 1762
Chaerophyllum hirsutum L., 1753
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop., 1769
Epilobium angustifolium L., 1753
Epilobium angustifolium L., 1753
Myrrhis odorata (L.) Scop., 1771
Rumex arifolius All., 1773
Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803

Etat de la connaissance

Peu connu. Habitat non décrit au niveau association phytosociologique.

Code:115	Fruticée supraméditerranéenne à cornouiller rouge, prunellier, églantiers	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance A préciser
CORINE biotope	31.89	Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens sud-occidentaux
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée,Bevera

Intérêt patrimonial
A préciser. Habitat d'espèce pour Eriogaster catax (papillon protégé : annexe IV directive Habitats).

Menaces
Pas de données.

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Restanques de cultures à l'abandon, pâturages embroussaillés. Groupement héliophile, mésoxérophile à mésophile.

Physionomie de l'habitat

Fruticée arbustive composée d'espèces caducifoliées. Plusieurs faciès possibles en fonction de la dominance de l'espèce structurante. Présence constante de Cornus sanguinea, avec Prunus spinosa, Rosa canina, Rosa agrestis, Rubus ulmifolius, Ligustrum vulgare, Prunus mahaleb, Lonicera etrusca. Présence en mosaïque avec un ourlet mésoxérophile du Geranion sanguinei.

Dynamique de la végétation

Evolue vers une forêt de chêne pubescent, pin sylvestre ou charme-houblon.

Cortège floristique
Cornus sanguinea L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
Ligustrum vulgare L., 1753
Lonicera etrusca Santi, 1795
Prunus mahaleb L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Rosa agrestis Savi, 1798
Rosa canina L., 1753
Rubus ulmifolius Schott, 1818

Etat de la connaissance

Moyen

Code:137	Charmaie à charme-houblon, charme, ail des ours	
Rattachement phytosociologique au niveau association A préciser		Rattachement phytosociologique au niveau alliance A préciser
CORINE biotope	41.28	Chênaies-charmaies sud-alpines
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation

Répartition
Roya

Intérêt patrimonial
Habitat original très riche floristiquement et hébergeant des espèces végétales rares et patrimoniales : Carpinus betulus, Tilia cordata, Allium ursinum, Hyacinthoides italica.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Bas de versant, bordure de cours d'eau, immédiatement en retrait du liseré de ripisylve à aulne glutineux et frêne commun, sur des sols alluvionnaires profonds.

Physionomie de l'habitat

Elle se caractérise par la présence dans la strate arborescente de Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Acer opalus. La strate arbustive est dominée par Corylus avellana et Buxus sempervirens. La strate herbacée est riche en espèces neutrophiles : Allium ursinum, Salvia glutinosa, Aruncus dioicus...

Dynamique de la végétation

Liée aux crues du cours d'eau.

Etat de la connaissance

Faible

Cortège floristique

Allium ursinum L., 1753
Aruncus dioicus (Walter) Fernald, 1939
Buxus sempervirens L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Doronicum pardalianches L., 1753
Hyacinthoides italica (L.) Rothm., 1944
Ostrya carpinifolia Scop., 1772
Salvia glutinosa L., 1753
Tilia cordata Mill., 1768

Code:152	Couloir d'avalanche à cytise des Alpes, sorbier des oiseleurs et érable sycomore	
Rattachement phytosociologique au niveau association A définir		Rattachement phytosociologique au niveau alliance A préciser

CORINE biotope	31.872	Clairières à couvert arbustif
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Ubaye,Tinée,Vésubie

Intérêt patrimonial
Strate herbacée floristiquement riche semblable à celle des forêts de ravin.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Couloirs d'avalanche d'ubac soumis à une érosion active, substrat grossier de gros blocs calcaires ou siliceux mêlés à de la terre intersticielle, ambiance fraîche et humide, de 1000 à 1800 m d'altitude.
Ces couloirs d'avalanche sont présents, à l'ubac, soit en pied de parois soit sur fortes pentes dans les massifs forestiers (pessières-sapinières, mélézeins).

Cortège floristique
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aconitum lycoctonum L., 1753
Calamintha grandiflora (L.) Moench, 1794
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835
Lamium garganicum subsp. longiflorum (Ten.) KerguÃ©len, 1987
Orthotrichum rogeri Brid.
Rubus idaeus L., 1753
Salix caprea L., 1753
Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763
Sorbus aucuparia L., 1753

Physionomie de l'habitat

Strate arborescente constituée d'essences nomades comme pour les forêts de ravin mais souvent fragmentaire avec présence seulement d'une à deux espèces : Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos.
La strate arbustive est presque toujours présente avec Laburnum alpinum, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Salix caprea.

Dynamique de la végétation

Climax stationnel bloqué dans son évolution progressive vers la pessière-sapinière ou le mélézein.

Etat de la connaissance

Faible

Code:183	Pessière-mélézein d'ubac, calcicole, du montagnard supérieur

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	A préciser

CORINE biotope	42.2 x 42.322	
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	

Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Cians,Tinée

Intérêt patrimonial
Habitat d'espèce pour Buxbaumia viridis, mousse de l'annexe II de la Directive Habitats.

Menaces
Exploitation forestière

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pentes d'ubac, de 1500 à 2000 m. d'altitude, sur substrat calcaire, sol profond, ambiance sciaphile et mésohygrophile.

Physionomie de l'habitat

Boisements pionniers de Larix decidua mêlé à Picea abies qui remplace à la frange supérieur de l'étage montagnard, la sapinière montagnarde calcicole méridionale à trochiscanthe nodiflore (Trochiscantho nodiflori - Abietetum albae Br.-Bl. 1961).

Strate arbustive comprenant Corylus avellana, Buxus sempervirens, Laburnum alpinum, Lonicera xylosteum, Viburnum lantana, Ribes alpinum.

Strate herbacée riche en espèces neutrophiles : Geranium nodosum, Aegopodium podagraria, Paris quadrifolia, Euphorbia dulcis, Fragaria vesca, Hepatica nobilis, Mycelis muralis, Mercurialis perennis, Melittis melissophyllum, Helleborus foetidus, Campanula trachelium, Veronica urticifolia.

Cortège floristique
Anemone hepatica L., 1753
Euphorbia dulcis L., 1753
Geranium nodosum L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Larix decidua Mill., 1768
Melittis melissophyllum L., 1753
Mercurialis perennis L., 1753
Paris quadrifolia L., 1753
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Veronica urticifolia Jacq., 1773

Dynamique de la végétation

Série de la pessière-sapinière, sous-série calcicole.

Etat de la connaissance

Faible

Code:192	Forêt de mélèze du subalpin inférieur à renoncule à fruits crochus et myosotis des bois

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	A préciser

CORINE biotope	42.3	Forêts de Mélèzes et d'Arolles
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard,Subalpin

Répartition
Var,Tinée

Intérêt patrimonial
A préciser

Menaces
Faibles

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Pentes d'ubac, de 1500 à 2100 m d'altitude, sur substrat calcaire, sol profond, ambiance sciaphile et mésophile.

Cortège floristique
Larix decidua Mill., 1768
Myosotis sylvatica Hoffm., 1791
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Poa nemoralis L., 1753
Ranunculus aduncus Gren., 1847
Rubus idaeus L., 1753
Urtica dioica L., 1753

Physionomie de l'habitat

Mélézein clairiéré du montagnard supérieur et de la base de l'étage subalpin, caractérisé par un sous-bois herbacé dense dominé par Ranunculus aduncus et Myosotis sylvatica, accompagnés par Rubus idaeus, Urtica dioica, Achillea millefolium, Adenostyles alpina, Galium aparine, Mycelis muralis, Moehringia trinervia, Helleborus foetidus, Fragaria vesca, Geum urbanum, Aster bellidiastrum, Poa alpina, Poa nemoralis, Poa pratensis, Phleum serotinum subsp. serotinum...

Dynamique de la végétation

Mélézein pionnier de reconquête des espaces pastoraux. A rattacher à la série subalpine de l'épicea.

Etat de la connaissance

Faible

Code:200	Mélézein acidophile montagnard à sous-bois graminéen

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A définir	A préciser

CORINE biotope	42.3	Forêts de Mélèzes et d'Arolles
Natura 2000		
Cahiers d'habitats		
Statut	Non d'intérêt communautaire	



Etages de végétation
Montagnard

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Type forestier rare et méconnu. Présence d'une espèce endémique des Alpes sud-occidentales : Luzula pedemontana.

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie
LAVAGNE, 1964
OFFERHAUS, 2011

Ecologie

Pentes nord et nord-est à l'étage montagnard, entre 1200 et 1800 m. d'altitude, sur substrat siliceux.

Cortège floristique
Castanea sativa Mill., 1768
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836
Festuca flavescens Bellardi, 1792
Larix decidua Mill., 1768
Luzula nivea (L.) DC., 1805
Luzula pedemontana Boiss. & Reut., 1852
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Quercus petraea Liebl., 1784

Physionomie de l'habitat

Forêt largement dominée par le mélèze dans la strate arborescente, accompagné par Picea abies, Castanea sativa, Betula pendula, Prunus avium, Sorbus aucuparia, Quercus petraea. Le sous-bois herbacé est caractérisé par le développement d'un tapis graminéen dense composé de plusieurs espèces dont Festuca flavescens, Deschampsia flexuosa, Luzula nivea, Luzula pedemontana.

Dynamique de la végétation

Ce groupement vraisemblablement de cause anthropique a dû se mettre en place suite à un épisode de surpâturage ayant provoqué une érosion importante des sols sur ce versant, favorable à une colonisation active du mélèze depuis les massifs environnants qui a supplanté le pin sylvestre. Un phénomène analogue a été décrit dans l'Ubaye par LAVAGNE (1964), sur substrat calcaire (forêts de mélèze "per descensum"). Sous une apparente homogénéité floristique, ce type forestier est transitoire et recouvre en réalité plusieurs potentialités forestières. Dans la frange basse située dans le montagnard inférieur on peut présumer une évolution vers un peuplement climacique mixte à base de feuillus. La frange supérieure du mélézein située dans le montagnard moyen et supérieur a une potentialité de pessière-sapinière. Actuellement, seul l'épicéa arrive à coloniser le mélézein, les jeunes sapins étant consommés par les troupeaux de cerfs. Dans les cas les plus évolués, on peut observer localement un peuplement mixte de mélèzes et d'épicéas adultes.

Variabilité et affinité de l'habitat

Code:230	Eboulis siliceux supraméditerranéen thermophile à notholaène de Maranta

Rattachement phytosociologique au niveau association	Rattachement phytosociologique au niveau alliance
A préciser	A préciser

CORINE biotope	61.3	Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles
Natura 2000	8130	Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Cahiers d'habitats		
Statut	Intérêt communautaire	



Etages de végétation
Supraméditerranéen

Répartition
Tinée

Intérêt patrimonial
Habitat très rare, abritant une espèce protégée, Notholaena marantae

Menaces
Peu menacé

Enjeu de conservation
Moyen

Bibliographie

Ecologie

Eboulis siliceux (migmatites), xérophiles, en exposition chaude, àl'étage supraméditerranéen, à éléments grossiers, peu mouvants

Cortège floristique
Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing, 1994

Physionomie de l'habitat

Végétation composée presque exclusivement par la fougère Paragymnopteris marantae (=Notholaena marantae).

Etat de la connaissance

Faible