

RUQ


**Höger övre buk** · fri vätska?

Läge: midaxillärt vid nedre revbenen, längs revbensrummet. **Markör:** kranialt.

Sök: Morisons ficka, leverspetsen och ovan diafragma. Svep genom hela levern.

- Vätska = svart stråk med skarpa hörn mellan organen.

LUQ

**Vänster övre buk**

Läge: bakre axillarlinjen, högre än till höger, knogarna mot britsen. **Markör:** kranialt.

Sök: under diafragma först, sedan kring hela mjälten och splenorenalt.

- Vätskefylld ventrikel misstas för vätska: gå mer dorsalt.

BÄCKEN

**Bäcken** · suprapubiskt

Läge: ovanför symfyssen. Tvärsnitt hittar blåsan, sagittalt (markör kranialt) bedömer, svep i sidled.

Sök: bakom och ovanför blåsan: fossa Douglasi (kvinna), ovan prostata (man). Fylld blåsa pressar vätskan lateralt.


- Minska gain bakom blåsan. Sädesblåsor är normal anatomi. Lite vätska i fossa Douglasi kan vara fysiologiskt.

Inte alltid blod: ascites, cysta, dialysvätska. Koagel är ekogent.

Ultraljud utesluter inte fri vätska eller blödning: upprepa vid förändring, fördröj inte akut åtgärd eller DT.

Trauma (eFAST): lägg till subkostal hjärtvy och båda lungorna, se hjärt- och lungkorten.

HITTA




Gallblåsa längsaxel · sten? kolecystit?

Läge: under höger arcus eller interkostalt, levern som fönster. Vänster sidoläge eller djup inandning hjälper.

Markör: kranialt. Svep hela gallblåsan, vrid 90° och svep igen. Visa fundus och hals.

- Normalt: tunn vägg ≤ 3 mm, svart galla, cirka $7-8 \times 2-3$ cm.

STEN




Gallsten

Ekogen med akustisk skugga. Rörlig: vänd patienten. Sten i halsen missas lätt.

Utan skugga: sludge lagrar sig i botten, polyp sitter fast i väggen.

Stenfylld gallblåsa liknar tarm: vägg, eko, skugga (WES). Tarmgas ger "smutsig" skugga. Sten utan symtom: ingen åtgärd.

KOLECYSTIT



Kolecystit?

Talar för: sten (ofta i halsen), **vägg >3 mm**, perikolecystisk vätska, **sonografiskt Murphy** = maxömheter över gallblåsan. Alla behövs inte; väg in klinik och prover.

Mät framväggen vinkelrätt i välfylld blåsa (orange). Normalt ≤ 3 mm. Tjock vägg är ospecifik: hjärtsvikt, ascites, hepatit, tömd blåsa.

Normal bild utesluter inte tidig kolecystit: upprepa eller radiologiskt ultraljud. Gallgångar och ikterus ingår inte: radiologiskt ultraljud. Ej bedömbart vy är inte normal.