

Liposic® Eye Gel

(Carbomer 2mg/g)

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

Thành phần hoạt chất: Mỗi tuýp 10g gel tra mắt chứa 20mg carbomer.

Thành phần tá dược: cetrimide, sorbitol, triglyceride chuỗi trung bình, sodium hydroxide (điều chỉnh pH), nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHẾ

Gel tra mắt.

Mô tả: Gel tra mắt màu trắng, đục, có độ nhớt cao.

CHỈ ĐỊNH

Liposic® Eye Gel dùng thay thế nước mắt trong các trường hợp tiết nước mắt không đủ và điều trị triệu chứng cho bệnh khô mắt.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

Liều dùng

Việc điều trị các tình trạng khô mắt cần có phác đồ liều riêng phù hợp từng cá nhân. Tùy theo mức độ nghiêm trọng và cường độ của triệu chứng, tra một giọt vào mắt ở vị trí túi kết mạc 3 đến 5 lần một ngày; và khoảng 30 phút trước khi đi ngủ (trừ trường hợp có nguy cơ bị dính mi mắt), hoặc tra khi nào thấy cần thiết để duy trì đủ độ trơn cho mắt.

Cách dùng:

Thuốc dùng tra mắt.


Nhìn chung, nên xin tư vấn của bác sĩ nhãn khoa khi điều trị viêm kết-giác mạc khô, bệnh này thường phải điều trị lâu dài hoặc vĩnh viễn.

Kích thước giọt thuốc phù hợp nhất khi tuýp thuốc được để ở vị trí dựng thẳng ở phía trên mắt trong suốt quá trình tra mắt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Rửa tay trước khi tra thuốc.
- Ngồi trước gương để có thể quan sát động tác của bạn.
- Lau mắt để làm sạch dịch hoặc nước sót lại.
- Vặn nắp khỏi tuýp thuốc và kiểm tra xem vòi tuýp có sạch không.
- Giữ tuýp thuốc thẳng đứng và vòi tuýp hướng xuống dưới. Động tác này cho phép gel tạo thành một giọt nhỏ, dễ dàng rơi xuống từ miệng tuýp (xem hình 1-2)
- Ngửa đầu ra phía sau và dùng ngón tay trở kéo nhẹ mi mắt dưới xuống. Care thận tra một giọt vào trong mi mắt dưới (xem hình 2).
- Care thận để miệng tuýp không bị chạm vào mắt hay ngón tay.
- Cố gắng mở mắt và đảo mắt để gel phân bố đều.
- Bỏ tay khỏi mi mắt dưới và chớp mắt vài lần để chắc chắn mắt được bao phủ bởi gel.

- Lặp lại (nếu cần) thao tác đối với bên mắt còn lại.
- Khi đã hoàn thành, vận nắp lại vào tuýp.



CHÔNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với hoạt chất hoặc bất kỳ tá dược nào được liệt kê trong mục Thành phần công thức thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Kính áp tròng phải được tháo ra trước khi dùng thuốc, và đeo lại sau 30 phút kể từ khi tra Liposic® Eye Gel. Liposic® Eye Gel có thể kéo dài thời gian tiếp xúc của các thuốc nhãn khoa dùng tại chỗ. Nên nhỏ các thuốc nhỏ mắt dùng đồng thời 15 phút trước khi tra Liposic® Eye Gel (xem mục Tương tác, tương kỵ thuốc).

Nếu các triệu chứng của khô mắt vẫn tiếp tục hoặc nặng hơn, nên dùng điều trị và xin tư vấn của chuyên gia nhãn khoa.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa có nghiên cứu nào được thực hiện.

Phụ nữ có thai

Không có dữ liệu về việc sử dụng carbomer ở phụ nữ có thai. Nghiên cứu trên động vật không trực tiếp chỉ ra độc tính trên sinh sản (xem mục Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng). Như là biện pháp phòng ngừa, tốt hơn nên tránh sử dụng Liposic® Eye Gel trong quá trình mang thai.

Phụ nữ cho con bú

Chưa biết carbomer và các chất chuyển hóa có được tiết vào sữa mẹ hay không. Không thể loại trừ nguy cơ trên trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Quyết định có nên ngừng cho con bú hoặc ngừng/không dùng Liposic® Eye Gel cần được cân nhắc dựa trên lợi ích của việc bú sữa mẹ đối với trẻ nhỏ và lợi ích của thuốc đối với người mẹ.

Khả năng sinh sản

Chưa có nghiên cứu nào được thực hiện.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Liposic® Eye Gel có mức ảnh hưởng trung bình đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Khi sử dụng như chỉ định, thuốc này có thể gây suy giảm tầm nhìn trong khoảng 5 phút do sự hình thành các vệt sau khi tra gel, bệnh nhân nên thận trọng khi điều khiển phương tiện hoặc vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỶ THUỐC

Không có nghiên cứu về tương tác nào được thực hiện.

Liposic® Eye Gel có thể kéo dài thời gian tiếp xúc của các thuốc nhãn khoa dùng tại chỗ. Nên nhỏ các thuốc nhỏ mắt dùng đồng thời 15 phút trước khi tra Liposic® Eye Gel.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Các tác dụng không mong muốn dưới đây được báo cáo là các rối loạn về mắt, với tần xuất rất hiếm gặp ($< 1/10000$):

- Nóng mắt, đỏ mắt, eczema mí mắt, cộm mắt, viêm giác mạc nhú không lồ, ngứa mắt, cảm giác dính mắt, viêm giác mạc chấm nông (SPK), chảy nước mắt, nhìn mờ.

Những phản ứng này có thể xảy ra hoặc do chất bảo quản có trong thuốc (cetrimide) hoặc do các phản ứng không dung nạp với một trong những thành phần khác.

Nhìn mờ có thể xảy ra sau khi tra Liposic® Eye Gel do chế phẩm có độ nhớt cao. Trong các nghiên cứu lâm sàng với Liposic® Eye Gel, chỉ có một phản ứng phụ tại chỗ trên mắt không nghiêm trọng được báo cáo dưới dạng một quan sát đơn lẻ (nóng mắt)

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không có trường hợp quá liều nào được báo cáo. Nếu việc quá liều xảy ra, cần theo dõi sát sao để có biện pháp xử lý kịp thời.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ, LÂM SÀNG

Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý: nước mắt nhân tạo và các chế phẩm khác, mã ATC: S01XA20.

Liposic® Eye Gel có nền tảng là một polymer thân nước có phân tử lượng cao. pH và độ thẩm thấu của thuốc là tương tự với màng phim nước mắt bình thường. Nhờ các đặc tính vật lý, gel tra mắt gắn với nước và hình thành một màng phim trong, trơn và ẩm trên bề mặt của mắt. Cấu trúc của gel bị phá hủy bởi các muối chứa trong nước mắt và tạo ra độ ẩm. Một nghiên cứu ở 54 bệnh nhân bị viêm kết-giác mạc khô cho thấy liệu pháp dùng Liposic® Eye Gel kéo dài thời gian vỡ màng phim nước mắt (TBUT-tear break-up time) từ mức trung bình 5,3 giây đến 11,2 giây sau 6 tuần. Giá trị xét nghiệm Schirmer I tăng từ mức trung bình 4,8 mm đến 10,7 mm sau 6 tuần.

Đặc tính dược động học

Hiện không sẵn có nghiên cứu đối chứng về dược động học trên động vật cũng như con người sử dụng sản phẩm này. Tuy nhiên, sự hấp thu hoặc tích lũy ở mô mắt có thể bị loại bỏ do carbomer có phân tử lượng lớn. Các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện với sản phẩm tương tự cho thấy rằng thời gian lưu trên mắt được cho là lên tới 90 phút.

Nhóm đối tượng trẻ em: Không có dữ liệu sẵn có.

Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy không có bất kỳ một nguy cơ đặc biệt nào đối với con người dựa trên các nghiên cứu thông thường về an toàn dược học, độc tính liều nhắc lại, độc tính trên gen, khả năng gây ung thư, độc tính trên sinh sản.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 tuýp 10g gel.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng tuýp thuốc sau 28 ngày kể từ lần đầu mở nắp.

PTE. L
0174G
#04-01
38)
5) 6338 86

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC

Tiêu chuẩn cơ sở

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA NHÀ SẢN XUẤT

Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Đức

Biểu tượng ®/™ thể hiện nhãn hiệu được bảo hộ bởi công ty Bausch & Lomb Incorporated hoặc các chi nhánh.

© Bausch & Lomb Incorporated.

.TD.

Liposic[®] Eye Gel

(Carbomer 2 mg/g)

Please read the package insert carefully before use

Keep out of reach of children

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

Active ingredients: Each 10 g of eye gel contains 20 mg of carbomer.

List of excipients: Cetrimide, Sorbitol, Medium-chain triglycerides, Sodium hydroxide (for pH adjustment), Purified water

PHARMACEUTICAL FORM

Eye gel.

Description: White, turbid, highly viscous, gel

INDICATIONS

Liposic eye gel is a substitute for tear fluid for use in case of inadequate tear production and for symptomatic treatment of "dry eye" conditions

POSODOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION

Posology

Therapy of dry eye conditions requires an individual dosage regimen.

According to the severity and intensity of the symptoms, instill one drop into the conjunctival sac 3-5 times daily; and approximately 30 minutes before going to bed (otherwise there is a risk of sticky eyelids).

Method of administration


Ocular use.

Generally, an ophthalmologist should be consulted when treating keratoconjunctivitis sicca, which normally turns out to be long-term or permanent therapy.

An appropriate drop size is obtained when the tube is held in a vertical position above the eye during instillation.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Wash your hands before using your gel
- Sit down in front of a mirror so that you can see what you are doing
- Wipe your eyes to clear any residual wateriness or discharge
- Unscrew the cap from the tube and check the nozzle is clean
- Hold the tube in an upright position with the nozzle pointing down. This allows a small drop to form, which falls easily from the tip of the nozzle (see pictures 1 – 2).
- Tilt your head back and gently pull down your lower eyelid with one index finger. Carefully, place one drop inside the lower eyelid (see picture 2)
- Take care not to touch the nozzle tip with your eye or fingers
- Try to keep your eye open and to move it so that the liquid is distributed evenly
- Release the lower eyelid, and blink a few times to make sure the eye is covered by the gel
- Repeat (if required) the procedure for your other eye
- When you have finished, put the cap back on the tube



CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

SPECIAL WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE

Contact lenses should be removed prior to administration, and may be inserted again 30 minutes after Liposic Eye Gel has been instilled. Liposic Eye Gel may prolong the contact-time of topically applied drugs in ophthalmology. Concomitant ocular medication should be administered 15 minutes prior to instillation of Liposic Eye Gel (see section Interaction with other medicinal products and other forms of interaction).

If the symptoms of the dry eye continue or worsen, treatment should be stopped and an ophthalmologist should be consulted.

FERTILITY, PREGNANCY AND LACTATION

No studies have been performed.

Pregnancy

There are no data from the use of carbomer in pregnant women.

Animal studies do not indicate direct to reproductive toxicity (see section 3.3).

As a precautionary measure it is preferable to avoid the use of Liposic Eye Gel during pregnancy.

Breastfeeding

It is unknown whether Carbomer/metabolite are excreted in human milk.

A risk to the newborns/infants cannot be excluded.

A decision must be made whether to discontinue breast-feeding or to discontinue/abstain from Liposic Eye Gel therapy taking into account the benefit of breast feeding for the child and the benefit of therapy for the woman.

Fertility

No studies have been performed.

EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND USE MACHINES

Liposic Eye Gel has moderate influence on the ability to drive and use machines.

When used as indicated, this medicinal product may impair visual acuity for about five minutes due to the formation of streaks after gel application, and patients should exercise caution when driving vehicles or operating machinery.

INTERACTIONS WITH OTHER MEDICINAL PRODUCTS AND OTHER FORMS OF INTERACTION

No interaction studies have been performed.

Liposic Eye Gel may prolong the contact-time of topically applied drugs in ophthalmology. Concomitant ocular medication should be administered 15 minutes prior to instillation of Liposic Eye Gel

UNDESIRABLE EFFECTS

The following adverse effects have been reported as eye disorders, with a frequency of very rare (<1/10,000):

burning eyes, eye redness, eyelid eczema, foreign body sensation in eyes, giant papillary conjunctivitis, itching eyes, sticky eye sensation, superficial punctate keratitis, tearful eyes, vision blurred

These reactions could have either occurred due to the preservative contained (cetrimide) or as intolerance reactions to one of the other ingredients.

Blurred vision can occur after instillation of Liposic Eye Gel due to the high viscosity of the preparation. In clinical studies with Liposic Eye Gel only one non-serious topical ocular adverse reaction was recorded as a single observation (burning eyes).

OVERDOSE AND TREATMENT

No case of overdose has been reported.

If overdose is happened, please closely monitor to have immediately solution.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: artificial tears and other indifferent preparations ATC code S01XA20.

Liposic Eye Gel is based on a high molecular weight hydrophilic polymer. Its pH and osmolality are similar to those of the normal tear film. Due to its physical properties, the eye gel binds water and forms a translucent lubricating and wetting film on the surface of the eye. The gel structure is destroyed by the salts contained in the lacrimal fluid and releases moisture. A study in 54 patients with keratoconjunctivitis sicca found that Liposic Eye Gel therapy prolonged tear break-up time from a mean of 5.3 seconds to 11.2 seconds after 6 weeks. Schirmer I-test values were increased from a mean of 4.8 mm to 10.7 mm after 6 weeks.

Pharmacokinetic properties

No controlled animal nor human pharmacokinetic studies with this product are available. However, absorption or accumulation in eye tissues can presumably be excluded due to the high molecular weight of carbomer. Clinical studies performed with an essentially similar product have shown that ocular residence time can be assumed to be approximately up to 90 minutes.

Paediatric population: No data available.

Preclinical safety data

Non-clinical data reveal no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, repeated dose toxicity, genotoxicity, carcinogenic potential, toxicity to reproduction.

PACKAGE SIZE

Box of 1 tube of 10 g gel.

STORAGE

Do not store above 30°C

SHELF-LIFE

36 months from manufacturing date

Discard after 28 days from first opening

MA PTE
86001740
ET, #04-
34138)
(: (65) 633

SPECIFICATION OF FINISH PRODUCT

In-house specification

NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER:

Dr. Gerhard Mann Chem.- Pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Germany

®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

© Bausch & Lomb Incorporated

. LTD.
3
01
8 8825