



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC SEMUCOS

Carbocistein 5% (kl/tl)

*Không được tiêm
Để xa tầm tay trẻ em*

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

– Thành phần hoạt chất:

Mỗi ống/gói 2,5 ml dung dịch chứa:

Carbocistein 125 mg

Mỗi ống/gói 5 ml dung dịch chứa:

Carbocistein 250 mg

Mỗi ống/gói 15 ml dung dịch chứa:

Carbocistein 750 mg

– Thành phần tá dược:

Methyl paraben, propyl paraben, propylen glycol, đường sucrose, hương tiramisu, natri hydroxyd, nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHẾ:

Dung dịch uống.

Mô tả: Dung dịch trong, không màu đến vàng nhạt, vị ngọt, mùi thơm.

CHỈ ĐỊNH:

Làm tiêu chất nhầy để hỗ trợ điều trị các bệnh lý đường hô hấp có tăng tiết chất nhầy, đặc biệt là viêm phế quản cấp tính và đợt cấp của viêm phế quản mạn tính.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Cách dùng: SEMUCOS dùng đường uống.

Liều dùng:

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi:

Liều khởi đầu là 15 ml/lần x 3 lần/ngày (tương đương 2250 mg/ngày). Nếu có đáp ứng tốt, giảm liều xuống còn 10 ml/lần x 3 lần/ngày (tương đương 1500 mg/ngày)

Trẻ em:

– Trên 2 tuổi đến dưới 5 tuổi: uống 1,25 – 2,5 ml/lần x 4 lần/ngày.

– Từ 5 tuổi đến dưới 15 tuổi: uống 5 ml/lần x 3 lần/ngày.

Hoặc có thể dùng SEMUCOS-S (Carbocistein (20 mg/ml)) thay thế.

Không dùng thuốc quá 10 ngày nếu không có chỉ dẫn của bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Viêm loét đường tiêu hóa tiến triển.
- Trẻ em dưới 2 tuổi.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

- Trong trường hợp có sốt hoặc ho ra chất nhầy màu xanh, bị bệnh phổi hoặc phế quản mạn tính, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc.



- Carbocistein làm giảm độ nhớt của dịch tiết, giúp dễ tống ra ngoài thông qua nhu động của biểu mô và phản xạ ho. Do đó, việc sử dụng đồng thời với thuốc chống ho và thuốc làm khô dịch tiết không được khuyến khích.
- Nguy cơ tắc nghẽn phế quản ở trẻ sơ sinh do phản xạ ho chưa đầy đủ, do đó không dùng thuốc cho trẻ dưới 2 tuổi.
- Thận trọng đối với người cao tuổi, những người có tiền sử loét dạ dày tá tràng, hoặc những người dùng thuốc đồng thời với những thuốc được biết là có thể gây xuất huyết đường tiêu hóa. Nếu xuất huyết tiêu hóa xảy ra, bệnh nhân nên ngừng thuốc.
- Trong thuốc có chứa các tá dược:
Methyl paraben, propyl paraben: có thể gây dị ứng.
Sucrose: bệnh nhân không dung nạp fructose, kém hấp thu glucose và galactose hoặc thiếu hụt sucrase/isomaltase không nên dùng thuốc này, thận trọng với những bệnh nhân tiểu đường.
Natri hydroxyd: cần thận trọng ở bệnh nhân có chế độ ăn kiêng muối nghiêm ngặt.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai:

Mặc dù các thử nghiệm ở các loài động vật có vú không cho thấy tác dụng gây quái thai, nhưng carbocistein không được khuyến cáo trong ba tháng đầu của thai kỳ.

Phụ nữ cho con bú:

Chưa biết liệu carbocistein hay chất chuyển hóa của nó có được bài tiết vào sữa mẹ hay không.
Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc có ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Không nên kết hợp carbocistein với thuốc chống ho và/hoặc thuốc làm khô dịch tiết (atropinic).
Không dùng đồng thời với các chế phẩm khác có chứa carbocistein để tránh quá liều.
Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC (ADR):

Tần suất xuất hiện được định nghĩa như sau: rất thường gặp ($ADR \geq 1/10$), thường gặp ($1/100 \leq ADR < 1/10$), ít gặp ($1/1000 \leq ADR < 1/100$), hiếm gặp ($1/10000 \leq ADR < 1/1000$) và rất hiếm gặp ($ADR < 1/10000$); chưa biết (không thể ước tính được từ các dữ liệu hiện có).

Hệ cơ quan	Tác dụng phụ	Tần suất
Hệ tiêu hóa	Đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy	Rất thường gặp
	Nôn	Ít gặp
	Xuất huyết tiêu hóa	Rất hiếm gặp
Hệ miễn dịch	Phản ứng phản vệ và ban đỏ nhiễm sắc cố định	Hiếm gặp
	Dị ứng phát ban trên da	Chưa biết
Da và mô dưới da	Ngứa, phát ban, ban đỏ, phù mắt	Hiếm gặp
	Viêm da bóng nước như hội chứng Stevens-Johnson	Chưa biết

Hướng dẫn cách xử trí ADR:

Ngừng dùng dung dịch uống SEMUCOS ngay lập tức và đến gặp bác sĩ hoặc đến ngay bệnh viện nếu gặp phải những triệu chứng sau:

- Xuất hiện các phản ứng dị ứng bao gồm: phát ban, ngứa, khó nuốt hoặc khó thở, sưng môi, mặt, cổ họng hoặc lưỡi.
- Xuất hiện các dấu hiệu bất thường trên da như bị phồng rộp hoặc chảy máu da tại các vị trí như: quanh môi, mắt, miệng, mũi và bộ phận sinh dục; xuất hiện các triệu chứng giống cúm và sốt. Đây được gọi là "hội chứng Stevens-Johnson".

Hãy báo ngay cho bác sĩ để có thể giảm liều khi gặp phải những tác dụng phụ nghiêm trọng sau:

- Nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Các triệu chứng có khả năng xảy ra nhất liên quan đến quá liều là trên hệ tiêu hóa (đau dạ dày, buồn nôn và nôn). Điều trị hỗ trợ nên được thực hiện và rửa dạ dày có thể được xem xét.

MÃ ATC: R05CB03

NHÓM DƯỢC LÝ: Thuốc làm loãng chất nhầy.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Ống 2,5 ml, hộp 10 ống, hộp 20 ống, hộp 30 ống.
- Ống 5 ml, hộp 10 ống, hộp 20 ống, hộp 30 ống.
- Ống 15 ml, hộp 10 ống, hộp 20 ống, hộp 30 ống.
- Gói 2,5 ml, hộp 10 gói, hộp 20 gói, hộp 30 gói.
- Gói 5 ml, hộp 10 gói, hộp 20 gói, hộp 30 gói.
- Gói 15 ml, hộp 10 gói, hộp 20 gói, hộp 30 gói.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC:

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KÝ VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT:

CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9

11 Tân Hóa, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

TP. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Hùng