

Hộp 1 chai 50 ml

1. Nhãn hộp



Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất (Hạn dùng sau mở nắp chai: 60 ngày tính từ ngày mở nắp).

Có cấu trúc chia liều

SĐK:


LSX:

NSX:

HD:

Mã vạch

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
 Địa chỉ: Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
 Điện thoại: 0243.200.9142



GMP-WHO Hộp 1 chai 50 ml

Siro
BROPEXTO

Bromhexin hydroclorid
0,8 mg/1 ml



ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Thành phần:

Mỗi 1 ml siro chứa:

Bromhexin hydroclorid ... 0,8 mg

Tá dược vừa đủ 1 ml

Chỉ định:

Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính.

Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp.

Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

GMP-WHO Box of bottle 50 ml

Syrup
BROPEXTO

Bromhexine hydrochloride
0,8 mg/1 ml



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USE

2. Nhãn chai

Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa: Bromhexin hydroclorid 0,8 mg Tá dược vừa đủ 1 ml Chỉ định: Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp. Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.	GMP-WHO Hộp 1 chai 50 ml Siro BROPEXTO Bromhexin hydroclorid 0,8 mg/1 ml  ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG	Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất (Hạn dùng sau mở nắp chai: 60 ngày tính từ ngày mở nắp). SĐK: LSX: NSX: HD: Mã vạch Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Địa chỉ: Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.200.9142
---	--	---

Hộp 1 chai 60 ml

1. Nhãn hộp



Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất (Hạn dùng sau mở nắp chai: 60 ngày tính từ ngày mở nắp). Có cấu trúc chia liều SĐK: LSX: NSX: HD: Mã vạch Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Địa chỉ: Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.200.9742	GMP-WHO Hộp 1 chai 60 ml Siro BROPEXTO Bromhexin hydroclorid 0,8 mg/1 ml ĐỂ XA TẮM TAY TRƯỚC VÀ SAU KHI DÙNG	Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa: Bromhexin hydroclorid ... 0,8 mg Tá dược vừa đủ 1 ml Chỉ định: Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp. Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.	GMP-WHO Box of bottle 60 ml Syrup BROPEXTO Bromhexine hydrochloride 0,8 mg/1 ml KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USE
---	---	---	---

2. Nhãn chai

Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa: Bromhexin hydroclorid 0,8 mg Tá dược vừa đủ 1 ml Chỉ định: Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp. Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.	GMP-WHO Hộp 1 chai 60 ml Siro BROPEXTO Bromhexin hydroclorid 0,8 mg/1 ml ĐỂ XA TẮM TAY TRƯỚC VÀ SAU KHI DÙNG	Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất (Hạn dùng sau mở nắp chai: 60 ngày tính từ ngày mở nắp). SĐK: LSX: NSX: HD: Mã vạch Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Địa chỉ: Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.200.9742
---	---	---

Hộp 1 chai 80 ml

1. Nhãn hộp



Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất (Hạn dùng sau mở nắp chai: 60 ngày tính từ ngày mở nắp). Có cấu trúc chia liều SĐK: LSX: NSX: HD: Mã vạch Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Địa chỉ: Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.2003142	GMP-WHO Hộp 1 chai 80 ml Siro BROPEXTO Bromhexin hydroclorid 0,8 mg/1 ml ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG	Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa: Bromhexin hydroclorid 0,8 mg Tá được vừa đủ.....1 ml Chỉ định: Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp. Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.	GMP-WHO Box of bottle 80 ml Syrup BROPEXTO Bromhexine hydrochloride 0,8 mg/1 ml KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USE
--	---	--	--

2. Nhãn chai

Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa: Bromhexin hydroclorid 0,8 mg Tá được vừa đủ.....1 ml Chỉ định: Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp. Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.	GMP-WHO Hộp 1 chai 80 ml Siro BROPEXTO Bromhexin hydroclorid 0,8 mg/1 ml ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG	Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất (Hạn dùng sau mở nắp chai: 60 ngày tính từ ngày mở nắp). SĐK: LSX: NSX: HD: Mã vạch Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Địa chỉ: Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.2003142
--	---	--

Hộp 1 chai 100 ml

1. Nhãn hộp



Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất (Hạn dùng sau mở nắp chai: 60 ngày tính từ ngày mở nắp). Có cấu trúc chia liều SĐK: LSX: NSX: HD: Mã vạch Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Địa chỉ: Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.200.9142	GMP-WHO Hộp 1 chai 100 ml Siro BROPEXTO Bromhexin hydroclorid 0,8 mg/1 ml ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG	Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa: Bromhexin hydroclorid 0,8 mg Tá dược vừa đủ.....1 ml Chỉ định: Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp. Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.	GMP-WHO Box of bottle 100 ml Syrup BROPEXTO Bromhexine hydrochloride 0,8 mg/1 ml KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USE
--	---	--	--


2. Nhãn chai

Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa: Bromhexin hydroclorid 0,8 mg Tá dược vừa đủ1 ml Chỉ định: Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp. Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.	GMP-WHO Hộp 1 chai 100 ml Siro BROPEXTO Bromhexin hydroclorid 0,8 mg/1 ml ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG	Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất (Hạn dùng sau mở nắp chai: 60 ngày tính từ ngày mở nắp). SĐK: LSX: NSX: HD: Mã vạch Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Địa chỉ: Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.200.9142
---	---	--

Hộp 1 chai 120 ml

1. Nhãn hộp



Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất (Hạn dùng sau mở nắp chai: 60 ngày tính từ ngày mở nắp). Có cấu trúc chia liều SĐK: LSX: NSX: HD: Mã vạch Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Địa chỉ: Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.200.9142	 Siro BROPECTO Bromhexin hydroclorid 0,8 mg/1 ml  ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG	Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa: Bromhexin hydroclorid 0,8 mg Tá dược vừa đủ1 ml Chỉ định: Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp. Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.	GMP-WHO Box of bottle 120 ml Syrup BROPECTO Bromhexine hydrochloride 0,8 mg/1 ml  KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USE
--	--	---	--

2. Nhãn chai

Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa: Bromhexin hydroclorid 0,8 mg Tá dược vừa đủ1 ml Chỉ định: Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp. Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.	GMP-WHO Hộp 1 chai 120 ml Siro BROPECTO Bromhexin hydroclorid 0,8 mg/1 ml  ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG	Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất (Hạn dùng sau mở nắp chai: 60 ngày tính từ ngày mở nắp). SĐK: LSX: NSX: HD: Mã vạch Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Địa chỉ: Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.200.9142
---	---	--


Hộp 10 ống x 5ml

1. Nhãn hộp




Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa:
Bromhexin hydroclorid 0,8 mg
Tà được vừa đủ 1 ml
Chỉ định, cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

2. Nhãn ống



Hộp 20 ống x 5 ml


1. Nhãn hộp



Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa:
Bromhexin hydroclorid 0,8 mg
Tá dược vừa đủ 1 ml

Chỉ định, cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

2. Nhãn ống



Hộp 30 ống x 5 ml


1. Nhãn hộp



Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất
SDIK:
LSX:
NSX:
HD:

Mã vạch



Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: Lô CNT-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243.2009142



Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa:
Bromhexin hydroclorid 0,8 mg
Tá được vừa đủ 1 ml

Chỉ định:
Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp.

Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.



BROPEXTO
Ống 5 ml

Siro
Bromhexin hydroclorid
0,8 mg/1 ml

 **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT**

LSX:
HD:
KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

Hộp 50 ống x 5 ml

1. Nhãn hộp



Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất.

SDK:



LSX:

NSX:

HD:

Mã vạch

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243.200.9142



Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa:
Bromhexin hydroclorid 0,8 mg
Tá dược vừa đủ 1 ml

Chỉ định:

Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất hỗ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp.

Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

2. Nhãn ống

BROPECTO



Ống 5 ml

Siro
Bromhexin hydroclorid
0,8 mg/1 ml



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT**

LSX:
HD:
KHÔNG ĐƯỢC TIÊM



Hộp 10 ống x 10 ml

1. Nhãn hộp




2. Nhãn ống



Hộp 20 ống x 10 ml

1. Nhãn hộp



Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa:
Bromhexin hydroclorid 0,8 mg
Tá được vừa đủ 1 ml
Chỉ định, cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

2. Nhãn ống



Hộp 30 ống x 10 ml

1. Nhãn hộp



Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất.
SDK:

LSX: _____
NSX: _____
HD: _____

Mã vạch

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243.200.9142



Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa:
Bromhexin hydroclorid 0,8 mg
Tá được vừa đủ 1 ml

Chỉ định:
Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp.

Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

2. Nhãn ống



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT
H. CHƯƠNG MỸ - TP. HÀ NỘI




Hộp 50 ống x 10 ml

1. Nhãn hộp

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất
SDK:
LSX:
NSX:
HD:

Mã vạch

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243.200.9142



Thành phần: Mỗi 1 ml siro chứa:
Bromhexin hydroclorid 0,8 mg
Tá dược vừa đủ 1 ml

Chỉ định:
Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất hỗ trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp.

Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

2. Nhãn ống

