

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

1. Tên thuốc: BROPEXTO

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

“Đỡ xa tầm tay của trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Không được tiêm”

3. Thành phần công thức thuốc:

Mỗi 1 ml sirô chứa:

Thành phần được chất: Bromhexin hydroclorid.....0,8 mg

Thành phần tá dược: Sorbitol 70%, natri citrat, acid citric, đường trắng, tinh dầu cam, natri benzoat, ethanol 96 %, nước tinh khiết vừa đủ.....1 ml.

4. Dạng bào chế: Sirô.

Mô tả: Sirô trong, sánh, không màu hay ngà vàng, có mùi thơm, vị ngọt.

5. Chỉ định:

Làm loãng đờm trong các bệnh phế quản phổi cấp và mạn tính có kèm theo sự tiết chất nhầy bất thường và sự vận chuyển chất nhầy bị suy yếu.

6. Cách dùng và liều dùng:

Cách dùng: thuốc dùng đường uống

Liều dùng:

Người lớn, trẻ em trên 12 tuổi:	10 ml (8 mg) x 3 lần/ngày
Trẻ 6 – 12 tuổi:	5 ml (4 mg) x 3 lần/ngày
Trẻ 2 – 6 tuổi:	2,5 ml (2 mg) x 3 lần/ngày
Trẻ dưới 2 tuổi:	1,25 ml (1 mg) x 3 lần/ngày

Khi bắt đầu điều trị có thể cần thiết phải tăng tổng liều mỗi ngày đến 48 mg (60 ml hoặc 20 ml 3 lần mỗi ngày) ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.

Thời gian điều trị bằng BROPEXTO siro không quá 8 - 10 ngày mà không hỏi ý kiến bác sĩ.

7. Chống chỉ định:

Khi có tiền sử mẫn cảm với bromhexin hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Trong khi dùng bromhexin cần tránh phối hợp với thuốc ho vì có nguy cơ ứ đọng đờm ở đường hô hấp.

Bromhexin, do tác dụng làm tiêu dịch nhầy, nên có thể gây huỷ hoại hàng rào niêm mạc dạ dày; vì vậy, khi dùng cho người bệnh có tiền sử loét dạ dày phải rất thận trọng.

Cần thận trọng khi dùng cho người bệnh hen, vì bromhexin có thể gây co thắt phế quản ở một số người dễ mẫn cảm.

Sự thanh thải bromhexin và các chất chuyển hóa có thể bị giảm ở người bệnh bị suy gan hoặc suy thận nặng, nên cần phải thận trọng và theo dõi.

Cần thận trọng khi dùng bromhexin cho người cao tuổi hoặc suy nhược quá yếu, trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 2 tuổi, vì không có khả năng khạc đờm có hiệu quả do đó càng tăng ứ đờm.

Thuốc có chứa tá dược natri benzoat, có thể gây phản ứng dị ứng.

Thuốc có chứa tá dược đường trắng 0,66g/1 ml, cần thận trọng với bệnh nhân đái tháo đường.

Bệnh nhân bị rối loạn di truyền hiếm gặp làm kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai:

Chưa nghiên cứu tác dụng sinh quái thai của bromhexin ở động vật thí nghiệm. Chưa có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát về dùng bromhexin cho người mang thai, vì vậy, không khuyến cáo dùng bromhexin cho người mang thai.

- Sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú:

Còn chưa biết bromhexin có bài tiết vào sữa mẹ không. Vì vậy, không khuyến cáo dùng bromhexin cho phụ nữ nuôi con bú. Nếu cần dùng thì tốt nhất là không cho con bú.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Thuốc chưa có nghiên cứu cho đối tượng lái xe và vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Không phối hợp với thuốc làm giảm tiết dịch (giảm cả dịch tiết khí phế quản) như các thuốc kiểu atropin (hoặc anticholinergic) vì làm giảm tác dụng của bromhexin.

Không phối hợp với các thuốc chống ho.

Dùng phối hợp bromhexin với kháng sinh (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyclin) làm tăng nồng độ kháng sinh vào mô phổi và phế quản. Như vậy, bromhexin có thể có tác dụng như một thuốc hỗ trợ trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp, làm tăng tác dụng của kháng sinh.

Tương kỵ: Dung dịch bromhexin hydroclorid ổn định ở pH < 6. Nếu pH > 6, thuốc bị kết tủa do giải phóng ra bromhexin dạng base. Vì vậy, không được trộn với các dung dịch kiềm, kể cả các dung dịch có pH trung tính.

Không được trộn bromhexin hydroclorid dạng dung dịch uống, cồn ngọt hoặc dung dịch tiêm với các thuốc khác, do nguy cơ tương kỵ về hóa lý.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR):

Ít gặp, 1/1 000 < ADR < 1/100

Tiêu hóa: Đau vùng thượng vị, buồn nôn, nôn, ỉa chảy.

Thần kinh: Nhức đầu, chóng mặt, ra mồ hôi.

Da: Ban da, mề đay.

Hô hấp: Nguy cơ ứ dịch tiết phế quản ở người bệnh không có khả năng khạc đờm.

Hiếm gặp, ADR < 1/1 000

Tiêu hóa: Khô miệng.

Gan: Tăng enzym transaminase AST, ALT.

- Hướng dẫn cách xử trí ADR:

Ngừng sử dụng thuốc khi gặp các tác dụng không mong muốn trên, hỏi ý kiến của bác sỹ hay dược sỹ và đến trung tâm y tế gần nhất.

Các ADR thường nhẹ và qua khỏi trong quá trình điều trị (trừ co thắt phế quản khi dùng thuốc cho người bị hen suyễn).

13. Quá liều và xử trí:

01040
CÔNG
CỔ P
ĐƯỢC
HÀNH
DNG M

Cho đến nay chưa có báo cáo về quá liều do bromhexin. Nếu xảy ra trường hợp quá liều, cần điều trị triệu chứng và các biện pháp hỗ trợ.

14. Đặc tính dược lực học:

Mã ATC: R05CB02.

Nhóm dược lý: Thuốc long đờm (nhóm tiêu đờm)

Bromhexin hydroclorid là chất có tác dụng long đờm. Do hoạt hóa tổng hợp sialomucin và phá vỡ các sợi acid mucopolysaccharid nên thuốc làm đờm lỏng hơn và ít quánh hơn. Giúp đờm từ phế quản thoát ra ngoài có hiệu quả.

15. Đặc tính dược động học:

Hấp thu:

Bromhexin hydroclorid hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và bị chuyển hóa bước đầu ở gan rất mạnh, nên sinh khả dụng khi uống chỉ đạt khoảng 20 %. Thức ăn làm tăng sinh khả dụng của bromhexin hydroclorid. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau khi uống, từ 1/2 giờ đến 1 giờ.

Phân bố:

Bromhexin hydroclorid phân bố rất rộng rãi vào các mô của cơ thể. Thuốc liên kết rất mạnh (95 – 99 %) với protein huyết tương. Bromhexin qua được hàng rào máu não và một lượng nhỏ qua được nhau thai.

Chuyển hóa:

Bromhexin chuyển hóa chủ yếu ở gan. Đã phát hiện được ít nhất 10 chất chuyển hóa trong huyết tương, trong đó, có chất ambroxol là chất chuyển hóa vẫn còn hoạt tính.

Thải trừ:

Thời gian bán thải của thuốc ở pha cuối là 13 - 40 giờ tùy theo từng cá thể. Khoảng 85 – 90 % liều dùng được thải trừ qua nước tiểu, chủ yếu là dưới dạng các chất chuyển hoá, ở dạng liên hợp sulfo hoặc glucuro và một lượng nhỏ được thải trừ nguyên dạng. Bromhexin được thải trừ rất ít qua phân, chỉ khoảng dưới 4 %.

16. Qui cách đóng gói:

Hộp 10 ống x 5 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 20 ống x 5 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 30 ống x 5 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 50 ống x 5 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 10 ống x 10 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 20 ống x 10 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 30 ống x 10 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 50 ống x 10 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 1 chai x 50 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng và cốc đong chia liều.

Hộp 1 chai x 60 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng và cốc đong chia liều.

Hộp 1 chai x 80 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng và cốc đong chia liều.

Hộp 1 chai x 100 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng và cốc đong chia liều.

Hộp 1 chai x 120 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng và cốc đong chia liều.

14039-
CÔNG TY
HÀNG
PHÂN
PHÁT
TP HỒ

17. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- **Điều kiện bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất (Hạn dùng sau mở nắp chai: 60 ngày tính từ ngày mở nắp).

- **Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS.

18. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

Địa chỉ: Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: 024.32009142

