



TÀI LIỆU KHÁC



5. MẪU NHÃN

Dung dịch uống

REDOLVONKIDS®

Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)

Hộp 4 vỉ x 5 ống 5ml

Dung dịch uống

REDOLVONKIDS®

Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)



Điều trị rối loạn tiết dịch PHẾ QUẢN



CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Hạn sử dụng sau khi mở nắp: 30 ngày kể từ ngày mở nắp.

SĐK /Reg.No:

Số lô sx/Lot.No:

NSX/Mfg.Date:

HD/Exp. Date:



Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 102 Phố Cội Làn, Phường Nguyễn Trãi,
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220 3 853848

Số lô sx:
HD:

Dung dịch uống **REDOLVONKIDS®** 5ml
Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)

Dung dịch uống

REDOLVONKIDS®

Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)



Điều trị rối loạn tiết dịch PHẾ QUẢN



Dung dịch uống **REDOLVONKIDS**

Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)



Dung dịch uống **REDOLVONKIDS**

Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)



Điều trị rối loạn tiết dịch
PHẾ QUẢN

Hộp 1 Chai 125ml

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

Hạn sử dụng sau khi mở nắp: 30 ngày kể từ ngày mở nắp

SĐK /Reg.No:

Số lô sx/Lot.No:

NSX/Mfg.Date:

HD/Exp. Date:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 102 Phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi,
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3 853848



Dung dịch uống **REDOLVONKIDS**

Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)



Điều trị rối loạn tiết dịch
PHẾ QUẢN

Hộp 1 Chai 125ml



Dung dịch uống **REDOLVONKIDS**

Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)



SĐK /Reg.No:

GMP

Chai 125ml

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Số lô sx/Lot.No:

NSX/Mfg.Date:

HD/Exp. Date:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Dung dịch uống **REDOLVONKIDS**

Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)

THÀNH PHẦN: Trong 125ml

Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)
Tá dược Vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị rối loạn tiết dịch phế quản (sự tiết chất nhầy bất thường và sự vận chuyển chất nhầy bị suy yếu); Làm loãng đờm, long đờm trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em trên 14 tuổi: Uống 5-10mL/lần, 3 lần/ngày (tương đương 24 đến 48 mg bromhexin hydroclorid/ngày).
- Trẻ từ 6-14 tuổi và bệnh nhân nặng dưới 50kg: Uống 5mL/lần, 3 lần/ngày (tương đương 24 bromhexin hydroclorid/ngày).
- Thuốc có hàm lượng hoạt chất thấp hơn dùng được cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Thời gian sử dụng phải được quyết định riêng tùy thuộc vào chỉ định và quá trình điều trị.
- Thời gian điều trị không quá 4-5 ngày trừ khi có chỉ định của thầy thuốc.

Cách dùng:

- Dùng thuốc theo đường uống, dùng sau ăn.



THÀNH PHẦN: Trong 75ml
Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)
Tá dược Vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị rối loạn tiết dịch phế quản (sự tiết chất nhầy bất thường và sự vận chuyển chất nhầy bị suy yếu); Làm loãng đờm, long đờm trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em trên 14 tuổi: Uống 5-10mL/lần, 3 lần/ngày (tương đương 24 đến 48 mg bromhexin hydroclorid/ngày).
- Trẻ từ 6-14 tuổi và bệnh nhân nặng dưới 50kg: Uống 5mL/lần, 3 lần/ngày (tương đương 24 bromhexin hydroclorid/ngày).
- Thuốc có hàm lượng hoạt chất thấp hơn dùng được cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Thời gian sử dụng phải được quyết định riêng tùy thuộc vào chỉ định và quá trình điều trị.
- Thời gian điều trị không quá 4-5 ngày trừ khi có chỉ định của thầy thuốc.

Cách dùng:

- Dùng thuốc theo đường uống, dùng sau ăn.

Hộp 1 Chai 75ml



Dung dịch uống
REDOLVONKIDS®
Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)



Điều trị rối loạn tiết dịch
PHẾ QUẢN

CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hạn sử dụng sau khi mở nắp: 30 ngày kể từ ngày mở nắp

SĐK /Reg.No:

Số lô sx/Lot.No:

NSX/Mfg.Date:

HD/Exp. Date:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 102 Phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi,
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3 853848

Hộp 1 Chai 75ml



Dung dịch uống
REDOLVONKIDS®
Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)



Điều trị rối loạn tiết dịch
PHẾ QUẢN



THÀNH PHẦN: Trong 75ml
Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)
Tá dược Vừa đủ

CHỈ ĐỊNH: Điều trị rối loạn tiết dịch phế quản (sự tiết chất nhầy bất thường và sự vận chuyển chất nhầy bị suy yếu); Làm loãng đờm, long đờm trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính.

CÁC DÙNG - LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

SĐK /Reg.No:

Dung dịch uống
REDOLVONKIDS®
Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)



GMP

Chai 75 ml

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Hạn sử dụng sau khi mở nắp: 30 ngày kể từ ngày mở nắp

Số lô sx/Lot.No:

NSX/Mfg.Date:

HD/Exp. Date:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Dung dịch uống
REDOLVONKIDS®
Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)

THÀNH PHẦN: Trong 60ml
Bromhexin hydroclorid..... 0,16% (w/v)
Tá được.....Vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị rối loạn tiết dịch phế quản (sự tiết chất nhầy bất thường và sự vận chuyển chất nhầy bị suy yếu); Làm loãng đờm, long đờm trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em trên 14 tuổi: Uống 5-10ml/lần, 3 lần/ngày (tương đương 24 đến 48mg bromhexin hydroclorid/ngày).
- Trẻ từ 6-14 tuổi và bệnh nhân nặng dưới 50kg: Uống 5ml/lần, 3 lần/ngày (tương đương 24 bromhexin hydroclorid/ngày).
- Thuốc có hàm lượng hoạt chất thấp hơn dùng được cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Thời gian sử dụng phải được quyết định riêng tùy thuộc vào chỉ định và quá trình điều trị.
- Thời gian điều trị không quá 4-5 ngày trừ khi có chỉ định của thầy thuốc.

Cách dùng:

- Dùng thuốc theo đường uống, dùng sau ăn.

Hộp 1 Chai 60ml

Dung dịch uống
REDOLVONKIDS®
Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)



Điều trị rối loạn tiết dịch
PHẾ QUẢN

CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Hạn sử dụng sau khi mở nắp: 30 ngày
kể từ ngày mở nắp

SDK /Reg.No:

Số lô sx/Lot.No:

NSX/Mfg.Date:

HD/Exp. Date:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 102 Phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi,
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3 853848

Hộp 1 Chai 60ml

Dung dịch uống
REDOLVONKIDS®
Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)



Điều trị rối loạn tiết dịch
PHẾ QUẢN



THÀNH PHẦN: Trong 60ml
Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)
Tá đượcVừa đủ

CHỈ ĐỊNH: Điều trị rối loạn tiết dịch phế quản (sự tiết chất nhầy bất thường và sự vận chuyển chất nhầy bị suy yếu); Làm loãng đờm, long đờm trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính.

CÁC DÙNG - LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

SDK /Reg.No:

Dung dịch uống
REDOLVONKIDS®
Bromhexin hydroclorid 0,16% (w/v)



GMP

Chai 60 ml

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Hạn sử dụng sau khi mở nắp: 30 ngày
kể từ ngày mở nắp

Số lô sx/Lot.No:

NSX/Mfg.Date:

HD/Exp. Date:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG