



Tờ hướng dẫn sử dụng dự kiến lưu hành

Hướng dẫn sử dụng thuốc
Thuốc nhỏ mũi

GMP - WHO

JAZXYLO BABY DROPS

Xylometazolin hydrochlorid 0,025%

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

Mỗi lọ 10 ml chứa:

Thành phần hoạt chất: Xylometazolin hydrochlorid..... 0,025%

Thành phần tá dược: Natri dihydro phosphat dihydrat, dinatri

hydro phosphat dodecahydrat, dinatri edetat, hydroxypropyl

methylcellulose, natri clorid, sorbitol 70%, nước tinh khiết.

Chất bảo quản: Benzalkonium clorid 0,01%

ĐANG BẢO CHẾ: Thuốc nhỏ mũi.

Mô tả sản phẩm: Dung dịch trong, không màu.

CHỈ ĐỊNH:

Giảm tình trạng viêm của niêm mạc ở vòm mũi họng (ví dụ: cảm

lạnh; để làm giảm dịch tiết thoát ra trong viêm xoang; trong

trường hợp viêm tai giữa).

Sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi dưới 2 tuổi.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Thuốc Jazxylo Baby Drops được dùng ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết

đi dưới 2 tuổi với sự giám sát của người lớn. Đối với trẻ dưới 1 tuổi,

tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế trước khi dùng.

Liều dùng:

Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi dưới 2 tuổi: Mỗi lần dùng thuốc, nhỏ

1 giọt vào mỗi bên lỗ mũi, 2 - 3 lần mỗi ngày (giữ khoảng cách 8

- 10 giờ giữa các liều), không dùng quá 3 lần trong 24 giờ.

Liều dùng không được vượt quá số với liều dùng khuyến cáo.

Không dùng thuốc Jazxylo Baby Drops lâu hơn 7 ngày liên tục.

Ở trẻ nhũ nhi và trẻ sơ sinh: Liều dùng tham khảo ý kiến của

chuyên gia y tế.

Cách dùng:

Nhỏ mũi:

Trước khi sử dụng tiến hành các bước:

- Xoay để mở nắp lọ thuốc.

- Kiểm tra đầu nhỏ thuốc sạch sẽ, không bị nứt hoặc nứt mé.

- Hướng miệng lọ thuốc xuống dưới, bóp nhẹ

thân lọ thuốc cho đến khi một giọt xuất hiện.

Bỏ giọt đầu tiên.



Thực hiện nhỏ thuốc theo các bước sau:

1. Làm sạch mũi của trẻ thật kỹ trước khi sử dụng.

2. Cho trẻ nằm, đầu hơi nghiêng sang một bên. Giữ

đầu nhỏ thuốc ngay trước lỗ mũi và nhỏ 1 giọt. Nên

tránh đưa đầu nhỏ thuốc vào lỗ mũi. Sau đó giữ

nguyên tư thế trong thời gian ngắn để thuốc có hiệu

lực.

3. Xoay nhẹ đầu trẻ sang bên kia và lặp lại quy trình

với lỗ mũi còn lại.

4. Đóng chặt nắp lọ ngay sau khi sử dụng.

Lần nhỏ cuối cùng trong ngày tốt nhất nên thực hiện ngay trước

khi đi ngủ.

Ví dụ do vệ sinh và để tránh nhiễm trùng, một lọ chỉ nên được sử

dụng cho một bệnh nhân.

năng sinh sản của con người.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc Jazxylo Baby Drops không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

Tương tác của thuốc

Việc sử dụng kết hợp xylometazolin với các chất ức chế monoamine oxidase (MAOIs) hoặc thuốc chống trầm cảm 3, 4 vòng có thể dẫn đến tăng huyết áp do ảnh hưởng tim mạch của các chất này.

Tương tác của thuốc

Việc sử dụng kết hợp xylometazolin với các chất ức chế monoamine oxidase (MAOIs) hoặc thuốc chống trầm cảm 3, 4 vòng có thể dẫn đến tăng huyết áp do ảnh hưởng tim mạch của các chất này.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Đặc biệt, thuốc không mong muốn được phân nhóm theo tần suất: Rất hiếm gặp (ADR $\leq 1/100$), thường gặp (1/100 $\leq$ ADR $\leq 1/10$), ít gặp (1/10 $\leq$ ADR $\leq 1/1000$), hiếm gặp (1/1000 $\leq$ ADR $\leq 1/10000$), rất hiếm gặp (ADR $\leq 1/10000$) và không được biết (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn).

CÁC PHẢN ỨNG BẤT LỢI

Đã được hệ thống miễn dịch:

+ Rất hiếm: Phản ứng quá mẫn (phù mạch, phát ban, ngứa).

+ Rối loạn hệ thần kinh:

+ Thường gặp: nhức đầu,

+ Rất hiếm gặp: bồn chồn, mất ngủ, mệt mỏi (buồn ngủ, buồn

ngủ), ảo giác (chủ yếu xảy ra ở trẻ em).

+ Rối loạn mắt:

+ Rất hiếm: Suy giảm thị lực thoáng qua.

+ Rối loạn tim mạch:

+ Hiếm gặp: đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, tăng huyết áp.

+ Rất hiếm gặp: nhịp tim không đều, tăng nhịp tim.

+ Rối loạn hệ hô hấp, lồng ngực và trung thất:

+ Thường gặp: khó niệm mạc mũi, khó chịu ở mũi, hắt hơi.

+ Không phổ biến: tăng sung màng nhầy, chảy máu cam

+ Rất hiếm: Ngưng thở ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.

+ Rối loạn dạ dày - ruột:

+ Thường gặp: buồn nôn.

+ Rối loạn cơ xương, mô liên kết và xương:

+ Rất hiếm: co giật (đặc biệt ở trẻ em).

+ Rối loạn toàn thân và tại vị trí dùng thuốc:

+ Thường gặp: cảm giác nóng rát tại chỗ dùng thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sĩ khi gặp các tác dụng

không mong muốn như trên khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo các

phản ứng có hại của thuốc và Trung tâm Thông tin thuốc và Theo

dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR) Quốc gia.

QUA LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Qua liều

Xylometazolin là một dẫn xuất imidazol. Trên lâm sàng, quá liều khi sử dụng các dẫn xuất imidazol thường dễ nhầm lẫn vì các triệu chứng kích thích có thể xen kẽ với các triệu chứng ức chế hệ thống thần kinh và tim mạch trung ương.

+ Các triệu chứng kích thích bao gồm: lo lắng, kích động, ảo giác

và co giật.

+ Các triệu chứng ức chế bao gồm: nhiệt độ cơ thể thấp, thờ ơ,

buồn ngủ và hôn mê.

Bên cạnh đó, một số triệu chứng sau đây có thể xảy ra, bao gồm:

Co đồng tử, giãn đồng tử, đổ mồ hôi, sốt, xanh xao, tím tái, buồn nôn, nhịp tim nhanh, nhịp tim chậm, rối loạn nhịp tim, ngừng tim, tăng huyết áp, hạ huyết áp, giảm sức, phù phổi, rối loạn hô hấp và ngưng thở.

Đặc biệt ở trẻ em, sau khi dùng quá liều, tác dụng chi phối thần kinh trung ương thường gặp bao gồm: chuột rút và hôn mê, nhịp tim chậm, ngưng thở và tăng huyết áp hoặc hạ huyết áp.

Xử trí

Nên tiến hành các biện pháp hỗ trợ thích hợp trên tất cả các bệnh nhân bị nghi ngờ quá liều và chỉ định điều trị triệu chứng khẩn cấp dưới sự giám sát y tế khi được đảm bảo. Điều này sẽ bao gồm theo dõi bệnh nhân trong vài giờ.

ĐẶC TÍNH THUỐC LƯC HỌC:

Mã ATC: R01AA07

Nhóm dược lý: Thuốc thông mũi dùng tại chỗ, cường giao cảm. Xylometazolin hydrochlorid là một chất cường giao cảm hoạt động trên các thụ thể alpha-adrenergic ở niêm mạc mũi. Khi nhỏ vào mũi, nó làm co mạch máu ở mũi, qua đó làm giảm phù nề ở niêm mạc mũi và các vùng xung quanh họng. Nó cũng làm giảm các triệu chứng liên quan đến tăng bài tiết chất nhầy và tạo điều kiện tiêu các dịch tiết tắc nghẽn. Điều này giúp cho việc thở qua mũi được dễ dàng trong các trường hợp nghẹt mũi. Tác dụng của thuốc bắt đầu trong vòng 2 phút và kéo dài trong vài giờ - trung bình là 6-8 giờ.

ĐẶC TÍNH THUỐC ĐỘNG HỌC:

Nồng độ xylometazolin trong huyết tương sau khi sử dụng tại chỗ là rất thấp.

Hấp thu

Sử dụng tại chỗ xylometazolin dẫn đến sự hấp thu toàn thân là rất thấp. Tuy nhiên, nếu vượt quá liều khuyến cáo, sự hấp thu toàn thân xylometazolin qua đường mũi có thể xảy ra và dẫn đến tác dụng phụ cường giao cảm toàn thân.

Phân bố

Không có dữ liệu từ nghiên cứu của con người.

Chuyển hóa

Không có dữ liệu từ nghiên cứu của con người.

Thải trừ

Không có dữ liệu từ nghiên cứu của con người.

Nhóm bệnh nhân đặc biệt

Không có nghiên cứu nào được thực hiện ở các nhóm bệnh nhân cụ thể.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 lọ x 10ml, kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ từ ngày sản xuất: Sau khi

hàn đóng, sử dụng chế phẩm trong vòng 1 tháng

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC: TCCS

Có sẵn xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE

Đường YP6, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Đông Phong,

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 02223 699285 * Website: meracinefmg.com

