КЛИНИЧЕСКИЙ КОМПАС / ВЕРСИЯ 10

Библиотека препаратов и модуль назначений

12 препаратов • 468 структурированных записей о нежелательных реакциях • правила проверки сочетаний • техническое задание на клинический интерфейс

ВНИМАНИЕ. Это ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ справочник для разработки интерфейса, НЕ официальные инструкции и НЕ основание для реальных назначений. В истории проекта оригинальные инструкции представлены в очень длинном сообщении пользователя, однако данная машинно-структурированная база содержит сокращённые редакционные разделы. Поэтому нельзя выдавать содержание этого PDF за дословную полную копию листков-вкладышей. Сверка с ГРЛС/ОХЛП обязательна.

Что содержится в этом документе

01 Архитектура библиотеки, выбор препаратов и экран карточки

02 Проверка взаимодействий — статусы, правила, причины и ограничения

03 «Назначить пациенту» — поля, переходы, хранение черновиков

04 12 лекарственных карточек с подразделами и данными по побочным реакциям

05 Матрица сочетаний 66 пар и перечень конкретных правил

06 Критерии приёмки для Полины и требования для реального продукта

01 Что изменилось в интерфейсе

Каталог

Алфавитная сортировка 12 препаратов; полнотекстовый поиск по торговому наименованию, МНН, группе и производителю. У каждой строки три независимых действия: «Открыть карточку», «В проверку», «Назначить». Выбор препарата в проверку не должен сам переводить пользователя на экран назначений.

Карточка

Слева — закрепляемое оглавление по разделам, справа — название, МНН, производитель, РУ, лекарственная форма, дозировка и сведения о препарате. Переход по оглавлению к «Показаниям», «Противопоказаниям», «Побочным действиям», «Взаимодействиям», «Фармакокинетике» и т. д. Есть ссылка на источник и явное предупреждение о полноте данных.

Проверка сочетаний

Кнопка «+ Добавить препарат из списка» открывает встроенный раскрывающийся перечень прямо на текущей вкладке. Внутри — поиск, «Карточка» и «+ Добавить». После добавления список остаётся на месте. Выбранные препараты показаны чипами, каждый можно удалить. Анализ строится по каждой паре отдельно.

Назначить пациенту

Отдельный экран и отдельный список препаратов: при выборе препарата для назначения открывается форма схемы. Вверху выбор учебного пациента, далее поля дозы, кратности, часов, отношения к пище, пути введения, начала, длительности и пояснения. Можно сохранять отдельные черновики для разных учебных пациентов.

Сохранение

Демо сохраняет изменения в localStorage браузера. Лекарственный черновик сохраняется для выбранного учебного пациента только после заполнения обязательных полей дозы и кратности. Он не отправляется реальному пациенту, не подписывается, не считается рецептом и не выводится как подтверждённое врачебное назначение.

02 Проверка взаимодействий

ПРОТИВОПОКАЗАНО

В присланной инструкции прямо указана несовместимость соответствующих веществ или групп. Система показывает механизм, возможный риск, источник, требуемое врачебное действие. Это не автоматическое принятие решения.

ПОВЫШЕННАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ

Есть основание ожидать значимого лекарственного взаимодействия или увеличение экспозиции; нельзя автоматически называть сочетание допустимым. Нужны индивидуальные данные.

ТРЕБУЕТ ОЦЕНКИ

Классовое или конкретное предупреждение без подтверждённого запрета. Указывается, что основание может быть эвристикой, а не доказательством эффекта для данной пары.

ДАННЫХ НЕДОСТАТОЧНО

В демобазе нет индивидуального подтверждённого правила. Никогда не показывать зелёное «совместимо» лишь на основании отсутствия запрета.

При сочетании трёх препаратов система проверяет все 3 пары; при четырёх — все 6 пар. Общее число пар = n·(n−1)/2. Результаты считаются только покрытием конкретных правил, а НЕ полноценной проверкой лекарственной безопасности.

Состав медицинского предупреждения

1. Два действующих вещества и конкретные лекарственные формы

2. Степень предупреждения и подтверждённость источника

3. Краткий механизм (например, CYP1A2, CYP2D6, QT, серотонинергическая активность)

4. Ожидаемые клинические последствия

5. Что проверить врачу: ЭКГ, лабораторные показатели, дозу, интервалы после отмены, другую терапию

6. Кнопка перехода к карточке каждого препарата и ссылка на инструкцию

7. Отдельный блок о полноте библиотеки, версии инструкции и том, кто подтвердил запись

03 Как оформляется учебное назначение

Поле	Назначение
Пациент	Выбор из учебных карт, отдельное хранилище черновиков для каждой
Препарат	Выбор из алфавитного каталога с поиском
Доза *	Вводит специалист; система не подставляет автоматически
Кратность *	1, 2, 3, 4 раза в день; по необходимости; другая схема
Время	Точные часы или утро / день / вечер
Относительно еды	За 30 мин до, до, во время, после, независимо от еды, другое
Способ применения	Внутрь или иной способ с пояснением
Дата начала	Необязательное поле
Продолжительность курса	Дней, недель или врачебной формулировкой
Комментарий пациенту	Порядок приёма, что делать при пропуске, ограничения, сигналы для связи с врачом

Переходы между разделами

Каталог → «Назначить» → выбор пациента и заполнение схемы → «Проверить сочетания выбранных» → просмотр каждого предупреждения → возврат к черновику. При проверке кнопка «Добавить препарат» остаётся на экране проверки; переходы в каталог не обязательны.

Обязательная валидация

Перед локальным сохранением проверить, что выбраны пациент и хотя бы один препарат, для каждого препарата непустые доза и кратность. В реальном сервисе также необходима проверка допустимости дозы для пациента, показаний, лекарственной формы, аллергий, беременности, возраста, ЭКГ, функций почек/печени, всех сопутствующих лекарств и подписание врачом.

Демо не даёт инструкции по лечению пациента и не создаёт действительные рецепты. Использовать только обезличенные или вымышленные данные.

04 Лекарственные карточки

Для каждого препарата приведены сведения из структурированной рабочей базы проекта: метаданные выбранной формы, подробные текстовые разделы и классифицированные нежелательные реакции. Они отражают материалы прошлой версии прототипа и не воспроизводят все страницы исходного большого пользовательского сообщения дословно.

Содержание карточек

01. Авиандр — Маритупирдин / 20 мг

02. Эсциталопрам — Эсциталопрам / 10 мг

03. Сертралин — Сертралин / 50 мг

04. Флуоксетин — Флуоксетин / 20 мг

05. Флувоксамин-СЗ — Флувоксамин / 100 мг

06. Венлафаксин — Венлафаксин / 37,5 мг

07. Дулоксетин Канон — Дулоксетин / 60 мг

08. Миртазапин Канон — Миртазапин / 30 мг

09. Агомелатин — Агомелатин / 25 мг

10. Бринтелликс — Вортиоксетин / 10 мг

11. Спитомин — Буспирон / 10 мг

12. Гидроксизин — Гидроксизин / 25 мг

Авиандр

МНН
Маритупирдин

Производитель (из пользовательского текста)
ИИХР ООО

Форма
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

Доза / упаковка
20 мг, 30 шт.

Регистрационный номер, указанный пользователем
ЛП-№(002445)-(РГ-RU)

АТХ
N05BX

Сокращённые редакционные разделы. Полноту всех противопоказаний, доз, нежелательных реакций и взаимодействий сверять по актуальной инструкции именно выбранного торгового наименования и РУ.

ВАЖНО: данные из инструкции присланной формы

Режим/применение: Согласно присланному листку-вкладышу: при ГТР у взрослых — по 20 мг дважды в сутки (утром и вечером) внутрь за 30 минут до еды. Для некоторых тревожных состояний после COVID-19 описан курс 4 недели с возможным увеличением врачом до 6 недель.

Особые ограничения: Особое внимание: эпилепсия или органические поражения мозга; ингибиторы МАО и 14 дней после их отмены; СКФ ниже 60 мл/мин; печёночная недостаточность; беременность и ГВ; возраст до 18 лет.

Сочетания: В инструкции прямо упомянуты седативные препараты, антидепрессанты, триптаны, опиоидные анальгетики и ингибиторы CYP2D6. Перечень требует проверки по всем компонентам терапии; это не означает автоматическое противопоказание каждой пары.

Группа

Анксиолитик, небензодиазепиновый; психолептики, другие анксиолитические средства. АТХ N05BX.

Показания

Взрослые от 18 лет: генерализованное тревожное расстройство; определённые тревожные состояния со стрессовой реакцией и нарушением адаптации лёгкой/средней степени после COVID-19. Не считать любое состояние тревоги отдельным зарегистрированным показанием.

Способ применения и дозы

Внутрь по 20 мг (1 таб.) утром и вечером, за 30 мин до еды. При ГТР длительность определяет врач; для указанной постковидной ситуации в инструкции приведён курс 4 недели с возможным увеличением до 6 недель по решению врача. Пропуск дозы — по инструкции, без самовольного удвоения.

Состав (справочное описание)

Одна таблетка: маритупирдин (гидрохлорид) 20 мг. Ядро: безводная лактоза, гидрогенизированное касторовое масло, картофельный крахмал. Оболочка: гипромеллоза, диоксид титана E171, макрогол 6000.

Противопоказания

Гиперчувствительность; эпилепсия, органические поражения головного мозга; ИМАО одновременно и в течение 14 дней после их отмены; СКФ <60 мл/мин; печёночная недостаточность классов A–C Чайлд–Пью; беременность/лактация; возраст до 18 лет.

Особые указания

Осторожность при сердечно-сосудистых заболеваниях и у пожилых; возможны сонливость, головокружение и ухудшение реакции. При их появлении не водить и не работать с опасными механизмами. Инструкция отмечает, что зависимость/синдром отмены не могут быть исключены.

Побочные действия

ЖКТ: боль в верхней части живота, запор, тошнота
Кожа и потоотделение: повышенная потливость
Лабораторные изменения: повышение КФК, снижение гемоглобина
Мышцы и опорно-двигательная: боль в спине, скованность мышц, тризм
Нервная система: головная боль, головокружение, нарушение вкуса, нарушение внимания, парестезия, снижение реакции на раздражители, сонливость
Обмен веществ и питание: снижение аппетита
Общие симптомы: астения
Психика и сон: бессонница, низкое качество сна, усиление тревоги

Взаимодействия с другими лекарствами

Нельзя с ИМАО (и 14 дней после). Осторожность с СИОЗС, ТЦА, триптанами, трамадолом, литием, зверобоем и другими серотонинергическими средствами (серотониновая токсичность). Снотворные, нейролептики, бензодиазепины и H1-блокаторы могут усилить седацию; алкоголь избегать. Ингибиторы CYP2D6 могут увеличить экспозицию.

Фармакодинамика

Мультимодальное рецепторное действие: высокое сродство к 5-HT7; взаимодействие с 5-HT6/5-HT2A/5-HT2C, α2-адренорецепторами и H1. Не является блокатором обратного захвата серотонина и не действует через ГАМК-рецепторы.

Условия хранения

Не выше 25 °C; хранить вне доступа детей.

Срок годности

Точное число лет для выбранной партии/упаковки в проверенной карточке не указано: проверить ОХЛП и маркировку (маркетплейс пишет лишь «длительный срок»).

Фармаконадзор

ООО «иФарма», Москва, Сколково, Большой бульвар, 40, пом. XXXIII, комн. 77; sae@ipharma.ru; +7 (495) 276-11-43 (по карточке Apteka.ru)

Нежелательные реакции по системам (21) · демобаза

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ДЕМО: частоты не переносятся автоматически между брендами, формами выпуска или редакциями инструкций. Каждая запись требует сверки по ОХЛП именно выбранного РУ перед назначением.

Нервная система (7):
головная боль — часто; головокружение — часто; сонливость — часто; парестезия — часто; нарушение внимания — нечасто; снижение реакции на раздражители — нечасто; нарушение вкуса — нечасто

Психика и сон (3):
бессонница — нечасто; усиление тревоги — нечасто; низкое качество сна — нечасто

ЖКТ (3):
тошнота — нечасто; боль в верхней части живота — нечасто; запор — нечасто

Обмен веществ и питание (1):
снижение аппетита — нечасто

Кожа и потоотделение (1):
повышенная потливость — нечасто

Мышцы и опорно-двигательная (3):
скованность мышц — нечасто; тризм — нечасто; боль в спине — нечасто

Общие симптомы (1):
астения — часто

Лабораторные изменения (2):
повышение КФК — нечасто; снижение гемоглобина — нечасто

Источники карточки и статус

Справочная дата в прежней базе: 2026-10-21. Актуальный статус регистрационного удостоверения отдельно не проверен.

Справочная ссылка: https://www.vidal.ru/drugs/aviandr

Дополнительная ссылка:
https://apteka.ru/product/aviandr-20-mg-30-sht-blister-tabletki-pokrytye-plenochnoj-obolochkoj-6511af41e22d532358eca04c/

Эсциталопрам

МНН
Эсциталопрам

Производитель (из пользовательского текста)
Пранафарм ООО

Форма
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

Доза / упаковка
10 мг, 30 шт.

Регистрационный номер, указанный пользователем
ЛП-№(010581)-(РГ-RU)

АТХ
N06AB10

Сокращённые редакционные разделы. Полноту всех противопоказаний, доз, нежелательных реакций и взаимодействий сверять по актуальной инструкции именно выбранного торгового наименования и РУ.

ВАЖНО: данные из инструкции присланной формы

Режим/применение: В присланной инструкции: обычно 10 мг 1 раз в сутки, независимо от еды; для панического расстройства описано начало с 5 мг/сут в первую неделю. Решения о дозе принимает врач.

Особые ограничения: Не сочетать с неселективными необратимыми ИМАО и пимозидом; учитывать риск серотонинового синдрома, удлинения QT, кровотечений, гипонатриемии и суицидальных явлений в начале лечения.

Сочетания: В листке-вкладыше гидроксизина эсциталопрам назван среди противопоказанных сочетаний ввиду риска QT / аритмии типа «пируэт». Кроме того, возможны взаимодействия с серотонинергическими препаратами и ингибиторами CYP2C19.

Группа

Антидепрессант; селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС). АТХ N06AB10.

Показания

В сводном описании действующего вещества: депрессивные эпизоды, панические расстройства (включая агорафобию); более широкий перечень показаний конкретной формы сверять по утверждённой инструкции. Клиническое применение при ГТР не означает автоматически одинаковый объём показаний каждого бренда.

Способ применения и дозы

Внутрь, независимо от еды, обычно 10 мг однократно в сутки; по показаниям и переносимости до 20 мг/сут. Пожилым и при печёночной недостаточности часто требуются меньшие стартовые дозы (например, 5 мг). Отменять постепенно, индивидуально.

Состав (справочное описание)

На 1 таб. 10 мг эсциталопрама (12,77 мг эсциталопрама оксалата). Наполнители: тальк, кроскармеллоза натрия, микрокристаллическая целлюлоза, коллоидный диоксид кремния, стеарат магния; оболочка: гипромеллоза, макрогол 400, диоксид титана.

Противопоказания

Гиперчувствительность; совместное назначение с ИМАО. Дополнительные запреты и ограничения по QT/сочетаниям должны сверяться именно с действующей ОХЛП выбранного бренда; возрастные ограничения.

Особые указания

Контроль суицидальности в начале терапии, возможной мании/гипомании, судорожных приступов и гипонатриемии. Осторожность при риске кровотечений, удлинения QT и глаукомы; синдром отмены при резком прекращении.

Побочные действия

ЖКТ: диарея, желудочно-кишечное кровотечение, запор, рвота, сухость во рту, тошнота
Кожа и потоотделение: ангионевротический отек, выпадение волос, зуд, крапивница, повышенная потливость, сыпь
Мышцы и опорно-двигательная: мышечная боль, суставная боль
Нервная система: акатизия, головокружение, нарушение вкуса, обморок, парестезия, серотониновый синдром, судороги, тремор
Обмен веществ и питание: гипонатриемия, изменение массы тела, снижение аппетита
Общие симптомы: лихорадка, отёки, слабость
Печень и почки: задержка мочи, повышение печёночных ферментов
Психика и сон: ажитация, бессонница, бруксизм, мания, необычные сновидения, сонливость, суицидальные мысли, тревожность
Сексуальная и репродуктивная: галакторея, маточное кровотечение, нарушение эякуляции, снижение либидо, эректильная дисфункция
Сердце и сосуды: кровоточивость, удлинение интервала QT

Взаимодействия с другими лекарствами

ИМАО — противопоказание; серотонинергические средства/трамадол/триптаны/зверобой — риск серотонинового синдрома; антикоагулянты/НПВП — кровотечения; омепразол и ингибиторы CYP2C19 изменяют концентрации; другие средства, удлиняющие QT, требуют отдельной проверки.

Фармакодинамика

Селективно ингибирует SERT — переносчик серотонина, увеличивая серотонинергическую передачу. Выраженный эффект формируется постепенно, в течение нескольких недель.

Условия хранения

В описании выбранной формы — не выше 25 °C.

Срок годности

Срок годности конкретного бренда и дозировки сверить в актуальном листке-вкладыше/ОХЛП.

Фармаконадзор

Контакт уполномоченной организации — проверить по ОХЛП/листку-вкладышу текущей партии.

Нежелательные реакции по системам (45) · демобаза

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ДЕМО: частоты не переносятся автоматически между брендами, формами выпуска или редакциями инструкций. Каждая запись требует сверки по ОХЛП именно выбранного РУ перед назначением.

ЖКТ (6):
тошнота — частота требует уточнения; диарея — частота требует уточнения; запор — частота требует уточнения; рвота — частота требует уточнения; сухость во рту — частота требует уточнения; желудочно-кишечное кровотечение — частота требует уточнения

Нервная система (8):
головокружение — частота требует уточнения; парестезия — частота требует уточнения; тремор — частота требует уточнения; нарушение вкуса — частота требует уточнения; обморок — частота требует уточнения; серотониновый синдром — частота требует уточнения; судороги — частота требует уточнения; акатизия — частота требует уточнения

Психика и сон (8):
бессонница — частота требует уточнения; сонливость — частота требует уточнения; тревожность — частота требует уточнения; ажитация — частота требует уточнения; бруксизм — частота требует уточнения; необычные сновидения — частота требует уточнения; мания — частота требует уточнения; суицидальные мысли — частота требует уточнения

Кожа и потоотделение (6):
повышенная потливость — частота требует уточнения; сыпь — частота требует уточнения; зуд — частота требует уточнения; крапивница — частота требует уточнения; выпадение волос — частота требует уточнения; ангионевротический отек — частота требует уточнения

Мышцы и опорно-двигательная (2):
мышечная боль — частота требует уточнения; суставная боль — частота требует уточнения

Сексуальная и репродуктивная (5):
снижение либидо — частота требует уточнения; нарушение эякуляции — частота требует уточнения; эректильная дисфункция — частота требует уточнения; маточное кровотечение — частота требует уточнения; галакторея — частота требует уточнения

Обмен веществ и питание (3):
снижение аппетита — частота требует уточнения; изменение массы тела — частота требует уточнения; гипонатриемия — частота требует уточнения

Общие симптомы (3):
слабость — частота требует уточнения; лихорадка — частота требует уточнения; отёки — частота требует уточнения

Сердце и сосуды (2):
удлинение интервала QT — частота требует уточнения; кровоточивость — частота требует уточнения

Печень и почки (2):
повышение печёночных ферментов — частота требует уточнения; задержка мочи — частота требует уточнения

Источники карточки и статус

Справочная дата в прежней базе: 2026-10-21. Актуальный статус регистрационного удостоверения отдельно не проверен.

Справочная ссылка: https://www.vidal.ru/drugs/cipralex__3385

Сертралин

МНН
Сертралин

Производитель (из пользовательского текста)
Фармпроект АО

Форма
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

Доза / упаковка
50 мг, 28 шт.

Регистрационный номер, указанный пользователем
ЛП-№(010928)-(РГ-RU)

АТХ
N06AB06

Сокращённые редакционные разделы. Полноту всех противопоказаний, доз, нежелательных реакций и взаимодействий сверять по актуальной инструкции именно выбранного торгового наименования и РУ.

ВАЖНО: данные из инструкции присланной формы

Режим/применение: В присланной инструкции указано начало лечения депрессии и ОКР с 50 мг один раз в сутки, утром или вечером, независимо от еды. Коррекции описаны с интервалами не менее недели.

Особые ограничения: Противопоказаны ИМАО и пимозид. Возможны серотониновый синдром, кровотечения, нарушения натрия, QT у предрасположенных пациентов и симптомы при прекращении терапии.

Сочетания: Для конкретного листка-вкладыша приведено применение при ОКР у подростков от 13 лет; этот пункт нельзя автоматически переносить на другие торговые формы и показания.

Группа

Антидепрессант; СИОЗС. АТХ N06AB06.

Показания

Депрессивные расстройства; для сертралина в разных утверждённых инструкциях также представлены ОКР, панические и некоторые другие тревожные расстройства. Объём зарегистрированных показаний у конкретной Асентры сверить по ОХЛП.

Способ применения и дозы

При депрессии часто начинают с 50 мг 1 раз/сут внутрь; при некоторых тревожных показаниях — с 25 мг/сут с последующим увеличением. При необходимости постепенное повышение до 200 мг/сут под контролем врача; отмена постепенная.

Состав (справочное описание)

На 1 таб. 50 мг сертралина (55,95 мг гидрохлорида). Вспомогательные: кальция гидрофосфат дигидрат, микрокристаллическая целлюлоза, карбоксиметилкрахмал натрия, гипролоза, тальк, стеарат магния; оболочка: гипромеллоза, диоксид титана, тальк, пропиленгликоль.

Противопоказания

Повышенная чувствительность; совместный приём ИМАО, а также пимозида; возрастные ограничения различаются по показаниям; дополнительную информацию см. в конкретной ОХЛП.

Особые указания

Мониторинг суицидального риска на старте, активации/тревоги, мании, судорог, гипонатриемии, кровотечений; при отмене возможны головокружение, парестезии, нарушения сна.

Побочные действия

ЖКТ: боль в животе, диарея, запор, метеоризм, панкреатит, рвота, сухость во рту, тошнота
Кожа и потоотделение: ангионевротический отек, выпадение волос, зуд, крапивница, повышенная потливость, сыпь
Лабораторные изменения: лейкопения, повышение печёночных ферментов, тромбоцитопения
Мышцы и опорно-двигательная: мышечные судороги, суставная боль
Нервная система: акатизия, головная боль, головокружение, мигрень, нарушение походки, обморок, парестезия, серотониновый синдром, тремор
Обмен веществ и питание: гипонатриемия, изменение массы тела, снижение аппетита, увеличение аппетита
Общие симптомы: периферические отёки, слабость
Психика и сон: ажитация, бессонница, галлюцинации, гипомания, мания, ночные кошмары, сонливость, суицидальные мысли, тревога
Сексуальная и репродуктивная: нарушение эякуляции, снижение либидо, эректильная дисфункция
Сердце и сосуды: кровотечения, повышение артериального давления, сердцебиение, тахикардия

Взаимодействия с другими лекарствами

ИМАО и пимозид — несовместимость; другие серотонинергические препараты — риск серотониновой токсичности; НПВП/антикоагулянты — кровотечения; лекарственные взаимодействия CYP и алкоголь — дополнительная проверка.

Фармакодинамика

Избирательный ингибитор обратного захвата серотонина; оказывает антидепрессивное действие, терапевтический ответ оценивают в динамике нескольких недель.

Условия хранения

Не выше 25 °C.

Срок годности

Проверить по актуальному листку-вкладышу бренда/серии.

Фармаконадзор

Контакт представительства KRKA/уполномоченного лица по листку-вкладышу текущей партии.

Нежелательные реакции по системам (50) · демобаза

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ДЕМО: частоты не переносятся автоматически между брендами, формами выпуска или редакциями инструкций. Каждая запись требует сверки по ОХЛП именно выбранного РУ перед назначением.

ЖКТ (8):
тошнота — частота требует уточнения; рвота — частота требует уточнения; диарея — частота требует уточнения; запор — частота требует уточнения; метеоризм — частота требует уточнения; боль в животе — частота требует уточнения; сухость во рту — частота требует уточнения; панкреатит — частота требует уточнения

Нервная система (9):
головная боль — частота требует уточнения; головокружение — частота требует уточнения; тремор — частота требует уточнения; парестезия — частота требует уточнения; мигрень — частота требует уточнения; нарушение походки — частота требует уточнения; акатизия — частота требует уточнения; обморок — частота требует уточнения; серотониновый синдром — частота требует уточнения

Психика и сон (9):
бессонница — частота требует уточнения; сонливость — частота требует уточнения; тревога — частота требует уточнения; ажитация — частота требует уточнения; ночные кошмары — частота требует уточнения; гипомания — частота требует уточнения; мания — частота требует уточнения; галлюцинации — частота требует уточнения; суицидальные мысли — частота требует уточнения

Кожа и потоотделение (6):
повышенная потливость — частота требует уточнения; сыпь — частота требует уточнения; зуд — частота требует уточнения; крапивница — частота требует уточнения; выпадение волос — частота требует уточнения; ангионевротический отек — частота требует уточнения

Обмен веществ и питание (4):
снижение аппетита — частота требует уточнения; увеличение аппетита — частота требует уточнения; изменение массы тела — частота требует уточнения; гипонатриемия — частота требует уточнения

Сексуальная и репродуктивная (3):
снижение либидо — частота требует уточнения; эректильная дисфункция — частота требует уточнения; нарушение эякуляции — частота требует уточнения

Сердце и сосуды (4):
сердцебиение — частота требует уточнения; тахикардия — частота требует уточнения; повышение артериального давления — частота требует уточнения; кровотечения — частота требует уточнения

Мышцы и опорно-двигательная (2):
суставная боль — частота требует уточнения; мышечные судороги — частота требует уточнения

Общие симптомы (2):
слабость — частота требует уточнения; периферические отёки — частота требует уточнения

Лабораторные изменения (3):
повышение печёночных ферментов — частота требует уточнения; лейкопения — частота требует уточнения; тромбоцитопения — частота требует уточнения

Источники карточки и статус

Справочная дата в прежней базе: 2026-10-21. Актуальный статус регистрационного удостоверения отдельно не проверен.

Справочная ссылка: https://www.vidal.ru/drugs/asentra__2861

Флуоксетин

МНН
Флуоксетин

Производитель (из пользовательского текста)
Производство медикаментов ООО

Форма
капсулы

Доза / упаковка
20 мг, 20 шт.

Регистрационный номер, указанный пользователем
ЛП-№(011894)-(РГ-RU)

АТХ
N06AB03

Сокращённые редакционные разделы. Полноту всех противопоказаний, доз, нежелательных реакций и взаимодействий сверять по актуальной инструкции именно выбранного торгового наименования и РУ.

ВАЖНО: данные из инструкции присланной формы

Режим/применение: В присланной инструкции: для депрессии старт с 20 мг один раз утром; при иных показаниях и ответе на терапию схемы могут отличаться.

Особые ограничения: ИМАО, пимозид и тиоридазин указаны среди противопоказаний. Учитывать длительный период полувыведения флуоксетина и норфлуоксетина, особенно при переключении лекарств.

Сочетания: Флуоксетин ингибирует CYP2D6 и может изменять экспозицию других психотропных препаратов; комбинации с серотонинергическими препаратами требуют проверки риска серотонинового синдрома.

Группа

Антидепрессант; СИОЗС. АТХ N06AB03.

Показания

Депрессивные расстройства; обсессивно-компульсивное расстройство и нервная булимия — в инструкциях определённых препаратов флуоксетина. Наличие конкретного показания сверяется по ОХЛП выбранной формы.

Способ применения и дозы

Внутрь, часто начальная доза при депрессии 20 мг/сут, коррекция после оценки эффекта/переносимости. Максимальные дозы и схемы при ОКР/булимии зависят от показания; длительное выведение требует увеличенных интервалов при переключении на ИМАО.

Состав (справочное описание)

Каждая капсула содержит 20 мг флуоксетина в форме гидрохлорида. Полный вспомогательный состав и красители оболочки не детализированы в выбранной сводной карточке Видаля: нужна ОХЛП конкретной капсулы.

Противопоказания

Гиперчувствительность; ИМАО и обязательные интервалы переключения; другие противопоказанные сочетания (в том числе некоторые нейролептики) и ограничения по возрасту/беременности сверить в полной ОХЛП.

Особые указания

На старте возможна активация, тревога, бессонница, суицидальные мысли; проверять биполярный спектр, гипонатриемию и склонность к кровотечениям; учитывать длительный период полувыведения даже после отмены.

Побочные действия

ЖКТ: диарея, диспепсия, затруднение глотания, изменение вкуса, рвота, сухость во рту, тошнота
Зрение и органы чувств: нечёткое зрение
Кожа и потоотделение: ангионевротический отёк, выпадение волос, зуд, кожная сыпь, крапивница, повышенная потливость
Нервная система: акатизия, головная боль, головокружение, нарушение внимания, нарушение координации, серотониновый синдром, сонливость, судороги, тремор
Обмен веществ и питание: гипонатриемия, снижение аппетита, уменьшение массы тела
Общие симптомы: астения, утомляемость
Печень и почки: гепатит, затруднение мочеиспускания, учащенное мочеиспускание
Психика и сон: ажитация, бессонница, мания, необычные сновидения, нервозность, раздражительность, суицидальные мысли, тревога
Сексуальная и репродуктивная: маточное кровотечение, нарушение менструального цикла, нарушение оргазма, нарушение эякуляции, снижение либидо, эректильная дисфункция
Сердце и сосуды: ортостатическая гипотензия, приливы, сердцебиение, склонность к синякам, тахикардия

Взаимодействия с другими лекарствами

Выраженное ингибирование CYP2D6: возможное увеличение концентрации трициклических антидепрессантов и других субстратов. ИМАО и серотонинергические препараты — риск серотонинового синдрома; антикоагулянты/НПВП — кровотечения; потенциальные опасные сочетания с некоторыми средствами, удлиняющими QT.

Фармакодинамика

Селективное торможение обратного захвата серотонина; активный метаболит норфлуоксетин и длительный период выведения определяют продолжительное действие и взаимодействия.

Условия хранения

Обычно до 25 °C для выбранной капсульной формы.

Срок годности

Проверить по действующей ОХЛП/маркировке ОЗОН.

Фармаконадзор

Для выбранного флуоксетина ОЗОН точное уполномоченное лицо проверить в ОХЛП.

Нежелательные реакции по системам (50) · демобаза

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ДЕМО: частоты не переносятся автоматически между брендами, формами выпуска или редакциями инструкций. Каждая запись требует сверки по ОХЛП именно выбранного РУ перед назначением.

Нервная система (9):
головная боль — частота требует уточнения; головокружение — частота требует уточнения; тремор — частота требует уточнения; нарушение внимания — частота требует уточнения; сонливость — частота требует уточнения; нарушение координации — частота требует уточнения; акатизия — частота требует уточнения; судороги — частота требует уточнения; серотониновый синдром — частота требует уточнения

Психика и сон (8):
бессонница — частота требует уточнения; тревога — частота требует уточнения; раздражительность — частота требует уточнения; нервозность — частота требует уточнения; ажитация — частота требует уточнения; необычные сновидения — частота требует уточнения; суицидальные мысли — частота требует уточнения; мания — частота требует уточнения

ЖКТ (7):
тошнота — частота требует уточнения; диарея — частота требует уточнения; рвота — частота требует уточнения; диспепсия — частота требует уточнения; сухость во рту — частота требует уточнения; изменение вкуса — частота требует уточнения; затруднение глотания — частота требует уточнения

Обмен веществ и питание (3):
снижение аппетита — частота требует уточнения; уменьшение массы тела — частота требует уточнения; гипонатриемия — частота требует уточнения

Кожа и потоотделение (6):
повышенная потливость — частота требует уточнения; зуд — частота требует уточнения; кожная сыпь — частота требует уточнения; крапивница — частота требует уточнения; выпадение волос — частота требует уточнения; ангионевротический отёк — частота требует уточнения

Сексуальная и репродуктивная (6):
снижение либидо — частота требует уточнения; нарушение оргазма — частота требует уточнения; эректильная дисфункция — частота требует уточнения; нарушение эякуляции — частота требует уточнения; нарушение менструального цикла — частота требует уточнения; маточное кровотечение — частота требует уточнения

Сердце и сосуды (5):
сердцебиение — частота требует уточнения; тахикардия — частота требует уточнения; ортостатическая гипотензия — частота требует уточнения; приливы — частота требует уточнения; склонность к синякам — частота требует уточнения

Зрение и органы чувств (1):
нечёткое зрение — частота требует уточнения

Печень и почки (3):
гепатит — частота требует уточнения; затруднение мочеиспускания — частота требует уточнения; учащенное мочеиспускание — частота требует уточнения

Общие симптомы (2):
утомляемость — частота требует уточнения; астения — частота требует уточнения

Источники карточки и статус

Справочная дата в прежней базе: 2026-10-21. Актуальный статус регистрационного удостоверения отдельно не проверен.

Справочная ссылка: https://www.vidal.ru/drugs/fluoxetine__21150

Флувоксамин-СЗ

МНН
Флувоксамин

Производитель (из пользовательского текста)
Северная Звезда НАО

Форма
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

Доза / упаковка
100 мг, 30 шт.

Регистрационный номер, указанный пользователем
ЛП-№(008323)-(РГ-RU)

АТХ
N06AB08

Сокращённые редакционные разделы. Полноту всех противопоказаний, доз, нежелательных реакций и взаимодействий сверять по актуальной инструкции именно выбранного торгового наименования и РУ.

ВАЖНО: данные из инструкции присланной формы

Режим/применение: В присланной инструкции взрослым описано начало с 50 или 100 мг вечером при депрессии, дальнейшее изменение индивидуально.

Особые ограничения: Среди ограничений указаны ИМАО, тизанидин, пимозид, рамелтеон (проверить текущую редакцию для конкретного РУ).

Сочетания: Флувоксамин — мощный ингибитор CYP1A2. Его сочетание с агомелатином и дулоксетином указано как противопоказанное в представленных инструкциях этих препаратов; возможно повышение концентрации буспирона.

Группа

Антидепрессант; СИОЗС. АТХ N06AB08.

Показания

Для Феварина: депрессия различного генеза — взрослым; ОКР — взрослым и детям с 8 лет по соответствующему режиму. Не распространять детские показания на лечение депрессии.

Способ применения и дозы

Внутрь; при депрессии у взрослых в инструкции обычно старт 50–100 мг/сут, с постепенным подбором. При ОКР схемы и возрастные дозировки отличаются. Таблетки не разжёвывают; отмена постепенная. Точную титрацию и пределы взять из ОХЛП по возрасту и диагнозу.

Состав (справочное описание)

На 1 таб. 50 мг флувоксамина (в форме малеата); маннитол, кукурузный и прежелатинизированный крахмалы, натрия стеарилфумарат, коллоидный диоксид кремния; оболочка: гипромеллоза, макрогол 6000, тальк, диоксид титана.

Противопоказания

Гиперчувствительность; сочетание с тизанидином, ИМАО, пимозидом, рамелтеоном; депрессия до 18 лет, ОКР до 8 лет. При переключении с/на ИМАО выдерживать интервалы из инструкции.

Особые указания

Наблюдение за суицидальным риском, манией, судорогами, кровотечениями, гипонатриемией; синдром отмены. Возможна тошнота в начале лечения. При выраженном употреблении кофеина — внимание к усилению его действия.

Побочные действия

ЖКТ: боль в животе, диарея, диспепсия, запор, рвота, сухость во рту, тошнота
Кожа и потоотделение: зуд, кожная сыпь, повышенная потливость
Нервная система: акатизия, атаксия, головная боль, головокружение, парестезия, серотониновый синдром, сонливость, судороги, тремор, экстрапирамидные нарушения
Обмен веществ и питание: гипонатриемия, снижение аппетита, снижение массы тела, увеличение массы тела
Общие симптомы: астения, недомогание
Психика и сон: беспокойство, бессонница, галлюцинации, мания, повышенная возбудимость, раздражительность, спутанность сознания, суицидальные мысли, тревога
Сексуальная и репродуктивная: маточное кровотечение, нарушение эякуляции, сексуальная дисфункция, снижение либидо
Сердце и сосуды: кровоточивость, сердцебиение, тахикардия
Эндокринная система: гиперпролактинемия, синдром неадекватной секреции АДГ

Взаимодействия с другими лекарствами

Сильное торможение отдельных CYP-ферментов (в частности CYP1A2/2C19) — многочисленные взаимодействия. Несовместимость с тизанидином, ИМАО, пимозидом и рамелтеоном; потенциальный рост экспозиции агомелатина; серотонинергические средства — серотониновый синдром; варфарин/антикоагулянты — кровотечения; кофеин.

Фармакодинамика

Сильное ингибирование обратного захвата серотонина, практически без значимой прямой активности на основные другие рецепторы; возможны многочисленные метаболические взаимодействия.

Условия хранения

Не выше 25 °C.

Срок годности

3 года по ОХЛП Феварина (Видаль, обновление 28.02.2026).

Фармаконадзор

ООО «Эбботт Лэбораториз», Москва, Ленинградское ш., 16А, стр. 1; +7 (495) 258-42-80; abbott-russia@abbott.com (по Видалю).

Нежелательные реакции по системам (44) · демобаза

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ДЕМО: частоты не переносятся автоматически между брендами, формами выпуска или редакциями инструкций. Каждая запись требует сверки по ОХЛП именно выбранного РУ перед назначением.

Нервная система (10):
головная боль — частота требует уточнения; головокружение — частота требует уточнения; тремор — частота требует уточнения; сонливость — частота требует уточнения; атаксия — частота требует уточнения; экстрапирамидные нарушения — частота требует уточнения; парестезия — частота требует уточнения; акатизия — частота требует уточнения; серотониновый синдром — частота требует уточнения; судороги — частота требует уточнения

Психика и сон (9):
бессонница — частота требует уточнения; тревога — частота требует уточнения; повышенная возбудимость — частота требует уточнения; беспокойство — частота требует уточнения; раздражительность — частота требует уточнения; галлюцинации — частота требует уточнения; спутанность сознания — частота требует уточнения; мания — частота требует уточнения; суицидальные мысли — частота требует уточнения

ЖКТ (7):
тошнота — частота требует уточнения; рвота — частота требует уточнения; диарея — частота требует уточнения; запор — частота требует уточнения; сухость во рту — частота требует уточнения; диспепсия — частота требует уточнения; боль в животе — частота требует уточнения

Обмен веществ и питание (4):
снижение аппетита — частота требует уточнения; снижение массы тела — частота требует уточнения; увеличение массы тела — частота требует уточнения; гипонатриемия — частота требует уточнения

Кожа и потоотделение (3):
повышенная потливость — частота требует уточнения; кожная сыпь — частота требует уточнения; зуд — частота требует уточнения

Сердце и сосуды (3):
сердцебиение — частота требует уточнения; тахикардия — частота требует уточнения; кровоточивость — частота требует уточнения

Сексуальная и репродуктивная (4):
снижение либидо — частота требует уточнения; сексуальная дисфункция — частота требует уточнения; нарушение эякуляции — частота требует уточнения; маточное кровотечение — частота требует уточнения

Эндокринная система (2):
гиперпролактинемия — частота требует уточнения; синдром неадекватной секреции АДГ — частота требует уточнения

Общие симптомы (2):
астения — частота требует уточнения; недомогание — частота требует уточнения

Источники карточки и статус

Справочная дата в прежней базе: 2026-10-21. Актуальный статус регистрационного удостоверения отдельно не проверен.

Справочная ссылка: https://www.vidal.ru/drugs/fevarin__1698

Венлафаксин

МНН
Венлафаксин

Производитель (из пользовательского текста)
ОЗОН ООО

Форма
таблетки

Доза / упаковка
37,5 мг, 30 шт.

Регистрационный номер, указанный пользователем
ЛП-№(011461)-(РГ-RU)

АТХ
N06AX16

Сокращённые редакционные разделы. Полноту всех противопоказаний, доз, нежелательных реакций и взаимодействий сверять по актуальной инструкции именно выбранного торгового наименования и РУ.

ВАЖНО: данные из инструкции присланной формы

Режим/применение: Для представленных таблеток немедленного высвобождения указано начало с 37,5 мг дважды в сутки во время еды. Не путать с формами пролонгированного высвобождения.

Особые ограничения: Не сочетать с ИМАО. Учитывать риски повышения АД, тахикардии, серотонинового синдрома, суицидальных явлений и синдрома отмены.

Сочетания: Дозозависимые эффекты на давление и частоту пульса требуют наблюдения. При других серотонинергических лекарствах необходима врачебная оценка.

Группа

Антидепрессант; ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН). АТХ N06AX16.

Показания

Депрессивные расстройства; зарегистрированные показания отличаются между пролонгированными и немодифицированными формами: тревожные показания требуют проверки именно выбранной Алвенты.

Способ применения и дозы

Для Алвенты (пролонгированные капсулы) нужен режим именно ER/XR — обычно однократно в сутки во время еды; старт при депрессии нередко 75 мг/сут с дальнейшей титрацией. НЕ переносить двухкратную схему для обычных таблеток венлафаксина на пролонгированные капсулы.

Состав (справочное описание)

Для капсулы 75 мг: венлафаксина гидрохлорид 84,85 мг (эквивалентно венлафаксину 75 мг). Пеллеты: сахарная крупка, гипролоза, повидон K30, этилцеллюлоза, дибутилсебакат, тальк; оболочка: желатин, диоксид титана, оксиды железа. Содержит сахарозу.

Противопоказания

Гиперчувствительность; совместное применение с ИМАО; выраженная печёночная/почечная недостаточность и возраст до 18 лет по применимой инструкции; беременность и лактация — дополнительные ограничения.

Особые указания

Важен контроль артериального давления и ЧСС, суицидального риска, мании, гипонатриемии, кровотечений; при резкой отмене выраженный синдром прекращения терапии. Проверять глотание капсулы и особенности ER-формы.

Побочные действия

ЖКТ: боль в животе, диарея, диспепсия, запор, рвота, сухость во рту, тошнота
Зрение и органы чувств: нарушение аккомодации, нечеткость зрения
Кожа и потоотделение: зуд, кожная сыпь, повышенная потливость
Нервная система: головная боль, головокружение, нарушение внимания, парестезия, серотониновый синдром, судороги, тремор
Обмен веществ и питание: гипонатриемия, изменение массы тела, повышение холестерина, снижение аппетита
Общие симптомы: астения, синдром отмены, утомляемость
Психика и сон: ажитация, бессонница, мания, необычные сновидения, нервозность, сонливость, суицидальные мысли, тревожность
Сексуальная и репродуктивная: нарушение эякуляции, нарушения менструального цикла, снижение либидо, эректильная дисфункция
Сердце и сосуды: кровотечение, ортостатическая гипотензия, повышение артериального давления, тахикардия, учащенное сердцебиение

Взаимодействия с другими лекарствами

ИМАО противопоказаны; другие серотонинергические препараты повышают риск токсичности; препараты, влияющие на CYP2D6/3A4, могут менять экспозицию; НПВП и антикоагулянты — кровотечения; алкоголь и другие центрально действующие средства — контроль.

Фармакодинамика

Блокирует обратный захват серотонина и норадреналина; активный метаболит О-десметилвенлафаксин. На эффекты может влиять CYP2D6.

Условия хранения

Не выше 25 °C.

Срок годности

Точный срок годности проверить по маркировке конкретной Алвенты.

Фармаконадзор

Контакт представительства KRKA по листку-вкладышу выбранной партии.

Нежелательные реакции по системам (43) · демобаза

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ДЕМО: частоты не переносятся автоматически между брендами, формами выпуска или редакциями инструкций. Каждая запись требует сверки по ОХЛП именно выбранного РУ перед назначением.

ЖКТ (7):
тошнота — частота требует уточнения; рвота — частота требует уточнения; запор — частота требует уточнения; диарея — частота требует уточнения; сухость во рту — частота требует уточнения; боль в животе — частота требует уточнения; диспепсия — частота требует уточнения

Нервная система (7):
головная боль — частота требует уточнения; головокружение — частота требует уточнения; тремор — частота требует уточнения; парестезия — частота требует уточнения; нарушение внимания — частота требует уточнения; судороги — частота требует уточнения; серотониновый синдром — частота требует уточнения

Психика и сон (8):
бессонница — частота требует уточнения; сонливость — частота требует уточнения; нервозность — частота требует уточнения; тревожность — частота требует уточнения; ажитация — частота требует уточнения; необычные сновидения — частота требует уточнения; суицидальные мысли — частота требует уточнения; мания — частота требует уточнения

Сердце и сосуды (5):
повышение артериального давления — частота требует уточнения; учащенное сердцебиение — частота требует уточнения; тахикардия — частота требует уточнения; ортостатическая гипотензия — частота требует уточнения; кровотечение — частота требует уточнения

Кожа и потоотделение (3):
повышенная потливость — частота требует уточнения; кожная сыпь — частота требует уточнения; зуд — частота требует уточнения

Обмен веществ и питание (4):
снижение аппетита — частота требует уточнения; изменение массы тела — частота требует уточнения; гипонатриемия — частота требует уточнения; повышение холестерина — частота требует уточнения

Сексуальная и репродуктивная (4):
снижение либидо — частота требует уточнения; нарушение эякуляции — частота требует уточнения; эректильная дисфункция — частота требует уточнения; нарушения менструального цикла — частота требует уточнения

Зрение и органы чувств (2):
нечеткость зрения — частота требует уточнения; нарушение аккомодации — частота требует уточнения

Общие симптомы (3):
утомляемость — частота требует уточнения; астения — частота требует уточнения; синдром отмены — частота требует уточнения

Источники карточки и статус

Справочная дата в прежней базе: 2026-10-21. Актуальный статус регистрационного удостоверения отдельно не проверен.

Справочная ссылка: https://www.vidal.ru/drugs/alventa__18768

Дулоксетин Канон

МНН
Дулоксетин

Производитель (из пользовательского текста)
Канонфарма продакшн ЗАО

Форма
капсулы кишечнорастворимые

Доза / упаковка
60 мг, 28 шт.

Регистрационный номер, указанный пользователем
ЛП-№(009077)-(РГ-RU)

АТХ
N06AX21

Сокращённые редакционные разделы. Полноту всех противопоказаний, доз, нежелательных реакций и взаимодействий сверять по актуальной инструкции именно выбранного торгового наименования и РУ.

ВАЖНО: данные из инструкции присланной формы

Режим/применение: В присланной инструкции для депрессии указано 60 мг один раз в сутки; при ГТР и болевых синдромах стартовые схемы могут отличаться.

Особые ограничения: Противопоказаны ИМАО, неконтролируемая гипертензия, тяжёлое нарушение функции почек, болезни печени с недостаточностью и мощные ингибиторы CYP1A2.

Сочетания: Совместное применение с флувоксамином (мощный ингибитор CYP1A2) противопоказано: в присланной инструкции описано значительное увеличение экспозиции дулоксетина.

Группа

Антидепрессант; СИОЗСН. АТХ N06AX21.

Показания

Депрессия; генерализованное тревожное расстройство; болевая форма диабетической периферической невропатии; некоторые хронические болевые синдромы — в зависимости от утверждённого перечня формы.

Способ применения и дозы

Капсулы принимают внутрь целиком; часто 60 мг один раз в сутки у взрослых, при отдельных показаниях возможен старт с 30 мг. По оценке эффекта предел может достигать 120 мг/сут. Не вскрывать и не дробить кишечнорастворимые пеллеты без указания ОХЛП.

Состав (справочное описание)

Для капсулы 30 мг: дулоксетин (гидрохлорид 33,675 мг, эквивалент 30 мг); сахарная крупка, гипромеллоза, сахароза, фталат гипромеллозы, тальк, триэтилцитрат; оболочка желатиновая с диоксидом титана и индигокармином. Для 60 мг состав оболочки другой.

Противопоказания

Гиперчувствительность; ИМАО; совместное применение с сильными ингибиторами CYP1A2 (например, флувоксамин, ципрофлоксацин) — противопоказано в ряде ОХЛП; тяжёлое нарушение функции почек, печёночные заболевания, неконтролируемая гипертензия — проверить конкретную инструкцию.

Особые указания

Контроль АД, суицидальности, мании, функции печени при симптомах поражения, гипонатриемии и риска кровотечений. Возможны задержка мочи, сексуальные нарушения и синдром отмены. Суицидальный и печёночный риск оценивать независимо от выбора Авиандра.

Побочные действия

ЖКТ: боль в животе, диарея, запор, рвота, сухость во рту, тошнота
Зрение и органы чувств: нечеткое зрение
Кожа и потоотделение: зуд, повышенная потливость, сыпь
Нервная система: головная боль, головокружение, парестезия, серотониновый синдром, сонливость, тремор
Обмен веществ и питание: гипонатриемия, изменение массы тела, снижение аппетита
Общие симптомы: астения, зевота, синдром отмены, утомляемость
Печень и почки: затруднение мочеиспускания, повышение печеночных ферментов, поражение печени
Психика и сон: ажитация, бессонница, мания, суицидальные мысли, тревожность
Сексуальная и репродуктивная: задержка эякуляции, нарушение оргазма, снижение либидо, эректильная дисфункция
Сердце и сосуды: ортостатическая гипотензия, ощущение сердцебиения, повышение артериального давления

Взаимодействия с другими лекарствами

ИМАО и сильные ингибиторы CYP1A2 — недопустимые сочетания по утверждённым инструкциям; серотонинергические препараты — риск серотонинового синдрома; ингибиторы CYP2D6 могут повышать экспозицию; НПВП/антикоагулянты — кровотечения.

Фармакодинамика

Тормозит SERT и NET, усиливая серотонинергическую и норадренергическую передачу; участвует в центральной модуляции нейропатической боли.

Условия хранения

Не выше 25 °C.

Срок годности

Срок годности по ОХЛП конкретной упаковки Дулоксенты.

Фармаконадзор

Контакт представительства KRKA по текущему листку-вкладышу.

Нежелательные реакции по системам (38) · демобаза

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ДЕМО: частоты не переносятся автоматически между брендами, формами выпуска или редакциями инструкций. Каждая запись требует сверки по ОХЛП именно выбранного РУ перед назначением.

ЖКТ (6):
тошнота — частота требует уточнения; сухость во рту — частота требует уточнения; запор — частота требует уточнения; диарея — частота требует уточнения; боль в животе — частота требует уточнения; рвота — частота требует уточнения

Нервная система (6):
головная боль — частота требует уточнения; головокружение — частота требует уточнения; сонливость — частота требует уточнения; тремор — частота требует уточнения; парестезия — частота требует уточнения; серотониновый синдром — частота требует уточнения

Психика и сон (5):
бессонница — частота требует уточнения; ажитация — частота требует уточнения; тревожность — частота требует уточнения; суицидальные мысли — частота требует уточнения; мания — частота требует уточнения

Кожа и потоотделение (3):
повышенная потливость — частота требует уточнения; сыпь — частота требует уточнения; зуд — частота требует уточнения

Обмен веществ и питание (3):
снижение аппетита — частота требует уточнения; изменение массы тела — частота требует уточнения; гипонатриемия — частота требует уточнения

Сексуальная и репродуктивная (4):
снижение либидо — частота требует уточнения; эректильная дисфункция — частота требует уточнения; задержка эякуляции — частота требует уточнения; нарушение оргазма — частота требует уточнения

Сердце и сосуды (3):
ощущение сердцебиения — частота требует уточнения; повышение артериального давления — частота требует уточнения; ортостатическая гипотензия — частота требует уточнения

Зрение и органы чувств (1):
нечеткое зрение — частота требует уточнения

Печень и почки (3):
поражение печени — частота требует уточнения; повышение печеночных ферментов — частота требует уточнения; затруднение мочеиспускания — частота требует уточнения

Общие симптомы (4):
утомляемость — частота требует уточнения; астения — частота требует уточнения; синдром отмены — частота требует уточнения; зевота — частота требует уточнения

Источники карточки и статус

Справочная дата в прежней базе: 2026-10-21. Актуальный статус регистрационного удостоверения отдельно не проверен.

Справочная ссылка: https://www.vidal.ru/drugs/duloxenta-2

Миртазапин Канон

МНН
Миртазапин

Производитель (из пользовательского текста)
Канонфарма продакшн ЗАО

Форма
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

Доза / упаковка
30 мг, 30 шт.

Регистрационный номер, указанный пользователем
ЛП-№(004694)-(РГ-RU)

АТХ
N06AX11

Сокращённые редакционные разделы. Полноту всех противопоказаний, доз, нежелательных реакций и взаимодействий сверять по актуальной инструкции именно выбранного торгового наименования и РУ.

ВАЖНО: данные из инструкции присланной формы

Режим/применение: В присланной инструкции для взрослых указан диапазон 15–45 мг/сут, часто однократно вечером, с подбором дозы специалистом.

Особые ограничения: ИМАО противопоказаны; соблюдать осторожность при заболеваниях сердца, печени и почек, склонности к судорогам, биполярном расстройстве.

Сочетания: Частые нежелательные реакции по присланной инструкции: сонливость, седативный эффект, повышение аппетита и массы тела. Сочетание с другими седативными веществами может усиливать этот эффект.

Группа

Антидепрессант тетрациклической структуры, NaSSA. АТХ N06AX11.

Показания

Депрессивные состояния у взрослых, особенно с нарушениями сна, аппетита и снижением веса (симптомы не заменяют диагноз и не являются самостоятельным зарегистрированным показанием).

Способ применения и дозы

Обычно от 15 до 45 мг/сут внутрь, часто вечером/перед сном. Дозировку повышают по ответу и переносимости; эффект оценивают через несколько недель; отмена постепенная.

Состав (справочное описание)

На 1 таб. миртазапин 30 мг; лактозы моногидрат, кукурузный крахмал, гипролоза, микрокристаллическая целлюлоза, прежелатинизированный крахмал, тальк, стеарат магния, диоксид кремния; оболочка: гипромеллоза, макрогол 6000, диоксид титана, оксиды железа, тальк.

Противопоказания

Гиперчувствительность; применение с ИМАО и требуемые интервалы переключения; ограничения по возрасту, беременности и лактации указаны в ОХЛП. Учитывать наличие лактозы.

Особые указания

Контроль прибавки массы тела, аппетита, выраженной сонливости, суицидального риска и мании. При лихорадке/боли в горле исключать редкую нейтропению/агранулоцитоз; учитывать функции печени/почек и гипонатриемию.

Побочные действия

ЖКТ: диарея, запор, рвота, сухость во рту, тошнота
Кожа и потоотделение: зуд, крапивница, синдром Стивенса-Джонсона, сыпь
Кровь и иммунитет: агранулоцитоз, нейтропения, тромбоцитопения
Мышцы и опорно-двигательная: мышечная боль, синдром беспокойных ног, суставная боль
Нервная система: головокружение, нарушение памяти, парестезия, седативный эффект, серотониновый синдром, сонливость, судороги, тремор
Обмен веществ и питание: повышение аппетита, повышение триглицеридов, повышение холестерина, увеличение массы тела
Общие симптомы: генерализованные отёки, периферические отёки, утомляемость
Печень и почки: задержка мочеиспускания, повышение трансаминаз
Психика и сон: бессонница, кошмары, мания, необычные сновидения, спутанность сознания, суицидальные мысли, тревога
Сердце и сосуды: ортостатическая гипотензия, удлинение интервала QT

Взаимодействия с другими лекарствами

ИМАО запрещены; алкоголь, бензодиазепины и другие седативные препараты повышают угнетение ЦНС; серотонинергические комбинации требуют осторожности; сильные индукторы/ингибиторы CYP влияют на концентрации.

Фармакодинамика

Антагонизм центральных α2-рецепторов, серотониновых 5HT2/5HT3 и H1; часто выраженный седативный эффект и влияние на аппетит.

Условия хранения

Не выше 25 °C.

Срок годности

Уточнить по текущему ОХЛП и маркировке упаковки Каликсты.

Фармаконадзор

Контакт представительства Belupo/уполномоченной организации — по листку-вкладышу.

Нежелательные реакции по системам (41) · демобаза

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ДЕМО: частоты не переносятся автоматически между брендами, формами выпуска или редакциями инструкций. Каждая запись требует сверки по ОХЛП именно выбранного РУ перед назначением.

Нервная система (8):
сонливость — частота требует уточнения; седативный эффект — частота требует уточнения; головокружение — частота требует уточнения; тремор — частота требует уточнения; парестезия — частота требует уточнения; нарушение памяти — частота требует уточнения; судороги — частота требует уточнения; серотониновый синдром — частота требует уточнения

Психика и сон (7):
необычные сновидения — частота требует уточнения; кошмары — частота требует уточнения; тревога — частота требует уточнения; бессонница — частота требует уточнения; спутанность сознания — частота требует уточнения; мания — частота требует уточнения; суицидальные мысли — частота требует уточнения

Обмен веществ и питание (4):
повышение аппетита — частота требует уточнения; увеличение массы тела — частота требует уточнения; повышение холестерина — частота требует уточнения; повышение триглицеридов — частота требует уточнения

ЖКТ (5):
сухость во рту — частота требует уточнения; тошнота — частота требует уточнения; диарея — частота требует уточнения; рвота — частота требует уточнения; запор — частота требует уточнения

Сердце и сосуды (2):
ортостатическая гипотензия — частота требует уточнения; удлинение интервала QT — частота требует уточнения

Кожа и потоотделение (4):
сыпь — частота требует уточнения; зуд — частота требует уточнения; крапивница — частота требует уточнения; синдром Стивенса-Джонсона — частота требует уточнения

Кровь и иммунитет (3):
нейтропения — частота требует уточнения; агранулоцитоз — частота требует уточнения; тромбоцитопения — частота требует уточнения

Мышцы и опорно-двигательная (3):
суставная боль — частота требует уточнения; мышечная боль — частота требует уточнения; синдром беспокойных ног — частота требует уточнения

Общие симптомы (3):
периферические отёки — частота требует уточнения; утомляемость — частота требует уточнения; генерализованные отёки — частота требует уточнения

Печень и почки (2):
повышение трансаминаз — частота требует уточнения; задержка мочеиспускания — частота требует уточнения

Источники карточки и статус

Справочная дата в прежней базе: 2026-10-21. Актуальный статус регистрационного удостоверения отдельно не проверен.

Справочная ссылка: https://www.vidal.ru/drugs/calixta__31764

Агомелатин

МНН
Агомелатин

Производитель (из пользовательского текста)
ОЗОН ООО

Форма
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

Доза / упаковка
25 мг, 28 шт.

Регистрационный номер, указанный пользователем
ЛП-№(003889)-(РГ-RU)

АТХ
N06AX22

Сокращённые редакционные разделы. Полноту всех противопоказаний, доз, нежелательных реакций и взаимодействий сверять по актуальной инструкции именно выбранного торгового наименования и РУ.

ВАЖНО: данные из инструкции присланной формы

Режим/применение: В присланной инструкции: 25 мг однократно перед сном; перед началом лечения и затем примерно через 3, 6, 12, 24 недели необходим контроль функций печени.

Особые ограничения: Заболевания печени с нарушением функции, повышение АЛТ/АСТ более чем в 3 раза ВГН и мощные ингибиторы CYP1A2, в частности флувоксамин и ципрофлоксацин, противопоказаны.

Сочетания: Взаимодействие флувоксамина с агомелатином может существенно повышать экспозицию агомелатина. Предупреждение сверено дополнительно по опубликованной инструкции Росздравнадзора.

Группа

Антидепрессант; мелатонинергический агонист MT1/MT2, антагонист 5-HT2C. АТХ N06AX22.

Показания

Большие депрессивные эпизоды/депрессивные расстройства у взрослых; эффективность при тревожной симптоматике не тождественна отдельному показанию на любой тревожный диагноз.

Способ применения и дозы

Внутрь 25 мг вечером перед сном; если через 2 недели эффекта недостаточно, врач может повысить до 50 мг 1 раз/сут. Перед назначением и далее в течение лечения обязательны биохимические пробы печени, схема контроля согласно ОХЛП.

Состав (справочное описание)

На 1 таб. агомелатин 25 мг; лактоза, стеарат магния, кукурузный крахмал, повидон, коллоидный диоксид кремния, карбоксиметилкрахмал натрия, стеариновая кислота; оболочка: глицерол, гипромеллоза, краситель оксид железа, макрогол 6000, стеарат магния, диоксид титана.

Противопоказания

Активное заболевание печени, цирроз или трансаминазы >3×ВГН; одновременное применение с сильными ингибиторами CYP1A2 (флувоксамин, ципрофлоксацин); гиперчувствительность; возраст до 18 лет; другие возрастные/репродуктивные ограничения.

Особые указания

АЛТ/АСТ до начала и приблизительно через 3, 6, 12, 24 недели и после повышения дозы; при симптомах поражения печени срочно обследовать. Осторожность при злоупотреблении алкоголем/ожирении/сахарном диабете; оценка мании и суицидальности.

Побочные действия

ЖКТ: боль в животе, диарея, запор, рвота, тошнота
Зрение и органы чувств: нечеткое зрение, шум в ушах
Кожа и потоотделение: ангионевротический отек, кожный зуд, крапивница, повышенная потливость, сыпь, экзема
Мышцы и опорно-двигательная: боль в спине
Нервная система: головная боль, головокружение, мигрень, парестезия, синдром беспокойных ног, сонливость
Обмен веществ и питание: снижение массы тела, увеличение массы тела
Общие симптомы: утомляемость
Печень и почки: гепатит, желтуха, печеночная недостаточность, повышение АЛТ/АСТ, повышение ГГТ/ЩФ
Психика и сон: ажитация, бессонница, галлюцинации, кошмары, мания, необычные сновидения, раздражительность, суицидальные мысли, тревога

Взаимодействия с другими лекарствами

Флувоксамин и ципрофлоксацин (мощные ингибиторы CYP1A2) противопоказаны из-за резкого повышения экспозиции. Курение может снижать концентрации (индукция CYP1A2); алкоголь нежелателен; другие индукторы/ингибиторы требуют оценки.

Фармакодинамика

Регуляция циркадных ритмов через MT1/MT2 и блокада 5-HT2C с усилением высвобождения норадреналина/дофамина в префронтальной коре. Не ингибирует захват моноаминов.

Условия хранения

Для указанной формы до 30 °C (источник Видаль).

Срок годности

Срок годности проверять в действующей инструкции/на упаковке.

Фармаконадзор

Уполномоченную организацию для претензий и фармаконадзора сверить по ОХЛП данной партии Servier.

Нежелательные реакции по системам (37) · демобаза

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ДЕМО: частоты не переносятся автоматически между брендами, формами выпуска или редакциями инструкций. Каждая запись требует сверки по ОХЛП именно выбранного РУ перед назначением.

Нервная система (6):
головная боль — частота требует уточнения; головокружение — частота требует уточнения; сонливость — частота требует уточнения; парестезия — частота требует уточнения; синдром беспокойных ног — частота требует уточнения; мигрень — частота требует уточнения

Психика и сон (9):
бессонница — частота требует уточнения; тревога — частота требует уточнения; ажитация — частота требует уточнения; раздражительность — частота требует уточнения; кошмары — частота требует уточнения; необычные сновидения — частота требует уточнения; мания — частота требует уточнения; галлюцинации — частота требует уточнения; суицидальные мысли — частота требует уточнения

ЖКТ (5):
тошнота — частота требует уточнения; диарея — частота требует уточнения; запор — частота требует уточнения; боль в животе — частота требует уточнения; рвота — частота требует уточнения

Печень и почки (5):
повышение АЛТ/АСТ — частота требует уточнения; гепатит — частота требует уточнения; печеночная недостаточность — частота требует уточнения; желтуха — частота требует уточнения; повышение ГГТ/ЩФ — частота требует уточнения

Кожа и потоотделение (6):
повышенная потливость — частота требует уточнения; кожный зуд — частота требует уточнения; экзема — частота требует уточнения; крапивница — частота требует уточнения; сыпь — частота требует уточнения; ангионевротический отек — частота требует уточнения

Зрение и органы чувств (2):
нечеткое зрение — частота требует уточнения; шум в ушах — частота требует уточнения

Мышцы и опорно-двигательная (1):
боль в спине — частота требует уточнения

Обмен веществ и питание (2):
увеличение массы тела — частота требует уточнения; снижение массы тела — частота требует уточнения

Общие симптомы (1):
утомляемость — частота требует уточнения

Источники карточки и статус

Справочная дата в прежней базе: 2026-10-21. Актуальный статус регистрационного удостоверения отдельно не проверен.

Справочная ссылка: https://www.vidal.ru/drugs/valdoxan__29817

Бринтелликс

МНН
Вортиоксетин

Производитель (из пользовательского текста)
Х. Лундбек А/О

Форма
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

Доза / упаковка
10 мг, 28 шт.

Регистрационный номер, указанный пользователем
ЛП-№(010396)-(РГ-RU)

АТХ
N06AX26

Сокращённые редакционные разделы. Полноту всех противопоказаний, доз, нежелательных реакций и взаимодействий сверять по актуальной инструкции именно выбранного торгового наименования и РУ.

ВАЖНО: данные из инструкции присланной формы

Режим/применение: В присланной инструкции: 10 мг один раз в сутки у взрослых моложе 65 лет; у пожилых стартовая доза указана 5 мг/сут.

Особые ограничения: Противопоказаны неселективные ИМАО и селективные ИМАО-А. Учитывать суицидальные симптомы, серотониновый синдром, гипонатриемию и кровотечения.

Сочетания: Метаболизм зависит преимущественно от CYP2D6; сильные ингибиторы CYP2D6 (например, флуоксетин) могут увеличивать экспозицию. Врач должен сверить актуальную инструкцию.

Группа

Антидепрессант мультимодальный серотонинергический. АТХ N06AX26.

Показания

Лечение большого депрессивного расстройства/депрессивных эпизодов у взрослых по утверждённой инструкции.

Способ применения и дозы

Внутрь 1 раз в сутки, без привязки к пище, доза 5–20 мг/сут индивидуально; типичный старт взрослого — 10 мг/сут, пожилым нередко 5 мг. При сильных ингибиторах CYP2D6 может требоваться изменение дозы.

Состав (справочное описание)

Для таб. 20 мг: 25,42 мг вортиоксетина гидробромида (эквивалент 20 мг). Маннитол, микрокристаллическая целлюлоза, гипролоза, натрия карбоксиметилкрахмал, стеарат магния; оболочка: гипромеллоза, диоксид титана, макрогол 400, красный оксид железа. Для 5/10/15 мг оболочка отличается.

Противопоказания

Гиперчувствительность; неселективные ИМАО и селективные ИМАО-А (а также линезолид в соответствующих инструкциях); возраст младше 18 лет.

Особые указания

Мониторинг суицидальности, мании, судорог, гипонатриемии и кровотечений. Возможна тошнота, особенно в начале лечения; при симптомах серотонинового синдрома срочно обращаться за медпомощью.

Побочные действия

ЖКТ: диарея, диспепсия, запор, рвота, тошнота
Зрение и органы чувств: мидриаз, нечеткость зрения
Кожа и потоотделение: ангионевротический отек, кожный зуд, крапивница, ночная потливость, повышенная потливость, сыпь
Кровь и иммунитет: анафилактическая реакция
Нервная система: акатизия, бруксизм, головная боль, головокружение, серотониновый синдром, синдром беспокойных ног, тремор, тризм
Обмен веществ и питание: гипонатриемия
Общие симптомы: синдром отмены
Психика и сон: агрессия, ажитация, бессонница, необычные сновидения
Сердце и сосуды: кровотечения, приливы
Эндокринная система: галакторея, гиперпролактинемия

Взаимодействия с другими лекарствами

ИМАО — противопоказаны с временными интервалами; трамадол, триптаны, зверобой и другие серотонинергические средства — риск серотонинового синдрома; бупропион/флуоксетин и иные ингибиторы CYP2D6 могут повысить экспозицию; антикоагулянты — кровотечения.

Фармакодинамика

Сочетает ингибирование SERT с модуляцией рецепторов 5-HT3/7/1D, частичным агонизмом 5-HT1B и агонизмом 5-HT1A; точный вклад отдельных механизмов в клинический эффект не установлен.

Условия хранения

Для указанной формы до 25 °C.

Срок годности

Срок годности по листку-вкладышу конкретной упаковки.

Фармаконадзор

Контакт уполномоченного представителя Lundbeck — по ОХЛП/листку-вкладышу.

Нежелательные реакции по системам (32) · демобаза

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ДЕМО: частоты не переносятся автоматически между брендами, формами выпуска или редакциями инструкций. Каждая запись требует сверки по ОХЛП именно выбранного РУ перед назначением.

ЖКТ (5):
тошнота — очень часто; диарея — часто; запор — часто; рвота — часто; диспепсия — часто

Нервная система (8):
головокружение — часто; тремор — нечасто; головная боль — частота требует уточнения; акатизия — частота требует уточнения; серотониновый синдром — частота требует уточнения; бруксизм — частота требует уточнения; тризм — частота требует уточнения; синдром беспокойных ног — частота требует уточнения

Психика и сон (4):
необычные сновидения — часто; бессонница — частота требует уточнения; ажитация — частота требует уточнения; агрессия — частота требует уточнения

Кожа и потоотделение (6):
кожный зуд — часто; повышенная потливость — часто; ночная потливость — нечасто; крапивница — частота требует уточнения; сыпь — частота требует уточнения; ангионевротический отек — частота требует уточнения

Сердце и сосуды (2):
приливы — нечасто; кровотечения — частота требует уточнения

Обмен веществ и питание (1):
гипонатриемия — частота требует уточнения

Эндокринная система (2):
гиперпролактинемия — частота требует уточнения; галакторея — частота требует уточнения

Зрение и органы чувств (2):
нечеткость зрения — нечасто; мидриаз — частота требует уточнения

Кровь и иммунитет (1):
анафилактическая реакция — частота требует уточнения

Общие симптомы (1):
синдром отмены — частота требует уточнения

Источники карточки и статус

Справочная дата в прежней базе: 2026-10-21. Актуальный статус регистрационного удостоверения отдельно не проверен.

Справочная ссылка: https://www.vidal.ru/drugs/brintellix

Спитомин

МНН
Буспирон

Производитель (из пользовательского текста)
Эгис Фармацевтический завод ЗАО

Форма
таблетки

Доза / упаковка
10 мг, 60 шт.

Регистрационный номер, указанный пользователем
ЛП-№(004548)-(РГ-RU)

АТХ
N05BE01

Сокращённые редакционные разделы. Полноту всех противопоказаний, доз, нежелательных реакций и взаимодействий сверять по актуальной инструкции именно выбранного торгового наименования и РУ.

ВАЖНО: данные из инструкции присланной формы

Режим/применение: По присланной инструкции эффект развивается не немедленно: ориентировочно спустя 7–14 дней; это не средство для эпизодического купирования тревоги.

Особые ограничения: Противопоказания включают тяжёлую печёночную/почечную недостаточность, эпилепсию, беременность, ГВ, возраст до 18 лет.

Сочетания: Буспирон — субстрат CYP3A4. Ингибиторы CYP3A4 могут существенно повышать его экспозицию; совместное применение с ИМАО нежелательно, а сочетания с серотонинергическими средствами требуют оценки риска.

Группа

Анксиолитик небензодиазепиновый; производные азаспиродекандиона. АТХ N05BE01.

Показания

Генерализованное тревожное расстройство и иные состояния по утверждённой ОХЛП Спитомина; не предназначен для немедленного разового купирования паники.

Способ применения и дозы

Внутрь, обычно начало с 15 мг/сут в 2–3 приёма; повышение по 5 мг каждые 2–3 дня под врачебным контролем, обычная доза 20–30 мг/сут. Максимальная разовая 30 мг, суточная 60 мг. Принимать последовательно по отношению к еде; грейпфрут избегать.

Состав (справочное описание)

На 1 таб. 10 мг буспирона в форме гидрохлорида; моногидрат лактозы, микрокристаллическая целлюлоза, натрия карбоксиметилкрахмал, стеарат магния, коллоидный диоксид кремния. На 5 мг количество лактозы иное.

Противопоказания

Гиперчувствительность; совместное применение с ИМАО; серьёзная печёночная и/или почечная недостаточность, беременность/кормление грудью и детский возраст — по ОХЛП.

Особые указания

Первые недели возможны головокружение, головная боль, возбуждение; оценивать психомоторные реакции. Неэффективен «по необходимости» одной таблеткой. Ограничения при тяжёлой печёночной/почечной недостаточности.

Побочные действия

ЖКТ: боль в животе, диарея, запор, сухость во рту, тошнота
Зрение и органы чувств: нечеткость зрения
Кожа и потоотделение: зуд, повышенная потливость, сыпь
Нервная система: акатизия, головная боль, головокружение, нарушение координации, парестезия, предобморочное состояние, серотониновый синдром, сонливость, судороги, тремор
Общие симптомы: астения, утомляемость
Психика и сон: бессонница, возбуждение, галлюцинации, депрессия, нарушение сна, нервозность, раздражительность, спутанность сознания
Сердце и сосуды: сердцебиение, тахикардия

Взаимодействия с другими лекарствами

ИМАО противопоказаны; мощные ингибиторы CYP3A4 (например, макролиды, азолы) повышают концентрации; грейпфрут — повышение экспозиции; сочетания с серотонинергическими средствами/антидепрессантами требуют клинического мониторинга; алкоголь нежелателен.

Фармакодинамика

Частичный агонист 5-HT1A-рецепторов, не действует как бензодиазепин на ГАМК-А-комплекс. Анксиолитический эффект развивается постепенно, обычно через 1–2 недели, более полный — примерно через 4 недели.

Условия хранения

Не выше 30 °C (ОХЛП Спитомина).

Срок годности

Проверить по ОХЛП конкретной упаковки.

Фармаконадзор

Уполномоченное лицо/контакты ЭГИС для жалоб — по актуальной ОХЛП.

Нежелательные реакции по системам (31) · демобаза

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ДЕМО: частоты не переносятся автоматически между брендами, формами выпуска или редакциями инструкций. Каждая запись требует сверки по ОХЛП именно выбранного РУ перед назначением.

Нервная система (10):
головокружение — частота требует уточнения; предобморочное состояние — частота требует уточнения; головная боль — частота требует уточнения; сонливость — частота требует уточнения; парестезия — частота требует уточнения; нарушение координации — частота требует уточнения; тремор — частота требует уточнения; судороги — частота требует уточнения; серотониновый синдром — частота требует уточнения; акатизия — частота требует уточнения

Психика и сон (8):
нервозность — частота требует уточнения; бессонница — частота требует уточнения; возбуждение — частота требует уточнения; раздражительность — частота требует уточнения; депрессия — частота требует уточнения; спутанность сознания — частота требует уточнения; нарушение сна — частота требует уточнения; галлюцинации — частота требует уточнения

ЖКТ (5):
тошнота — частота требует уточнения; сухость во рту — частота требует уточнения; диарея — частота требует уточнения; запор — частота требует уточнения; боль в животе — частота требует уточнения

Кожа и потоотделение (3):
повышенная потливость — частота требует уточнения; сыпь — частота требует уточнения; зуд — частота требует уточнения

Зрение и органы чувств (1):
нечеткость зрения — частота требует уточнения

Сердце и сосуды (2):
сердцебиение — частота требует уточнения; тахикардия — частота требует уточнения

Общие симптомы (2):
утомляемость — частота требует уточнения; астения — частота требует уточнения

Источники карточки и статус

Справочная дата в прежней базе: 2026-10-21. Актуальный статус регистрационного удостоверения отдельно не проверен.

Справочная ссылка: https://www.vidal.ru/drugs/spitomin__17681

Гидроксизин

МНН
Гидроксизин

Производитель (из пользовательского текста)
Канонфарма продакшн ЗАО

Форма
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

Доза / упаковка
25 мг, 25 шт.

Регистрационный номер, указанный пользователем
ЛП-№(014054)-(РГ-RU)

АТХ
N05BB01

Сокращённые редакционные разделы. Полноту всех противопоказаний, доз, нежелательных реакций и взаимодействий сверять по актуальной инструкции именно выбранного торгового наименования и РУ.

ВАЖНО: данные из инструкции присланной формы

Режим/применение: В присланной инструкции указано применять минимальную эффективную дозу как можно более коротким курсом.

Особые ограничения: Противопоказания включают врождённое или приобретённое удлинение QT, значимые факторы риска torsades de pointes, беременность и грудное вскармливание.

Сочетания: В присланной инструкции противопоказаны сочетания с другими лекарствами, способными удлинять QT, в том числе эсциталопрамом. Учитывать суммирование седативного действия и риск нарушения внимания.

Группа

Анксиолитик с антигистаминной активностью; производное дифенилметана, блокатор H1-рецепторов. АТХ N05BB01.

Показания

Симптоматическое лечение тревоги у взрослых; премедикация; аллергический зуд. Не является антидепрессантом и не предназначен как базовое лечение депрессии.

Способ применения и дозы

Для взрослых применяют минимальную эффективную дозу на кратчайший срок, суммарная доза не более 100 мг/сут; режим зависит от цели назначения, возраста и функции почек/печени. Детское применение — только по конкретной зарегистрированной инструкции.

Состав (справочное описание)

На таблетку: гидроксизина гидрохлорид 25 мг; моногидрат лактозы, микрокристаллическая целлюлоза, коллоидный диоксид кремния, стеарат магния; оболочка: гипромеллоза, гидроксипропилцеллюлоза, тальк, диоксид титана.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к гидроксизину/цетиризину и некоторым родственным веществам; удлинённый QT и факторы риска «пируэта», выраженная брадикардия/электролитные нарушения, лекарства с риском удлинения QT; порфирия; беременность, роды, лактация. Возрастные/урологические/офтальмологические ограничения — по ОХЛП.

Особые указания

Сильная сонливость и замедление психомоторной реакции; осторожность у пожилых и при почечной/печёночной недостаточности. Ключевая безопасность: QT/аритмии, возможная задержка мочеиспускания, закрытоугольная глаукома.

Побочные действия

Дыхательная система: бронхоспазм
ЖКТ: запор, рвота, сухость во рту, тошнота
Зрение и органы чувств: нарушение аккомодации, нарушение зрения
Кожа и потоотделение: ангионевротический отек, дерматит, зуд, крапивница, синдром Стивенса-Джонсона, сыпь
Кровь и иммунитет: анафилактический шок
Нервная система: головная боль, головокружение, дискинезия, заторможенность, сонливость, судороги, тремор
Общие симптомы: гипертермия, недомогание, утомляемость
Печень и почки: гепатит, задержка мочеиспускания, нарушение печеночных проб
Психика и сон: бессонница, возбуждение, галлюцинации, дезориентация, спутанность сознания
Сердце и сосуды: желудочковая тахикардия типа пируэт, снижение артериального давления, тахикардия, удлинение интервала QT

Взаимодействия с другими лекарствами

Седативные препараты и алкоголь усиливают угнетение ЦНС; лекарства, удлиняющие QT, опасны и могут быть противопоказаны; сочетание с ингибиторами CYP и другими антихолинергическими препаратами требует проверки.

Фармакодинамика

Блокада H1-гистаминовых рецепторов и умеренная антихолинергическая активность; анксиолитический, седативный, противозудный эффекты.

Условия хранения

Не выше 25 °C для рассматриваемой формы.

Срок годности

По актуальной ОХЛП Фармпроект и упаковке.

Фармаконадзор

Ответственное лицо для претензий уточнить по текущей ОХЛП препарата Фармпроект.

Нежелательные реакции по системам (36) · демобаза

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ДЕМО: частоты не переносятся автоматически между брендами, формами выпуска или редакциями инструкций. Каждая запись требует сверки по ОХЛП именно выбранного РУ перед назначением.

Нервная система (7):
сонливость — частота требует уточнения; головная боль — частота требует уточнения; заторможенность — частота требует уточнения; головокружение — частота требует уточнения; тремор — частота требует уточнения; судороги — частота требует уточнения; дискинезия — частота требует уточнения

Психика и сон (5):
бессонница — частота требует уточнения; возбуждение — частота требует уточнения; спутанность сознания — частота требует уточнения; галлюцинации — частота требует уточнения; дезориентация — частота требует уточнения

ЖКТ (4):
сухость во рту — частота требует уточнения; тошнота — частота требует уточнения; рвота — частота требует уточнения; запор — частота требует уточнения

Сердце и сосуды (4):
тахикардия — частота требует уточнения; снижение артериального давления — частота требует уточнения; удлинение интервала QT — частота требует уточнения; желудочковая тахикардия типа пируэт — частота требует уточнения

Зрение и органы чувств (2):
нарушение аккомодации — частота требует уточнения; нарушение зрения — частота требует уточнения

Кожа и потоотделение (6):
зуд — частота требует уточнения; сыпь — частота требует уточнения; крапивница — частота требует уточнения; дерматит — частота требует уточнения; ангионевротический отек — частота требует уточнения; синдром Стивенса-Джонсона — частота требует уточнения

Печень и почки (3):
нарушение печеночных проб — частота требует уточнения; гепатит — частота требует уточнения; задержка мочеиспускания — частота требует уточнения

Кровь и иммунитет (1):
анафилактический шок — частота требует уточнения

Общие симптомы (3):
утомляемость — частота требует уточнения; недомогание — частота требует уточнения; гипертермия — частота требует уточнения

Дыхательная система (1):
бронхоспазм — частота требует уточнения

Источники карточки и статус

Справочная дата в прежней базе: 2026-10-21. Актуальный статус регистрационного удостоверения отдельно не проверен.

Справочная ссылка: https://www.vidal.ru/drugs/hydroxyzine

05 Проверка сочетаний · матрица 66 пар

Всего комбинаций: 66. ПРОТИВОПОКАЗАНО — 3, ПОВЫШЕННЫЙ РИСК — 5, ОЦЕНИТЬ — 41, НЕТ ДАННЫХ — 17. Это только демонстрационное покрытие.

Препарат А	Препарат В	Статус
Авиандр	Эсциталопрам	ОЦЕНИТЬ
Авиандр	Сертралин	ОЦЕНИТЬ
Авиандр	Флуоксетин	ПОВЫШЕННЫЙ РИСК
Авиандр	Флувоксамин-СЗ	ОЦЕНИТЬ
Авиандр	Венлафаксин	ОЦЕНИТЬ
Авиандр	Дулоксетин Канон	ОЦЕНИТЬ
Авиандр	Миртазапин Канон	ОЦЕНИТЬ
Авиандр	Агомелатин	НЕТ ДАННЫХ
Авиандр	Бринтелликс	ОЦЕНИТЬ
Авиандр	Спитомин	ПОВЫШЕННЫЙ РИСК
Авиандр	Гидроксизин	ОЦЕНИТЬ
Эсциталопрам	Сертралин	ОЦЕНИТЬ
Эсциталопрам	Флуоксетин	ОЦЕНИТЬ
Эсциталопрам	Флувоксамин-СЗ	ОЦЕНИТЬ
Эсциталопрам	Венлафаксин	ОЦЕНИТЬ
Эсциталопрам	Дулоксетин Канон	ОЦЕНИТЬ
Эсциталопрам	Миртазапин Канон	ОЦЕНИТЬ
Эсциталопрам	Агомелатин	НЕТ ДАННЫХ
Эсциталопрам	Бринтелликс	ОЦЕНИТЬ
Эсциталопрам	Спитомин	ОЦЕНИТЬ

Препарат А	Препарат В	Статус
Эсциталопрам	Гидроксизин	ПРОТИВОПОКАЗАНО
Сертралин	Флуоксетин	ОЦЕНИТЬ
Сертралин	Флувоксамин-СЗ	ОЦЕНИТЬ
Сертралин	Венлафаксин	ОЦЕНИТЬ

Препарат А	Препарат В	Статус
Сертралин	Дулоксетин Канон	ОЦЕНИТЬ
Сертралин	Миртазапин Канон	ОЦЕНИТЬ
Сертралин	Агомелатин	НЕТ ДАННЫХ
Сертралин	Бринтелликс	ОЦЕНИТЬ
Сертралин	Спитомин	ОЦЕНИТЬ
Сертралин	Гидроксизин	НЕТ ДАННЫХ
Флуоксетин	Флувоксамин-СЗ	ОЦЕНИТЬ
Флуоксетин	Венлафаксин	ПОВЫШЕННЫЙ РИСК
Флуоксетин	Дулоксетин Канон	ОЦЕНИТЬ
Флуоксетин	Миртазапин Канон	ОЦЕНИТЬ
Флуоксетин	Агомелатин	НЕТ ДАННЫХ
Флуоксетин	Бринтелликс	ПОВЫШЕННЫЙ РИСК
Флуоксетин	Спитомин	ОЦЕНИТЬ
Флуоксетин	Гидроксизин	НЕТ ДАННЫХ
Флувоксамин-СЗ	Венлафаксин	ОЦЕНИТЬ
Флувоксамин-СЗ	Дулоксетин Канон	ПРОТИВОПОКАЗАНО

Препарат А	Препарат В	Статус
Флувоксамин-СЗ	Миртазапин Канон	ОЦЕНИТЬ
Флувоксамин-СЗ	Агомелатин	ПРОТИВОПОКАЗАНО
Флувоксамин-СЗ	Бринтелликс	ОЦЕНИТЬ
Флувоксамин-СЗ	Спитомин	ПОВЫШЕННЫЙ РИСК
Флувоксамин-СЗ	Гидроксизин	НЕТ ДАННЫХ
Венлафаксин	Дулоксетин Канон	ОЦЕНИТЬ
Венлафаксин	Миртазапин Канон	ОЦЕНИТЬ
Венлафаксин	Агомелатин	НЕТ ДАННЫХ
Венлафаксин	Бринтелликс	ОЦЕНИТЬ
Венлафаксин	Спитомин	ОЦЕНИТЬ
Венлафаксин	Гидроксизин	НЕТ ДАННЫХ

Препарат А	Препарат В	Статус
Дулоксетин Канон	Миртазапин Канон	ОЦЕНИТЬ
Дулоксетин Канон	Агомелатин	НЕТ ДАННЫХ
Дулоксетин Канон	Бринтелликс	ОЦЕНИТЬ
Дулоксетин Канон	Спитомин	ОЦЕНИТЬ
Дулоксетин Канон	Гидроксизин	НЕТ ДАННЫХ
Миртазапин Канон	Агомелатин	НЕТ ДАННЫХ
Миртазапин Канон	Бринтелликс	ОЦЕНИТЬ
Миртазапин Канон	Спитомин	ОЦЕНИТЬ
Миртазапин Канон	Гидроксизин	ОЦЕНИТЬ

Препарат А	Препарат В	Статус
Агомелатин	Бринтелликс	НЕТ ДАННЫХ
Агомелатин	Спитомин	НЕТ ДАННЫХ
Агомелатин	Гидроксизин	НЕТ ДАННЫХ
Бринтелликс	Спитомин	ОЦЕНИТЬ
Бринтелликс	Гидроксизин	НЕТ ДАННЫХ
Спитомин	Гидроксизин	НЕТ ДАННЫХ

Конкретные правила взаимодействий

Эсциталопрам + Гидроксизин · ПРОТИВОПОКАЗАНО

Механизм: Гидроксизин и эсциталопрам: оба способны удлинять интервал QT; сочетание прямо приведено в инструкции гидроксизина в числе противопоказанных.

Возможные эффекты: Повышение риска желудочковой тахикардии типа «пируэт» (torsades de pointes).

Что проверить: Не формировать эту комбинацию; врач проверяет ЭКГ, электролиты, сопутствующие препараты и актуальные инструкции.

Источник правила: присланная инструкция гидроксизина: «Взаимодействие ...»

Флувоксамин-СЗ + Дулоксетин Канон · ПРОТИВОПОКАЗАНО

Механизм: Флувоксамин — мощный ингибитор CYP1A2, который участвует в метаболизме дулоксетина.

Возможные эффекты: В инструкции дулоксетина приведено снижение клиренса примерно на 77% и рост AUC примерно в 6 раз.

Что проверить: Сочетание противопоказано в представленной инструкции дулоксетина; подобрать альтернативу по решению врача.

Источник правила: присланная инструкция дулоксетина: «Противопоказания» / «Взаимодействие ...»

Флувоксамин-СЗ + Агомелатин · ПРОТИВОПОКАЗАНО

Механизм: Флувоксамин — мощный ингибитор CYP1A2; существенно тормозит метаболизм агомелатина.

Возможные эффекты: Согласно приведённой инструкции агомелатина, концентрация может увеличиваться в среднем в 60 раз (диапазон 12–412); риск токсичности, прежде всего поражения печени.

Что проверить: Не назначать вместе; проверить инструкции конкретных форм и печёночные пробы.

Источник правила: присланная инструкция агомелатина: «Взаимодействие ...»

Авиандр + Флуоксетин · ПОВЫШЕННЫЙ РИСК

Механизм: Серотонинергическая активность + ингибирование CYP2D6; потенциальное повышение экспозиции Авиандра

Возможные эффекты: Отсутствие прямого запрета ≠ подтверждённая совместимость

Что проверить: Проверить ВСЕ лекарства пациента, сопутствующие болезни и дозы; решение врача

Источник правила: таблица взаимодействий Авиандра, демо-реестр 2026

Авиандр + Спитомин · ПОВЫШЕННЫЙ РИСК

Механизм: Серотонинергические эффекты; прямого исследования пары с Авиандром не найдено

Возможные эффекты: Нельзя считать автоматически совместимыми

Что проверить: Проверить ВСЕ лекарства пациента, сопутствующие болезни и дозы; решение врача

Источник правила: таблица взаимодействий Авиандра, демо-реестр 2026

Флувоксамин-СЗ + Спитомин · ПОВЫШЕННЫЙ РИСК

Механизм: Флувоксамин способен повышать концентрацию буспирона, а оба препарата влияют на серотонинергическую передачу.

Возможные эффекты: В присланной инструкции буспирона указано повышение концентрации буспирона приблизительно вдвое при кратковременном совместном применении; возможны головокружение и иные нежелательные реакции.

Что проверить: Оценить необходимость комбинации, дозу, состояние пациента и другие серотонинергические препараты.

Источник правила: присланная инструкция Спитомина: «Флувоксамин»

Флуоксетин + Венлафаксин · ПОВЫШЕННЫЙ РИСК

Механизм: Флуоксетин ингибирует CYP2D6, участвующий в метаболизме венлафаксина.

Возможные эффекты: Возможны фармакокинетические изменения и усиление серотонинергических реакций; величина эффекта индивидуальна.

Что проверить: Оценить целесообразность комбинации, состояние и остальные препараты.

Источник правила: присланная инструкция

Флуоксетин + Бринтелликс · ПОВЫШЕННЫЙ РИСК

Механизм: Флуоксетин является сильным ингибитором CYP2D6, участвующего в клиренсе вортиоксетина.

Возможные эффекты: Может увеличиваться системная экспозиция вортиоксетина и риск нежелательных реакций; точная величина для этой пары не определена в присланном материале.

Что проверить: Врач проверяет дозы, возраст, другие серотонинергические средства и актуальную инструкцию вортиоксетина.

Источник правила: присланная инструкция Бринтелликса: «Ингибиторы CYP2D6»

Авиандр + Эсциталопрам · ОЦЕНИТЬ

Механизм: Серотонинергическое действие; возможные эффекты через CYP2D6; оценка QT/лекарств

Возможные эффекты: Нет прямого запрета в инструкции Авиандра; не доказана безопасность комбинации

Что проверить: Проверить ВСЕ лекарства пациента, сопутствующие болезни и дозы; решение врача

Источник правила: таблица взаимодействий Авиандра, демо-реестр 2026

Авиандр + Сертралин · ОЦЕНИТЬ

Механизм: Серотонинергический риск с Авиандром; возможное взаимодействие через CYP2D6

Возможные эффекты: Нет прямого запрета; индивидуальная врачебная проверка

Что проверить: Проверить ВСЕ лекарства пациента, сопутствующие болезни и дозы; решение врача

Источник правила: таблица взаимодействий Авиандра, демо-реестр 2026

Авиандр + Флувоксамин-СЗ · ОЦЕНИТЬ

Механизм: Серотонинергическое действие; по инструкции Авиандра сильное ингибирование CYP1A2 само по себе не показало значимого PK-взаимодействия для аналога класса, но прямого доказательства пары нет

Возможные эффекты: Не доказана клиническая безопасность конкретной комбинации

Что проверить: Проверить ВСЕ лекарства пациента, сопутствующие болезни и дозы; решение врача

Источник правила: таблица взаимодействий Авиандра, демо-реестр 2026

Авиандр + Венлафаксин · ОЦЕНИТЬ

Механизм: Серотонинергический риск; при описании Авиандра упоминается венлафаксин как субстрат CYP2D6, но это не исследование данной комбинации

Возможные эффекты: Нет прямого запрета; мониторинг АД/серотониновых симптомов

Что проверить: Проверить ВСЕ лекарства пациента, сопутствующие болезни и дозы; решение врача

Источник правила: таблица взаимодействий Авиандра, демо-реестр 2026

Авиандр + Дулоксетин Канон · ОЦЕНИТЬ

Механизм: В исследовании Авиандр+дулоксетин не выявлено значимого PK-взаимодействия/клинических признаков избыточной серотонинергической стимуляции; остаётся предупреждение для класса

Возможные эффекты: Ограниченные клинические данные о паре, НЕ разрешение без наблюдения

Что проверить: Проверить ВСЕ лекарства пациента, сопутствующие болезни и дозы; решение врача

Источник правила: таблица взаимодействий Авиандра, демо-реестр 2026

Авиандр + Миртазапин Канон · ОЦЕНИТЬ

Механизм: Аддитивная седация; потенциальные серотонинергические реакции при комбинировании

Возможные эффекты: Нет прямого запрета Авиандра; наблюдение врача

Что проверить: Проверить ВСЕ лекарства пациента, сопутствующие болезни и дозы; решение врача

Источник правила: таблица взаимодействий Авиандра, демо-реестр 2026

Авиандр + Бринтелликс · ОЦЕНИТЬ

Механизм: Серотонинергический эффект; метаболизм через CYP2D6; оценка других препаратов

Возможные эффекты: Нет прямого запрета, не доказана безопасность комбинации

Что проверить: Проверить ВСЕ лекарства пациента, сопутствующие болезни и дозы; решение врача

Источник правила: таблица взаимодействий Авиандра, демо-реестр 2026

Авиандр + Гидроксизин · ОЦЕНИТЬ

Механизм: Авиандр может усиливать седативные эффекты H1-блокаторов; проверять QT и другие препараты

Возможные эффекты: Нет прямого запрета по названию в инструкции Авиандра, но клинические риски значимы

Что проверить: Проверить ВСЕ лекарства пациента, сопутствующие болезни и дозы; решение врача

Источник правила: таблица взаимодействий Авиандра, демо-реестр 2026

Миртазапин Канон + Гидроксизин · ОЦЕНИТЬ

Механизм: Аддитивное седативное действие препаратов.

Возможные эффекты: Возможны сонливость, снижение внимания и психомоторных реакций.

Что проверить: Оценить выраженность седации, риски падения и другие седативные средства.

Источник правила: присланная инструкция

Флуоксетин + Спитомин · ОЦЕНИТЬ

Механизм: Флуоксетин и буспирон обладают серотонинергическими эффектами.

Возможные эффекты: Возможны серотонинергические нежелательные реакции; точная частота для этой пары в материале не определена.

Что проверить: Уточнить клинические показания и дозы; оценить риск серотониновой токсичности.

Источник правила: присланные инструкции флуоксетина и буспирона

Эсциталопрам + Сертралин · ОЦЕНИТЬ

Механизм: Одновременное применение двух СИОЗС усиливает серотонинергическое воздействие.

Возможные эффекты: Риск серотонинергических нежелательных реакций; регулярное совместное назначение не должно подтверждаться автоматически.

Что проверить: Уточнить, не идёт ли переход с одного препарата на другой, соблюдение интервалов и показания.

Источник правила: присланные инструкции эсциталопрама и сертралина

Авиандр + Агомелатин · НЕТ ДАННЫХ

Механизм: Нет прямой установленной опасной пары Авиандр+агомелатин в доступной инструкции; это НЕ доказательство отсутствия взаимодействий

Возможные эффекты: Недостаточно данных о конкретной паре; врачебная оценка и контроль печени

Что проверить: Проверить ВСЕ лекарства пациента, сопутствующие болезни и дозы; решение врача

Источник правила: таблица взаимодействий Авиандра, демо-реестр 2026

Агомелатин + Эсциталопрам · НЕТ ДАННЫХ

Механизм: В присланных материалах нет подтверждённого правила об этой конкретной паре.

Возможные эффекты: Отсутствие предупреждения не равнозначно установленной безопасности.

Что проверить: Проверить ОХЛП обоих, сопутствующие заболевания и остальные лекарства.

Источник правила: покрытие демобазы недостаточно

06 Для разработчика · критерии приёмки

01. ☐ Каталог сортируется по русскому алфавиту; поиск по торговому названию и МНН работает без перехода между вкладками.

02. ☐ Вкладка «Проверка сочетаний» имеет встроенный список выбора; «Добавить» оставляет врача в этой вкладке и показывает выбранный препарат без дублирования.

03. ☐ Открыть карточку из пары можно в отдельном состоянии, затем вернуться к проверке с сохранённым набором.

04. ☐ При выборе 3 препаратов отображаются ровно 3 пары, при 4 — 6; все пары проверяются независимо.

05. ☐ У каждого предупреждения показаны механизм, возможные последствия, степень, происхождение правила и ссылка на карточки.

06. ☐ Неоднозначное или отсутствующее правило не отображается как разрешение сочетать препараты.

07. ☐ Вкладка «Назначить пациенту» хранит независимый список препаратов и отдельные данные для каждого выбранного учебного пациента.

08. ☐ У каждого назначения есть доза, кратность, часы, еда, путь введения, начало, длительность и комментарий.

09. ☐ Без дозы и кратности черновик не сохраняется; при успешном сохранении выводится запись для конкретного учебного пациента.

10. ☐ Кнопка «Проверить сочетания» в черновике проверяет именно препараты текущего учебного пациента.

11. ☐ Смена пациента не переносит схему предыдущего пациента.

12. ☐ На сайте остаются старые разделы — первичный анамнез, тест-системы, дневник, карточка специалиста.

13. ☐ Везде указан демонстрационный статус; запрещён ввод реальных персональных медицинских данных.

Переход к реальной медицинской системе требует юридической и медицинской проверки: авторизации и разграничения ролей, безопасного сервера и хранения ПДн, локализации и версионирования инструкций, интероперабельности с ГРЛС, протоколирования действий врача, контроля клинических правил и экспертизы безопасности. Один статический HTML с localStorage этим требованиям не соответствует.