

# Numerične metode - preizkusi iz teorije

Ladisk

11. februar 2021

## Kazalo

<b>1</b>	<b>Datum: 11.1.2019</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Datum: 28.1.2019</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Datum: 11.2.2019</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Datum: 10.1.2020</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Datum: 25.1.2021</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Datum: 9.2.2021</b>	<b>21</b>

# 1 Datum: 11.1.2019

## 1. vprašanje

Podano tabelo podatkov:  $x = (0, 1, 2)$ ,  $y = (1, 4, 2)$  je potrebno interpolirati. Najprej predstavite interpolacijo podane tabele kot problem reševanja sistema linearnih enačb, nato predstavite Lagrangevo interpolacijsko metodo in jo uporabite na tabeli podatkov. Pojasnite razlike med obema pristopoma. Ali je rezultat enak? (35 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

Polinomska interpolacija: podane imamo 3 točke, zato uporabimo interpolacijo s polinomom 2. stopnje:

$$y = a_0 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_2. \quad (1)$$

Nastavimo sistem enačb oblike  $A \cdot x = b$ :

\_\_\_\_\_ Točk: 5

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Določimo neznanke (tukaj samo nakažemo rešitev, numerično pravilen postopek je z uporabo Gaussove eliminacije):

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

\_\_\_\_\_ Točk: 5

Lagrangeva metoda: enačbi Lagrangeve interpolacijske metode:

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^{n-1} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad (4)$$

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n-1} y_i \cdot l_i(x). \quad (5)$$

\_\_\_\_\_ Točk: 5

Najprej definiramo Lagrangeve polinome:

$$\begin{aligned} l_0(x) &= \frac{x-1}{0-1} \cdot \frac{x-2}{0-2} \\ l_1(x) &= \frac{x-0}{1-0} \cdot \frac{x-2}{1-2} \\ l_2(x) &= \frac{x-0}{2-0} \cdot \frac{x-1}{2-1} \end{aligned} \quad (6)$$

Definiramo Lagrangev interpolacijski polinom:

\_\_\_\_\_ Točk: 5

$$P(x) = 1 \cdot l_0(x) + 4 \cdot l_1(x) + 2 \cdot l_2(x). \quad (7)$$

\_\_\_\_\_ Točk: 5

Glavna razlika med metodama je, da pri Lagrangevi interpolaciji ni potrebno reševati sistema enačb, zato je takšen pristop numerično manj zahteven.

\_\_\_\_\_ Točk: 5

Metodi vrmeta enako interpolacijsko krivuljo.

\_\_\_\_\_ Točk: 5

## 2. vprašanje

Za drugi odvod izpeljite: centralno diferenčno shemo 2. reda natančnost in diferenčno shemo naprej 1. reda natančnosti. (35 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

Centralna diferenčna shema za 2. odvod: razvijemo Taylorjevo vrsto naprej in nazaj do 3. odvoda:

$$f(x+h) = f(x) + h f'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) + \frac{h^3}{6} f'''(x) + \mathcal{O}(h^4) \quad (1)$$

$$f(x-h) = f(x) - h f'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) - \frac{h^3}{6} f'''(x) + \mathcal{O}(h^4) \quad (2)$$

\_\_\_\_\_ Točk: 5

Enačbi seštejemo:

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2 f''(x) + \mathcal{O}(h^4) \quad (3)$$

in izrazimo drugi odvod:

$$f''(x) = \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2) \quad (4)$$

\_\_\_\_\_ Točk: 5

Pomembno je, da Taylorjevo vrsto razvijemo do vključno 3. odvoda, saj tako dobimo končno napako 2. reda (po deljenju s  $h^2$ ). Tretji odvod se nato ob seštevanju enačb izniči. V primeru, da bi vrsto razvili le do 2. odvoda, bi dobili končno napako 1. reda.

\_\_\_\_\_ Točk: 5

Diferenčna shema naprej: za diferenčno shemo naprej moramo razviti dve Taylorjevi vrsti:

$$f(x+h) = f(x) + h f'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) + \mathcal{O}(h^3) \quad (5)$$

$$f(x+2h) = f(x) + 2h f'(x) + \frac{4h^2}{2} f''(x) + \mathcal{O}(h^3) \quad (6)$$

\_\_\_\_\_ Točk: 5

Enačbo (5) pomnožimo z 2 in ji odštejemo enačbo (6):

$$2f(x+h) - f(x+2h) = \begin{aligned} & [2f(x) - f(x)] + \\ & [2h f'(x) - 2h f'(x)] + \\ & \left[ \frac{2h^2}{2} f''(x) - \frac{4h^2}{2} f''(x) \right] + \mathcal{O}(h^3) \end{aligned} \quad (7)$$

Izraz poenostavimo:

$$2f(x+h) - f(x+2h) = f(x) - h^2 f''(x) + \mathcal{O}(h^3) \quad (8)$$

\_\_\_\_\_ Točk: 5

Izrazimo drugi odvod. Ker enačbo delimo s  $h^2$  dobimo red napake 1:

$$f''(x) = \frac{f(x) - 2f(x+h) + f(x+2h)}{h^2} + \mathcal{O}(h) \quad (9)$$

\_\_\_\_\_ Točk: 5

Ker smo napako  $\mathcal{O}(h^3)$  delili s  $h^2$ , dobimo končno napako 1. reda.

\_\_\_\_\_ Točk: 5

### 3. vprašanje

Zapišite uteži Simpsonove 1/3 metodo za numerično integriranje. Za tabelo podatkov  $(x_0, x_1, \dots), (y_0, y_1, \dots)$  prikažite uporabo osnovnega in sestavljenega Simpsonovega pravila; komentirajte napako. Pokažite, kako lahko s pomočjo Richardsonove ekstrapolacije rezultata s korakom  $h$  in  $2h$  izračunamo boljši približek. (30 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

Uteži Simpsonove 1/3 metode:  $w = \left[\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right] \cdot h$

\_\_\_\_\_ Točk: 5

Za osnovno pravilo potrebujemo 3 ekvidistančne točke:

$$\begin{aligned} x &= [x_0, x_1, \dots] \\ y &= [y_0, y_1, \dots] \end{aligned}$$

Primer integrala:

$$I = \left( \frac{y_0}{3} + \frac{4 \cdot y_1}{3} + \frac{y_2}{3} \right) \cdot h \quad (1)$$

---

Točk: 5

Sestavljeno pravilo.

$$\begin{aligned} x &= [x_0, x_1, \dots] \\ y &= [y_0, y_1, \dots] \end{aligned}$$

Primer integrala:

$$I = \left( \frac{y_0}{3} + \frac{4 \cdot y_1}{3} + \frac{y_2}{3} + \frac{y_2}{3} + \frac{4 \cdot y_3}{3} + \frac{y_4}{3} \right) \cdot h \quad (2)$$

oziroma:

$$I = \left( \frac{y_0}{3} + \frac{4 \cdot y_1}{3} + \frac{2 \cdot y_2}{3} + \frac{4 \cdot y_3}{3} + \frac{y_4}{3} \right) \cdot h \quad (3)$$

---

Točk: 5

Pri sestavljenem 1/3 Simpsonovem pravilu je pomembno, da je število intervalov sodo. (Tukaj je pri-poročljiva **skica**)

---

Točk: 5

Napaka sestavljene Simpsonove metod je 4. reda:  $-\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\eta)$ .

---

Točk: 5

Izračunamo integral s korakom  $2h$  in korakom  $h$ :

$$I_{2h} = \left( \frac{y_0}{3} + \frac{4 y_2}{3} + \frac{y_4}{3} \right) \cdot 2h \quad (4)$$

$$I_h = \left( \frac{y_0}{3} + \frac{4 y_1}{3} + \frac{2 y_2}{3} + \frac{4 y_3}{3} + \frac{y_4}{3} \right) \cdot h \quad (5)$$

Za izboljšano aproksimacijo integrala uporabimo enačbo:

$$I = \frac{2^n I_h - I_{2h}}{2^n - 1} = \frac{16 I_h - I_{2h}}{15} \quad (6)$$

---

Točk: 5

## 2 Datum: 28.1.2019

### 1. vprašanje

Matriko:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 5 \\ 2 & 5 & 6 & 8 \end{bmatrix} \quad (1)$$

(1.) preoblikujte v Gaussovo eliminirano obliko. (2.) Kakšne oblike je matrika po preoblikovanju?

Če  $\mathbf{A}$  predstavlja razširjeno matriko sistema linearnih enačb in je zadnji stolpec vektor konstant, določite

(3.) rang osnovne in razširjene matrike. (4.) Kaj nam preoblikovana matrika lahko pove o sistemu enačb?

(5.) Ali ima podani sistem enolično rešitev? (6.) Katero operacijo izvedemo, da po Gaussovi eliminaciji dobimo rešitev sistema?

(35 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

(1.) Postopek preoblikovanja matrike  $\mathbf{A}$ :

$$\mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_0 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 6 & 8 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_2 - 2 \cdot \mathbf{A}_0 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_2 - 0.5 \cdot \mathbf{A}_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -0.5 \end{bmatrix} \quad (4)$$

(5)

\_\_\_\_\_ Točk: 10

(2.) Matrika je zgornje trikotna.

\_\_\_\_\_ Točk: 5

(3.) Rang razširjene matrike je enak 3. Rang osnovne matrike je enak 2.

\_\_\_\_\_ Točk: 5

(4.) Preoblikovana matrika nam pove rang osnovne matrike in rang razširjene matrike. Posledično izvemo ali ima sistem rešitev ali ne.

\_\_\_\_\_ Točk: 5

(5.) Tak sistem enačb **nima** enolične rešitve.

\_\_\_\_\_ Točk: 5

(6.) Da dobimo rešitev sistema enačb moramo uporabiti **obratno vstavljanje**.

\_\_\_\_\_ Točk: 5

### 2. vprašanje

Tabelo podatkov  $x_i$ ,  $y_i$  želimo aproksimirati s funkcijo  $f(x) = ax^{3/2} + b$ . Za podano funkcijo pokažite, kako to izvedemo s pomočjo metode najmanjše kvadratične napake? Nastavite sistem enačb za določitev parametrov  $a$  in  $b$ !

(30 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

Uporabimo enačbo za metodo najmanjših kvadratov:

$$S(a, b) = \sum_{i=0}^{n-1} (y_i - (ax_i^{3/2} + b))^2 \quad (1)$$

---

Točk: 5

Vemo, da v stacionarni točki velja:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = 0 \quad \text{in} \quad \frac{\partial S}{\partial b} = 0. \quad (2)$$

---

Točk: 5

Izvedemo odvajanje:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = 2 \cdot \sum_{i=0}^{n-1} (y_i - (a x_i^{3/2} + b)) \cdot x_i^{3/2}, \quad (3)$$

sledi:

$$0 = \sum_{i=0}^{n-1} (a x_i^3 + b x_i^{3/2} - x_i^{3/2} y_i) \quad (4)$$

---

Točk: 5

Iz:

$$\frac{\partial S}{\partial b} = 2 \cdot \sum_{i=0}^{n-1} (y_i - (a x_i^{3/2} + b)) \cdot (-1), \quad (5)$$

sledi:

$$0 = \sum_{i=0}^{n-1} (a x_i^{3/2} + b - y_i). \quad (6)$$

---

Točk: 5

Nastavimo lahko sistem enačb:

$$a \sum_{i=0}^{n-1} x_i^3 + b \sum_{i=1}^{n-1} x_i^{3/2} = \sum_{i=0}^{n-1} x_i^{3/2} y_i \quad (7)$$

in

$$a \sum_{i=1}^{n-1} x_i^{3/2} + b \sum_{i=1}^{n-1} 1 = \sum_{i=1}^{n-1} y_i \quad (8)$$

---

Točk: 5

### 3. vprašanje

Kakšna je razlika med reševanjem diferencialnih enačb glede na začetne pogoje in reševanjem glede na robne pogoje? Zapišite centralno diferenčno shemo za odvoda  $\dot{x}$  in  $\ddot{x}$ . Pokažite, kako za robna pogoja:  $x(t=0\text{ s}) = 1$  in  $x(t=2\text{ s}) = 0$  rešite diferencialno enačbo:  $\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ . Rešite s pomočjo centralne diferenčne sheme drugega reda. Uporabite fizikalne točke pri  $t = [0,1,2]$  s. (35 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

Pri začetnem problemu pri sistemu d.e. poznamo vrednosti vseh dodatnih enačb pri isti vrednosti neodvisne spremenljivke in tako lahko začnemo numerično integracijo. Pri robnem problemu dodatne enačbe, potrebne za rešitev d.e., poznamo pri različnih vrednosti neodvisne spremenljivke.

---

Točk: 5

Centralna diferenčna shema za  $\dot{x}$ :

$$\dot{x}_i = \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2h} \quad (1)$$

---

Točk: 5

Centralna diferenčna shema za  $\ddot{x}$ :

$$\ddot{x}_i = \frac{x_{i-1} - 2x_i + x_{i+1}}{h^2} \quad (2)$$

---

Točk: 5

Enačbo zapišemo s pomočjo centralne diferenčne sheme:

$$\ddot{x} = -c \dot{x} - k x \quad (3)$$

$$\frac{x_{i-1} - 2x_i + x_{i+1}}{h^2} = -c \frac{-x_{i-1} + x_{i+1}}{2h} - k x_i \quad (4)$$

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

Ker vemo, da uporabljamo samo točke pri  $t = (0, 1, 2)$  sekund, **lahko zapišemo**  $x_i = x_1$  **samo pri 1 sekundi**. To pomeni, da dobimo:

$$x_0 = x(0 \text{ s}) \quad (5)$$

$$x_1 = x(1 \text{ s}) \quad (6)$$

$$x_2 = x(2 \text{ s}) \quad (7)$$

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

Če te vrednosti vstavimo poznane vrednosti  $x(0) = 1$  in  $x(2) = 0$  v enačbo (4) dobimo:

$$\frac{1 - 2x_1 + 0}{h^2} = -c \frac{-1 + 0}{2h} - k x_1 \quad (8)$$

oziroma

$$\frac{-2x_1 + 1}{h^2} = \frac{c}{2h} - k x_1 \quad (9)$$

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

upoštevamo še, da je korak  $h$  enak 1 (točke (0, 1, 2) si sledijo s korakom 1):

$$-2x_1 + 1 = \frac{c}{2} - k x_1 \quad (10)$$

in izrazimo  $x_1$ :

$$x_1 = \frac{c - 2}{2(k - 2)} \quad (11)$$

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

### 3 Datum: 11.2.2019

#### 1. vprašanje

Matriki  $\mathbf{A}$ :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

z uporabo principov sistema linearnih enačb, izračunajte inverzno matriko. (35 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

Vemo, da mora veljati:

$$\mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} \quad (2)$$

kar lahko drugače zapišemo kot:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

---

Točk: 5

Sedaj rešujemo 3 različne sisteme enačb. Vsak sistem enačb nam poda en stolpec inverza matrike  $\mathbf{A}$ .

**Prvi sistem**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$a_1 + 2a_2 + 3a_3 = 1 \quad (5)$$

$$a_1 + a_3 = 0 \quad (6)$$

$$-a_1 + a_2 + a_3 = 0 \quad (7)$$

---

Točk: 5

Iz enačbe (6) izrazimo  $a_1$  in vstavimo v enačbo (7):

$$a_1 = -a_3 \quad (8)$$

$$-(-a_3) + a_2 + a_3 = 0 \quad (9)$$

$$a_2 = -2a_3 \quad (10)$$

$a_1$  in  $a_2$  vstavimo v enačbo (5):

$$(-a_3) + 2(-2a_3) + 3a_3 = 1 \quad (11)$$

$$-a_3 - 4a_3 + 3a_3 = 1 \quad (12)$$

$$-2a_3 = 1 \quad (13)$$

Sedaj lahko izračunamo vrednosti:

$$a_3 = -\frac{1}{2} \quad (14)$$

$$a_1 = \frac{1}{2} \quad (15)$$

$$a_2 = 1 \quad (16)$$

---

Točk: 5



### Drugi sistem

Enak postopek ponovimo tudi za drugi sistem.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (17)$$

$$b_1 + 2b_2 + 3b_3 = 0 \quad (18)$$

$$b_1 + b_3 = 1 \rightarrow b_1 = 1 - b_3 \quad (19)$$

$$-b_1 + b_2 + b_3 = 0 \rightarrow -(1 - b_3) + b_2 + b_3 = 0 \rightarrow b_2 = 1 - 2b_3 \quad (20)$$

---

Točk: 5

Vstavimo v enačbo (18) in izračunamo vrednosti:

$$(1 - b_3) + 2(1 - 2b_3) + 2b_3 = 0 \rightarrow b_3 = \frac{3}{2} \quad (21)$$

$$b_1 = -\frac{1}{2} \quad (22)$$

$$b_2 = -2 \quad (23)$$

---

Točk: 5

### Tretji sistem

Enak postopek ponovimo tudi za tretji sistem.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (24)$$

$$c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 0 \quad (25)$$

$$c_1 + c_3 = 0 \rightarrow c_1 = -c_3 \quad (26)$$

$$-c_1 + c_2 + c_3 = 1 \rightarrow -(-c_3) + c_2 + c_3 = 1 \rightarrow c_2 = 1 - 2c_3 \quad (27)$$

---

Točk: 5

Vstavimo v enačbo (25) in izračunamo vrednosti:

$$(-c_3) + 2(1 - 2c_3) + 2c_3 = 0 \rightarrow c_3 = 1 \quad (28)$$

$$c_1 = -1 \quad (29)$$

$$c_2 = -1 \quad (30)$$

---

Točk: 5

Vse dobljene vrednosti  $a_i$ ,  $b_i$  in  $c_i$  vstavimo v enačbo (3). Vidimo, da smo izračunali inverzno matriko:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 0,5 & -0,5 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -0,5 & 1,5 & 1 \end{bmatrix} \quad (31)$$

## 2. vprašanje

Predstavite bisekcijsko metodo za numerično reševanje enačb; prikažite postopek tudi na primeru funkcije  $f(x) = x^2 - 3x - 3$  in izvedite dva koraka iskanja ničle (začnite z  $x_0 = -3$ ,  $x_1 = 0$ ) (30 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

Povzetek metode je:

- najprej preverimo če imata vrednosti  $f(x_0)$  in  $f(x_1)$  različna predznaka,

- interval  $[x_0, x_1]$  razdelimo na pol in dobimo  $x_2 = (x_0 + x_1)/2$ ,
- če imata  $f(x_0)$  in  $f(x_2)$  različne predznake, je nov interval  $[x_0, x_2]$ , sicer je  $[x_2, x_1]$ ,
- v naslednjem koraku definiramo nov korak  $[x_0, x_1]$  glede na prej določen interval.
- postopek ponavljamo dokler ne dosežemo želene natančnosti:  $|x_1 - x_0| < \varepsilon$ .

Bisekcijska metoda sicer ne zahteva, vendar opombo, da preverjamo končnost vsote  $|f(x_0)| + |f(x_1)|$  za preprečitev identifikacije pola ali večkratne, štejemo pozitivno.

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

Tukaj je na mestu **SKICA**

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

Izvedemo iskanje ničle za podano funkcijo. Preverimo če na intervalu  $[x_0, x_1]$  obstaja ničla:

$$f(x_0 = -3) = 15 \quad (1)$$

$$f(x_1 = 0) = -3 \quad (2)$$

$$\text{sign}(f(x_0)) \neq \text{sign}(f(x_1)) \quad (3)$$

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

### Prvi korak

Najprej izračunamo vrednost  $x_2$ :

$$x_2 = \frac{x_0 + x_1}{2} = -1,5 \quad (4)$$

izračunamo vrednosti pri  $x_0 = -3$ ,  $x_1 = 0$  in  $x_2 = -1,5$ :

$$f_0 = f(-3) = (-3)^2 - 3(-3) - 3 = 15 \quad (5)$$

$$f_1 = f(0) = 0^2 - 3 \cdot 0 - 3 = -3 \quad (6)$$

$$f_2 = f(-1,5) = (-1,5)^2 - 3(-1,5) - 3 = 3,75 \quad (7)$$

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

Vrednosti  $f_0$  in  $f_2$  imata enaka predznaka, zato definiramo nov interval:  $[-1,5; 0]$ . To postane naš novi začetni interval:  $x_0 = -1,5$ ,  $x_1 = 0$ .

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

### Drugi korak

$$x_2 = \frac{-1,5 + 0}{2} = -0,75 \quad (8)$$

Izračunamo vrednosti funkcije:

$$f_0 = f(-1,5) = 3,75 \quad (9)$$

$$f_1 = f(0) = -3 \quad (10)$$

$$f_2 = f(-0,75) = -0,1875 \quad (11)$$

Vrednosti  $f_0$  in  $f_2$  imata različna predznaka, zato definiramo nov interval:  $[-1,5; -0,75]$ . To postane naš novi začetni interval:  $x_0 = -1,5$ ,  $x_1 = -0,75$ .

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

### 3. vprašanje

Predstavite Eulerjevo metodo za reševanje diferencialnih enačb.

Na primeru diferencialne enačbe:  $\ddot{x} + kx = 0$ , pokažite kako diferencialno enačbo 2. reda preoblikujemo na sistem dveh diferencialnih enačb 1. reda. Če so začetni pogoji:  $x(0) = 0$ ,  $\dot{x}(0) = 1$ , potem pokažite izračun prvih dveh časovnih korakov z Eulerjevo metodo ( $k = 1$  in korak:  $h = 1$ ). (35 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

Eulerjeva metoda temelji na razvoju Taylorjeve vrste do drugega člena:

$$y(t+h) = y(t) + y'(t, y(t))h + \mathcal{O}(h^2) \quad (1)$$

Izrazimo prvi odvod:

$$y'(t) = f(t, y) \quad (2)$$

---

Točk: 5

Koraki Eulerjeve metode so naslednji:

1.  $i = 0$ , poznamo  $y(t_0)$  in  $y'(t_0, y(t_0))$

2. Izračunamo vrednost funkcije pri  $t_{i+1} = t_i + h$

$$y_{i+1} = y_i + f(t_i, y_i) h \quad (3)$$

3.  $i = i + 1$  in ponovimo korak 2

Koraka 2 in 3 ponavljamo do  $t_n$ .

---

Točk: 5

Diferencialno enačbo  $\ddot{x} + kx = 0$  zapišemo kot sistem diferencialnih enačb prvega reda. Preoblikujemo enačbo:

$$\ddot{x} = -kx \quad (4)$$

Zapišemo nove oznake:

$$y_0 = x \quad (5)$$

$$y_1 = \dot{x} \quad (6)$$

---

Točk: 5

in jih odvajamo:

$$y'_0 = x' = y_1 \quad (7)$$

$$y'_1 = x'' = -kx_0 \quad (8)$$

Dobili smo sistem dveh diferencialnih enačb prvega reda.

---

Točk: 5

Poznamo začetne pogoje:

$$x(0) = 0 \quad (9)$$

$$\dot{x}(0) = 1 \quad (10)$$

in tudi vrednost:

$$\ddot{x}(0) = -kx(0) = 0 \quad (11)$$

---

Točk: 5

### Prvi korak

Sistem enačb v prvi točki:

$$y_0(t_1) = y_0(0) + y_1(0) h = 0 + 1 \cdot 1 = 1 \quad (12)$$

$$y_1(t_1) = y_1(0) - k y_0(0) h = 1 - 1 \cdot 0 \cdot 1 = 1 \quad (13)$$

---

Točk: 5

### Drugi korak

Sistem enačb v drugi točki:

$$y_0(t_2) = y_0(t_1) + y_1(t_1) h = 1 + 1 \cdot 1 = 2 \quad (14)$$

$$y_1(t_2) = y_1(t_1) - k y_0(t_1) h = 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 = 0 \quad (15)$$

---

Točk: 5

## 4 Datum: 10.1.2020

### 1. vprašanje

Kako matriko preoblikujemo v t.i. vrstično kanonično obliko? Zakaj se uporablja vrstična kanonična oblika matrike?

Matriko:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 5 \\ 2 & 5 & 6 & 8 \end{bmatrix} \quad (1)$$

preoblikujte v vrstično kanonično obliko.

Če  $\mathbf{A}$  predstavlja razširjeno matriko sistema linearnih enačb in je zadnji stolpec vektor konstant, določite rang osnovne in razširjene matrike. Ali ima takšen sistem enolično rešitev? (30 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

S pomočjo množenja in seštevanja vrstic lahko matriko preoblikujemo tako, da:

- so ničelne vrstice na dnu matrike
- je prvi neničelni element vrstice desno od prvih neničelnih elementov prejšnjih vrstic
- je pivot enak 1 (pivot je prvi neničelni element v vrstici)
- pivot je edini neničelni element v stolpcu

Dobimo vrstično kanonično obliko.

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

Vrstično kanonično obliko uporabljamo za določitev ranga matrike. Rang matrike je enak številu neničelnih vrstic kanonične oblike.

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

Postopek preoblikovanja matrike  $\mathbf{A}$ :

$$\mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_0 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 6 & 8 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_2 - 2 \cdot \mathbf{A}_0 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_2 - 0.5 \cdot \mathbf{A}_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -0.5 \end{bmatrix} \quad (4)$$

(5)

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

$$\mathbf{A}_0 = \mathbf{A}_0 - \mathbf{A}_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -0.5 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_1/2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & -0.5 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$\mathbf{A}_2 = -2 \mathbf{A}_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_2/2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$\mathbf{A}_0 = \mathbf{A}_0 - 3 \mathbf{A}_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

Rang razširjene matrike je enak 3. Rang osnovne matrike je enak 2. \_\_\_\_\_  
Točk: 5

Tak sistem enačb **nima** enolične rešitve. \_\_\_\_\_  
Točk: 5

## 2. vprašanje

Gaussov integracijski pristop je definiran z izrazom:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} w_i f(x_i). \quad (1)$$

Naloga:

- Pojasnite zgornji izraz ter definirajte in pojasnite uporabljene simbole.
- Pojasnite princip Gaussovega integracijskega pristopa glede na pristop Newton-Cotes.
- Določite parametre Gaussove integracije za linearno funkcijo:  $f(x) = P_1(x) = A_0 + A_1 x$ .
- Določite parametre Gaussove integracije za polinom 3. stopnje:  
 $f(x) = P_3(x) = A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + A_3 x^3$  (namig: potrebni sta dve vozlišči, ustavite se pri sistemu enačb).

(35 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

Naloga:

- Levi del predstavlja integral, katerega želimo določiti, desni del pa njegovo numerično oceno. Pri tem je  $f(x)$  podintegralska funkcija, ki jo integriramo po neodvisni spremenljivki  $x$  od spodnje meje  $a$  do zgornje meje  $b$ .  $w_i$  so neznane uteži,  $x_i$  lega neznanega vozlišča.  $i$  je indeks vozlišča, katerih je  $n$ . \_\_\_\_\_  
Točk: 7.5
- Newton-Cotes išče površino interpolirane polinomske funkcije. Cilj Gaussovega integracijskega pristopa je integral funkcije  $f(x)$  nadomestiti z uteženo (neznano) vsoto vrednosti funkcije pri (neznani) diskretnih vrednostih  $f(x_i)$ . \_\_\_\_\_  
Točk: 7.5

- Integral linearne funkcije je (leva stran):

$$\int_a^b P_1(x) dx = \left( A_0 x + A_1 \frac{x^2}{2} \right)_a^b = -A_0 a + A_0 b - \frac{A_1 a^2}{2} + \frac{A_1 b^2}{2}. \quad (2)$$

Desna vsota (ob predpostavki, da je  $n = 1$ ):

$$w_0 P_1(x_0) = w_0 A_0 + w_0 A_1 x_0. \quad (3)$$

---

Točk: 5

Na podlagi izrazov (2) in (3) ob predpostavki poljubnega polinoma (npr.  $A_0 = 1$  in  $A_1 = 0$ ) izpeljemo rešitev:

$$w_0 = b - a, \quad x_0 = \frac{b + a}{2}. \quad (4)$$

---

Točk: 5

4. Postopamo podobno kakor pri linearni funkciji, integral funkcije je (leva stran):

$$\int_a^b P_3(x) dx = -A_0 a + A_0 b - \frac{A_1 a^2}{2} + \frac{A_1 b^2}{2} - \frac{A_2 a^3}{3} + \frac{A_2 b^3}{3} - \frac{A_3 a^4}{4} + \frac{A_3 b^4}{4}. \quad (5)$$

Desna vsota (ob predpostavki, da je  $n = 2$ ):

$$\sum_{i=0}^{n-1} w_i P_3(x_i) = A_0 w_0 + A_0 w_1 + A_1 w_0 x_0 + A_1 w_1 x_1 + A_2 w_0 x_0^2 + A_2 w_1 x_1^2 + A_3 w_0 x_0^3 + A_3 w_1 x_1^3. \quad (6)$$

---

Točk: 5

Na podlagi izrazov (5) in (6) izpeljemo rešitev (štiri enačbe za štiri neznanke:  $x_0, x_1, w_0, w_1$ ):

$$-a + b = w_0 + w_1, \quad (7)$$

$$-\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} = w_0 x_0 + w_1 x_1, \quad (8)$$

$$-\frac{a^3}{3} + \frac{b^3}{3} = w_0 x_0^2 + w_1 x_1^2, \quad (9)$$

$$-\frac{a^4}{4} + \frac{b^4}{4} = w_0 x_0^3 + w_1 x_1^3. \quad (10)$$

---

Točk: 5

### 3. vprašanje

1. Predstavite Eulerjevo metodo za reševanje diferencialnih enačb.
2. Kako določimo napako pri Eulerjevi metodi?
3. V čem se eksplcitna Eulerjeva metoda razlikuje od implicitne Eulerjeve metode? Pojasnite prednosti in slabosti enega ali drugega pristopa!

(35 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

1. Eulerjeva metoda temelji na razvoju Taylorjeve vrste do drugega člena:

$$y(t + h) = y(t) + y'(t, y(t)) h + \mathcal{O}(h^2) \quad (1)$$

Izrazimo prvi odvod:

$$y'(t) = f(t, y) \quad (2)$$

---

Točk: 5

Koraki Eulerjeve metode so naslednji:

(a)  $i = 0$ , poznamo  $y(t_0)$  in  $y'(t_0, y(t_0))$

(b) Izračunamo vrednost funkcije pri  $t_{i+1} = t_i + h$

$$y_{i+1} = y_i + f(t_i, y_i) h \quad (3)$$

(c)  $i = i + 1$  in ponovimo korak 2

Koraka 2 in 3 ponavljamo do  $t_n$ .

\_\_\_\_\_ Točk: 5

2. Lokalna napaka Eulerjeve metode je drugega reda  $\mathcal{O}(h^2)$ , globalna je prvega reda  $\mathcal{O}(h^1)$ .

Točna rešitev  $y(t_n)$  pri velikosti koraka  $h$  je:  $y(t_n) = y_{n,h} + E_h$ , kjer je  $y_{n,h}$  numerični približek in  $E_h$  napaka metode. Ker je globalna napaka prvega reda, lahko napako zapišemo kot:  $E_h = k h$ .

Podobno lahko za velikost koraka  $2h$  zapišemo:  $y(t_n) = y_{n,2h} + E_{2h}$ , kjer je  $y_{n,2h}$  numerični približek in  $E_{2h}$  napaka metode:  $E_{2h} = k 2h$ .

\_\_\_\_\_ Točk: 5

Ob predpostavki, da je konstanta  $k$  pri koraku  $h$  in koraku  $2h$  enaka, lahko določimo oceno napake:

$$E_h = k h = y_{n,h} - y_{n,2h}. \quad (4)$$

\_\_\_\_\_ Točk: 5

3. Implicitna Eulerjeva metoda temelji na izrazu:

$$y(t+h) = y(t) + y'(t+h, y(t+h)) h + \mathcal{O}(h^2). \quad (5)$$

Ko zanemarimo napako, dobimo izraz

$$y(t+h) = y(t) + y'(t+h, y(t+h)) h, \quad (6)$$

kateri predstavlja nelinearno enačbo z neznanko  $y(t+h)$ .

\_\_\_\_\_ Točk: 10

Prednost implicitne Eulerjeve metode je, da je bolj stabilna in omogoča večje korake integracije kakor eksplicitna oblika. Slabost metode je, da je numerično bolj zahtevna, saj na vsakem časovnem koraku zahteva iskanje rešitve nelinearne enačbe.

\_\_\_\_\_ Točk: 5

## 5 Datum: 25.1.2021

### 1. vprašanje

Podana je tabela vrednosti:  $x = [1, 2, 3, 4, 5]$ ,  $y = [2, 4, 2, 3, 5]$ . Spodnje naloge se navezujejo na Simpsonovo 1/3 metodo za integriranje.

1. Definirajte uteži metode. (5)
2. Kako je definirana napaka podane metode? (5)
3. V katerem primeru metoda poda točen rezultat? (5)
4. Izračunajte vrednost integrala v primeru koraka  $h = 1$  in  $h = 2$ . (5)
5. Izpeljite Richardsonovo ekstrapolacijo za podano metodo. (10)
6. S pomočjo Richardsonove ekstrapolacije izračunajte boljši približek. (5)

(35 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

1. Uteži Simpsonove 1/3 metode so:

$$h \cdot \left[ \frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3} \right]$$

kjer je  $h$  korak delitve osi neodvisne spremenljivke.

\_\_\_\_\_ Točk: 5

2. Ocena napake Simpsonove 1/3 metode je definirana kot:

$$E = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi).$$

Napaka je torej lokalno 5. reda, definirana z neznano vrednostjo 4. odvoda  $f^{(4)}(\xi)$ .

Globalno je napaka 4. reda, saj pri  $n = (b - a)/h$  intervalih napako naredimo  $n$  krat:

$$E = -\frac{(b - a) h^4}{180} f^{(4)}(\xi).$$

Opomba: kot pravilno štejemo pravilno definiran red lokalne ali red globalne napake. \_\_\_\_\_ Točk: 5

3. Simpsonova 1/3 metoda poda točen rezultat pri integriranju polinomov reda 3 ali manj.

\_\_\_\_\_ Točk: 5

4. Vrednost integrala podane funkcij pri koraku  $h = 1$ :

$$x = [1, 2, 3, 4, 5]$$

$$y = [2, 4, 2, 3, 5]$$

$$A = 1 \cdot \left[ \frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3} \right] \quad (\text{sestavljena Simpsonova 1/3 metoda})$$

$$I = \sum_i A_i f(x_i)$$

$$= \frac{2}{3} + \frac{16}{3} + \frac{4}{3} + \frac{12}{3} + \frac{5}{3}$$

$$= \frac{39}{3}$$

$$I_h = 13$$



Vrednost integrala podane funkcij pri koraku  $h = 2$ :

$$\begin{aligned}x &= [1, 3, 5] \\y &= [2, 2, 5] \\A &= 2 \cdot \left[\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right] \quad (\text{osnovna Simpsonova } 1/3 \text{ metoda}) \\I &= \sum_i A_i f(x_i) \\&= \frac{4}{3} + \frac{16}{3} + \frac{10}{3} \\&= \frac{30}{3} \\I_{2h} &= 10\end{aligned}$$

---

Točk: 5

5. Izpeljava Richardsonove ekstrapolacije za sestavljeno Simpsonovo 1/3 metodo: Napako pri integriranju ocneimo pri dveh korakih,  $h$  in  $2h$ :

$$\int_a^b f(x) dx = I_h + E_h = I_{2h} + E_{2h},$$

kjer sta  $I_h$  in  $E_h$  približek integrala in ocena napake po sestavljeni Simpsonovi 1/3 metodi pri koraku  $h$ ,  $I_{2h}$  in  $E_{2h}$  pa analogno pri koraku  $2h$ .

Velja torej:

$$I_{2h} - I_h = E_h - E_{2h}$$

Ocena napake sestavljene Simpsonove 1/3 metode:

$$E = -\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\eta)$$

Če predpostavimo, da je  $f^{(4)}(\eta)$  pri obeh korakih enak, lahko zapišemo (točno definiranje napake ni bistveno, pomembno je, da napišete, da je napaka 4. reda pomnožena s konstanto  $K$ ):

$$\begin{aligned}E_h &= -\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\eta) = h^4 K \\E_{2h} &= -\frac{b-a}{180} (2h)^4 f^{(4)}(\eta) = 16h^4 K\end{aligned}$$

in torej velja:

$$I_{2h} - I_h = -15h^4 K.$$

Izrazimo lahko  $K$ :

$$K = \frac{I_h - I_{2h}}{15h^4}$$

in napako pri koraku  $h$ :

$$E_h = h^4 K = \frac{I_h - I_{2h}}{15}.$$

Izboljšan približek integrala  $I_h$  torej je:

$$I_h^* = I_h + E_h = I_h + \frac{I_h - I_{2h}}{15} = \frac{16}{15} I_h - \frac{1}{15} I_{2h}$$

---

Točk: 10

6. Izboljšan približek zgornjega integrala z Richardsonovo ekstrapolacijo:

$$\begin{aligned} I_h^* &= \frac{16}{15} I_h - \frac{1}{15} I_{2h} \\ &= \frac{16}{15} \cdot 13 - \frac{1}{15} \cdot 10 \\ &= \frac{208 - 10}{15} \\ &= 13.2 \end{aligned}$$

\_\_\_\_\_  
Točk: 5

## 2. vprašanje

Izpeljite aproksimacijo drugega odvoda po metodi končnih razlik:

1. Z uporabo centralne diferenčne sheme za red natančnosti 2. (20)
2. Z uporabo centralne diferenčne sheme za red natančnosti 4. (15)

(35 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

1. Drugi odvod po metodi končnih razlik s centralno diferenčno shemo za red natančnosti 2:

Funkcijo  $f(x)$  razvijemo v Taylorjevo vrsto v okolici točke  $x$  s korakom  $h$ , do člena 3. reda:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + f'' \frac{h^2}{2} + f''' \frac{h^3}{6} + O(h^4)$$

S korakom  $-h$ :

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + f'' \frac{h^2}{2} - f''' \frac{h^3}{6} + O(h^4)$$

Zgornji enačbi seštejemo, odštejejo se členi z lihimi odvodi:

$$f(x-h) + f(x+h) = 2f(x) + f''h^2 + O(h^4)$$

Izrazimo drugi odvod,  $f''(x)$  (delimo zgornjo enačbo s  $h^2$ ):

$$f''(x) = \frac{1}{h^2} (f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)) + O(h^2)$$

Uteži centralne diferenčne sheme za 2. odvod in red natančnosti 2:

$$\frac{1}{h^2} [1, -2, 1]$$

\_\_\_\_\_  
Točk: 20

2. Drugi odvod po metodi končnih razlik s centralno diferenčno shemo za red natančnosti 4.

Funkcijo  $f(x)$  razvijemo v Taylorjevo vrsto v okolici točke  $x$  s korakom  $h$ , do člena 5. reda:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + f'' \frac{h^2}{2} + f''' \frac{h^3}{6} + f^{iv} \frac{h^4}{24} + f^v \frac{h^5}{120} + O(h^6)$$

S korakom  $-h$ :

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + f'' \frac{h^2}{2} - f''' \frac{h^3}{6} + f^{iv} \frac{h^4}{24} - f^v \frac{h^5}{120} + O(h^6)$$

Zgornji enačbi seštejemo, odštejejo se členi z lihimi odvodi:

$$f(x-h) + f(x+h) = 2f(x) + f''h^2 + f^{iv} \frac{h^4}{12} + O(h^6) \quad (1)$$

Enak postopek izvedemo še za koraka  $2h$  in  $-2h$ :

$$f(x-2h) + f(x+2h) = 2f(x) + 4f''h^2 + f^{iv} \frac{16h^4}{12} + O(h^6) \quad (2)$$

Znebiti se želimo člena s 4. odvodom v zgornjih enačbah. Enačbo 1 pomnožimo z  $(-16)$  in jo prištejmo enačbi 2:

$$f(x-2h) - 16f(x-h) + 30f(x) - 16f(x+h) + f(x+2h) = -12f''h^2 + O(h^6)$$

Izrazimo drugi odvod,  $f''(x)$  (množimo zgornjo enačbo z  $1/(-12h^2)$ ):

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{1}{-12h^2} \left( f(x-2h) - 16f(x-h) + 30f(x) - 16f(x+h) + f(x+2h) \right) + O(h^4) \\ &= \frac{1}{h^2} \left( -\frac{1}{12}f(x-2h) + \frac{4}{3}f(x-h) - \frac{5}{2}f(x) + \frac{4}{3}f(x+h) - \frac{1}{12}f(x+2h) \right) + O(h^4) \end{aligned}$$

Uteži centralne diferenčne sheme za 2. odvod in red natančnosti 4:

$$\frac{1}{h^2} \left[ -\frac{1}{12}, \frac{4}{3}, -\frac{5}{2}, \frac{4}{3}, -\frac{1}{12} \right]$$

Točk: 15

### 3. vprašanje

Podana je diferencialna enačba  $y''(t) - 6y'(t) + 3y(t) = e^{5t} \cos(5t)$ , katero je treba rešiti za  $0 \leq t \leq 2$  in so podane dodatne omejitve  $y(0) = 1$  in  $y'(2) = 5$ .

Odgovorite na vprašanja:

1. Katerega reda je diferencialna enačba in kateri problem reševanja diferencialnih enačb predstavlja? (5)
2. Katere metode za podobne probleme diferencialnih enačb smo spoznali? Na kratko jih opišite. (10)
3. Kako sta s centralno diferenčno shemo definirana prvi in drugi odvod (reda natančnosti 2)? (5)
4. Dano diferencialno enačbo s pomočjo centralne diferenčne sheme preoblikujte v linearno enačbo. (10)

(30 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

1. Diferencialna enačba je reda 2, predstavlja robni problem.

Točk: 5

2. Numerične metode reševanja diferencialnih enačb z robnim problemom:

**Streška metoda** : Z rešitvijo problema nelinearnih enačb določamo vrednosti manjkajočih začetnih pogojev (nepoznane začetne vrednost na robu A), s katerimi zadostimo podanim robnim pogojem (na robu B), ki jih pri reševanju začetnega problema še nismo upoštevali .

Ko smo ustrezne neznane začetne vrednosti določili, lahko robni problem rešujemo kot začetni problem.

**Metoda končnih razlik** : V diferencialni enačbi *odvode neznane funkcije*  $y(x)$  *zapišemo z uporabo diferenčnih shem* po metodi končnih razlik.

Območje reševanja problema  $x \in [A, B]$  *diskretiziramo* (razdelimo na ekvidistantne podintervale).

Zapišemo *sistem linearnih enačb*: v notranjih točkah velja diferencialna enačba, z odvodi, zapisanimi z uporabo diferenčnih shem, na robovih pa veljajo robni pogoji.

Rešitev - vrednosti  $y(x)$  določimo z *rešitvijo sistema linearnih enačb*.

---

Točk: 10

3. Definicija prvega odvoda s centralno diferenčno shemo (red natančnosti 2):

$$y'(x) = \frac{1}{h} (-0.5y(x-h) + 0.5y(x+h))$$

Definicija drugega odvoda s centralno diferenčno shemo (red natančnosti 2):

$$y''(x) = \frac{1}{h^2} (y(x-h) - 2y(x) + y(x+h))$$

---

Točk: 5

4. Pretvorba diferencialne enačbe v linearno enačbo s pomočjo centralne diferenčne sheme:

$$y''(t) - 6y'(t) + 3y(t) = e^{5t} \cos(5t)$$

Prvi in drugi odvod  $y$ , zapisana s centralno diferenčno shemo:

$$\begin{aligned} y'_i &= -\frac{1}{2h}y_{i-1} + \frac{1}{2h}y_{i+1} \\ y''_i &= \frac{1}{h^2}y_{i-1} - \frac{2}{h^2}y_i + \frac{1}{h^2}y_{i+1} \end{aligned}$$

Izraza vstavimo v diferencialno enačbo:

$$\frac{1}{h^2}y_{i-1} - \frac{2}{h^2}y_i + \frac{1}{h^2}y_{i+1} - 6\left(-\frac{1}{2h}y_{i-1} + \frac{1}{2h}y_{i+1}\right) + 3y_i = e^{5t} \cos(5t)$$

Poenostavimo:

$$y_{i-1} \left( \frac{1}{h^2} + \frac{3}{h} \right) + y_i \left( -\frac{2}{h^2} + 3 \right) + y_{i+1} \left( \frac{1}{h^2} - \frac{3}{h} \right) = e^{5t} \cos(5t)$$

Lahko še pomnožimo s  $h^2$ :

$$y_{i-1} (1 + 3h) + y_i (3h^2 - 2) + y_{i+1} (1 - 3h) = e^{5t} \cos(5t) h^2$$

---

Točk: 10

## 6 Datum: 9.2.2021

### 1. vprašanje

Tabelo podatkov  $x_i, y_i$  želimo aproksimirati s funkcijo  $f(x) = ax^{-5} + b$ . Za podano funkcijo pokažite, kako to izvedemo s pomočjo metode najmanjše kvadratične napake? Nastavite sistem enačb za določitev parametrov  $a$  in  $b$ ! (30 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

Aproksimiramo s funkcijo  $f(x) = ax^{-5} + b$ . Kvadratična napaka aproksimacije je definirana kot vsota kvadratov razlik med točkami za aproksimacijo  $(x_i, y_i)$  in rezultatom aproksimacije  $y = f(x_i)$ :

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} (y_i - f(x_i))^2 = \sum_{i=0}^{n-1} (y_i - (ax_i^{-5} + b))^2$$

\_\_\_\_\_ Točk: 5

Iščemo vrednosti parametrov  $a, b$ , pri katerih je kvadratična napaka  $S$  minimalna.  $S$  odvajamo po parametrih  $a, b$ , minimum najdemo, ko sta oba odvoda enaka 0:

$$\frac{dS}{da} = 2 \sum_{i=0}^{n-1} (y_i - ax_i^{-5} - b) (-x_i^{-5}) = 0$$

$$\frac{dS}{db} = 2 \sum_{i=0}^{n-1} (y_i - ax_i^{-5} - b) (-1) = 0$$

\_\_\_\_\_ Točk: 10

Enačbi lahko na obeh straneh enačaja delimo z 2 in preoblikujemo ( $a$  in  $b$  sta konstanti):

$$\frac{dS}{da} = a \sum_{i=0}^{n-1} x_i^{-10} + b \sum_{i=0}^{n-1} x_i^{-5} - \sum_{i=0}^{n-1} x_i^{-5} y_i = 0$$

$$\frac{dS}{db} = a \sum_{i=0}^{n-1} x_i^{-5} + b \sum_{i=0}^{n-1} 1 - \sum_{i=0}^{n-1} y_i = 0$$

\_\_\_\_\_ Točk: 10

Zapišemo sistem enačb:

$$\begin{bmatrix} \sum x_i^{-10} & \sum x_i^{-5} \\ \sum x_i^{-5} & \sum 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a \\ b \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \sum x_i^{-5} y_i \\ \sum y_i \end{Bmatrix}$$

\_\_\_\_\_ Točk: 5

### 2. vprašanje

Diferencialna enačba  $y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x)$  ima dodatni enačbi  $y(a) = \alpha, y(b) = \beta$  in zato predstavlja robni problem.

1. Kako sta s centralno diferenčno shemo definirana prvi in drugi odvod (reda natančnosti 2)? (5)
2. Dano diferencialno enačbo s pomočjo centralne diferenčne sheme preoblikujte v linearno enačbo. (10)
3. Definirajte sistem enačb za 5 točk  $(y_0, y_1, y_2, y_3, y_4)$ , kjer velja  $x_0 = a$  in  $x_4 = b$ . (10)
4. Ali lahko Richardsonovo eksrapolacijo v tem primeru uporabimo za izboljšanje rezultata? Če da, kako? (10)

(35 %)

Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).

1. Prvi in drugi odvod  $y$ , zapisana s centralno diferenčno shemo:

$$y'_i = -\frac{1}{2h}y_{i-1} + \frac{1}{2h}y_{i+1}$$
$$y''_i = \frac{1}{h^2}y_{i-1} - \frac{2}{h^2}y_i + \frac{1}{h^2}y_{i+1}$$

\_\_\_\_\_ Točk: 5

2. Izraza za prvi in drugi odvod vstavimo v diferencialno enačbo (zdaj zapisano za diskretne vrednosti  $x_i, y_i$ ):

$$\frac{1}{h^2}y_{i-1} - \frac{2}{h^2}y_i + \frac{1}{h^2}y_{i+1} - p(x_i) \left( -\frac{1}{2h}y_{i-1} + \frac{1}{2h}y_{i+1} \right) - q(x_i)y_i = r(x_i)$$

Poenostavimo:

$$y_{i-1} \left( \frac{1}{h^2} + \frac{p(x_i)}{2h} \right) + y_i \left( -\frac{2}{h^2} - q(x_i) \right) + y_{i+1} \left( \frac{1}{h^2} - \frac{p(x_i)}{2h} \right) = r(x_i)$$

Lahko še pomnožimo z  $2h^2$ :

$$y_{i-1} (2 + hp(x_i)) + y_i (-4 - 2h^2q(x_i)) + y_{i+1} (2 - hp(x_i)) = 2h^2r(x_i)$$

\_\_\_\_\_ Točk: 10

3. Sistem enačb za točke  $(y_0, y_1, y_2, y_3, y_4)$ :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 + hp(x_1) & -4 - 2h^2q(x_1) & 2 - hp(x_1) & 0 & 0 \\ 0 & 2 + hp(x_2) & -4 - 2h^2q(x_2) & 2 - hp(x_2) & 0 \\ 0 & 0 & 2 + hp(x_3) & -4 - 2h^2q(x_3) & 2 - hp(x_3) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \alpha \\ 2h^2r(x_1) \\ 2h^2r(x_2) \\ 2h^2r(x_3) \\ \beta \end{Bmatrix}$$

\_\_\_\_\_ Točk: 10

4. Ker je napaka numerične metode proporcionalna potenci koraka  $h$  pri diskretizaciji, lahko uporabimo Richardsonovo ekstrapolacijo za izboljšanje rezultata. Postopek je naslednji:

- Uporabljena numerična metoda ima napako reda 2. Enačba izboljšanega približka z Richardsonovo ekstrapolacijo pri redu napake 2:

$$\bar{f}(x_i) = \frac{4f(x_i, \frac{h}{2}) - f(x_i, h)}{3}$$

kjer je  $f(x_i, h)$  rezultat numerične metode (rešitev d. e.) pri diskretizaciji s korakom  $h$ .

- Z rešitvijo zgoraj nastavljenega sistema enačb poiščemo vektor rešitev diferencialne enačbe pri koraku  $h$ ,  $\mathbf{y}(h)$ .
- Postopek ponovimo za diskretizacijo z dvakrat manjšim korakom  $h/2$  (diskretizacija območja  $x \in [a, b]$  z 9 točkami), dobimo rešitev  $\mathbf{y}(\frac{h}{2})$ .
- Uporabimo enačbo za izboljšan približek z Richardsonovo ekstrapolacijo v diskretnih točkah pri koraku  $h$  (vsaka druga točka pri delitvi s  $h/2$ ), in dobimo izboljšano rešitev:

$$\bar{\mathbf{y}} = \frac{4\mathbf{y}(\frac{h}{2}) - \mathbf{y}(h)}{3}$$

### 3. vprašanje

Predoločeni sistem enačb je definiran z matriko koeficientov  $\mathbf{A}$ , vektorjem neznank  $\mathbf{x}$  in vektorjem konstant  $\mathbf{b}$ .

1. Podajte primer poljubnega predoločenega sistema. (5)
2. Pojasnite dimenzije matrike/vektorjev predoločenega sistema in povežite s številom neznank/enačb. (5)
3. Po korakih izpeljite izraz za izračun psevdo inverzne matrike  $\mathbf{A}^+$  (25)

(35 %)

*Okviren odgovor je podan spodaj (skice niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora).*

1. Primer predoločenega sistema enačb:

$$\begin{aligned}x + 2y &= 6 \\3x + 3y &= 7 \\4x + 5y &= 8\end{aligned}$$

---

Točk: 5

2. Zgornji sistem enačb v matrični obliki:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix}_{2 \times 1} = \begin{Bmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{Bmatrix}_{3 \times 1}$$

Matrika koeficientov ni kvadratna, je oblike  $3 \times 2$ , torej imamo 3 enačbe z dvema neznankama (vektorj neznank oblike  $2 \times 1$ ).

(Povedano drugače: Matrika koeficientov je oblike  $m \times n$ , velja  $m > n$ , torej imamo več enačb kot neznank. Rang matrike koeficientov je enak številu neznank  $n$ , rang razširjene matrike koeficientov je enak  $n + 1$ .)

---

Točk: 5

3. Izpeljava izraza za izračun psevdoinverza:

Želimo rešitev sistema enačb, pri kateri bo vsota kvadratov preostankov (razlik med vektorjema  $\mathbf{Ax}$  in  $\mathbf{b}$ ) minimalna. Nastavek za vsoto kvadratov preostankov v vektorski obliki:

$$\|\mathbf{r}\|^2 = (\mathbf{Ax} - \mathbf{b})^T (\mathbf{Ax} - \mathbf{b})$$

---

Točk: 5

Nato izpeljemo naprej:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{r}\|^2 &= (\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T - \mathbf{b}^T) (\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) \\ &= \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{Ax} - \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{b} - \mathbf{b}^T \mathbf{Ax} + \mathbf{b}^T \mathbf{b}\end{aligned}$$

---

Točk: 5

Ker je  $\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{b}$  skalar, velja  $\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{b} = (\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{b})^T = \mathbf{b}^T \mathbf{Ax}$ , in lahko še poenostavimo:

$$\|\mathbf{r}\|^2 = \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{Ax} - 2\mathbf{b}^T \mathbf{Ax} + \mathbf{b}^T \mathbf{b} \quad (1)$$

Točk: 5

Vsota preostankov bo dosegla minimum, ko bo gradient  $\|\mathbf{r}\|^2$  po  $\mathbf{x}$  enak 0. Ker velja pravilo  $d(\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x})/d\mathbf{x} = \mathbf{x}^T (\mathbf{A}^T + \mathbf{A})$ , vrednost gradienta zapišemo:

$$\begin{aligned}\nabla_x \|\mathbf{r}\|^2 &= \mathbf{x}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{A} + (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^T) - 2\mathbf{b}^T \mathbf{A} \\ &= \mathbf{x}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{A} + \mathbf{A}^T \mathbf{A}) - 2\mathbf{b}^T \mathbf{A} \\ &= 2\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} - 2\mathbf{b}^T \mathbf{A}\end{aligned}$$

Točk: 5

Vrednost gradienta enačimo z  $\mathbf{0}$ :

$$2\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} - 2\mathbf{b}^T \mathbf{A} = \mathbf{0}$$

Ker velja  $\mathbf{0}^T = \mathbf{0}$ , lahko celotno enačbo transponiramo, in dobimo:

$$2\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} - 2\mathbf{A}^T \mathbf{b} = \mathbf{0}$$

Ker želimo določiti vektor neznank  $\mathbf{x}$  delimo dobljeno enačbo z 2 in preuredimo:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

Dobimo:

$$\mathbf{x} = \underbrace{(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T}_{\mathbf{A}^+} \mathbf{b}$$

Opazimo podobnost s splošno rešitvijo določenega sistema enačb,  $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}$ . Enačba psevdo inverzne matrike torej je:

$$\mathbf{A}^+ = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T$$

Točk: 5