

ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Первая помощь при обмороке

Обморок – это внезапная, кратковременная потеря сознания (от нескольких секунд до нескольких минут). Обморок может возникать в результате: испуга, сильной боли, кровотечения, резкой смены положения тела (из горизонтального в вертикальное и т.д.). При обмороке у пострадавшего наблюдается: обильный пот, похолодание конечностей, слабый и частый пульс, ослабленное дыхание, бледность кожных покровов.

Необходимо:

- уложить пострадавшего горизонтально, с приподнятыми ногами,
- расстегнуть стесняющую одежду, развязать галстук (пояс), расстегнуть рубашку (блузку) и поясной ремень;
- дать приток свежего воздуха;
- если причина обморока – перегрев (душное помещение), приложить холод к голове;
- нужно как можно быстрее вызвать скорую помощь.



ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ


Первая помощь при ожогах

Травма тканей вызывается высокой температурой, а их поражение происходит быстро, поэтому самое главное – немедленно снизить температуру ожога. Охлаждение существенно уменьшает серьезность ожога и облегчает сильную боль.

Обработка ожогов от кипятка и горячих предметов:

- Подержите обожженное место под струей холодной воды не менее 15-20 минут.
- Удалите или срежьте всю одежду, покрывающую обожженную поверхность тела.
- Удалите все потенциально сдавливающие предметы (кольца, браслеты, часы и пр. до того, как начнется отек). С помощью одной этой меры можно снизить тяжесть ожога, и он вместо тяжелого окажется легким.

!! Не мажьте ожоги маслом, мазями или лосьонами.



Пузыри от ожогов нужно держать целыми. Для этого осторожно наложите мягкую прокладку с пыльным слоем марли сверху и зафиксируйте ее, стараясь не давить на ожог. Прорванные пузыри накройте стерильной салфеткой. Сверху закрепите бинтом.

!! Нельзя прорезать или прокалывать пузырь.
Наружный слой кожи образует защиту для ран, которые очень восприимчивы к инфекции.

ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Первая помощь при вывихах

При вывихе происходит разрыв связок и суставной сумки, одна из костей смещается, суставные поверхности костей полностью перестают соприкасаться (полный вывих) или соприкасаются частично (подвывих).

Оказывая первую помощь, прежде всего необходимо обеспечить полный покой суставу: больную руку подвесить на косынке/бинте; на ногу наложить шину с помощью подручных средств.

Чтобы уменьшить боль, к поврежденному суставу следует приложить пузырь со льдом (необходимо обернуть лед полотенцем или тканью, чтобы предотвратить ожоги кожи), холодной водой.

Пострадавшего надо обязательно доставить в лечебное учреждение; при вывихе суставов ног – непременно лежа. Далее – вызвать скорую помощь



ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Первая помощь при разрыве связок

Растяжение связок нередко происходит при падении или внезапных резких движениях и может сопровождаться разрывом соединительнотканых волокон и мелких кровеносных сосудов.

Первое, что необходимо в таких случаях сделать, – туго перебинтовать сустав, чтобы обеспечить неподвижность суставных костей и уменьшить отек тканей.

Если есть подозрение на разрыв связок, надо наложить шину из подручных средств (плоские доски, фанера).

В первые час-два надо положить на конечность пузырь со льдом (обернутый полотенцем/ тканью) или полотенце, смоченное холодной водой. Полотенце следует чаще менять, каждый раз смачивая его холодной водой.

Пострадавшего уложите или удобно посадите, обеспечив неподвижность и покой травмированной ноге или руке. Если появился кровоподтек, то больную конечность надо приподнять.

Далее пострадавшему необходимо обратиться к врачу.



ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Первая помощь при порезах

Порезы нужно промыть проточной водой, а затем перевязать стерильным бинтом или заклеить пластырем (в зависимости от площади повреждения).

Если рана сопровождается обильным кровотечением, необходимо наложить давящую повязку. При этом нужно убедиться, что внутри раны не осталось никаких инородных предметов.

