Světelné křivky proměnných hvězd

F4191: Praktikum z astronomie 2 Artem Gorodilov

21. prosince 2024

1. Abstrakt

V této práci jsem vizualizoval a analyzoval světelné křivky hvězdy WISE J115225.7-665754 (ASASSN-V J115225.64-665753.4) se souřadnicemi 11:52:25.73 -66:57:54.2 (178.10721 -66.96506) J2000.

Světelné křivky jsem získal z archivních pozorování observatoří TESS a WISE.

Výpočty byly provedeny pomocí skriptu v Pythonu $^{[6]}$.

2. Úvod

Světelné křivky jsou grafy, které znázorňují změny jasnosti hvězdy v čase. U proměnných hvězd, jejichž jasnost se mění periodicky nebo nepravidelně, poskytují světelné křivky klíčové informace o jejich fyzikálních vlastnostech a procesech. Analýza tvaru, amplitudy a periody světelných křivek umožňuje určovat základní parametry hvězd, jako je jejich hmotnost, velikost, teplota nebo fáze evoluce. U binárních hvězd pomáhají identifikovat zatmění a interakce mezi složkami.

Pro analýzu světelných křivek je vhodné převést závislost magnitudy/intenzity na čase pozorování na závislost magnitudy na fázi rovnou periodě.

$$\phi = \frac{t \mod P}{P} \tag{1}$$

3. Zpracování dat

3.1. TESS

Data TESS (hlsp_qlp_tess_ffi_s0065-0000000410922760_tess_v01_llc.fits) byla získána pomocí archivu STScl ^[2]. Data WISE (WISE J115225.7-665754_allwise.ipac a WISE J115225.7-665754_neowise.ipac) byla získána pomocí skriptu wise_light_curves.py (Hsiang-Chih Hwang)^[4].

Pozorování TESS bylo provedeno 2023-05-04 05:42:33:33 UT, expozice 200 s. Pozorování WISE bylo provedeno dne 2010-01-31 12:21:35:35 UT. Pozorování WISE je k dispozici jako AllWISE a NeoWISE.

Pro konstrukci světelné křivky TESS jsem zvolil dobré časové intervaly s parametrem QUALITY > 0. Čas jsem převzal z parametru TIME a tok z parametru SAP_FLUX. Tok byl normalizován, ale normalizační faktor nebyl uveden. Proto jsem po převodu toku na magnitudu pomocí vzorce (2) získal normalizovanou magnitudu.

$$m = -2.5 \log_{10} F \tag{2}$$

Dále je třeba vypočítat periodu. K tomuto účelu jsem použil LombScargle z knihovny astropy.timeseries. Nejlepší fit poskytl hodnotu P = 1.020201 d. Zatímco data AAVSO dávají hodnotu P_{AAVSO} .

2.0462307 d. Vhodná hodnota je přibližně poloviční oproti teoretické hodnotě, takže jsem ji vynásobil dvěma P=2.040403 d a použil obě periody pro výpočet fáze, abych mohl porovnat vizuální výsledky.

Pozorování byla prováděna ve filtru TESS s ořezem na $\sim 600~\mathrm{nm}^{[7]}$.

3.2. WISE

Získání a analýza dat WISE byla mnohem jednodušší než u TESS, protože všechny postupy, které jsem popsal, napsal jeden hezký borec Hsiang-Chih Hwang a zveřejnil přístupnou a jednoduchou dokumentaci na svém GitHubu.


Dobré časové intervaly jsem vybral pomocí only good data v1(). funkce Poté parametry svějsem získal telné křivky kombinací dat AllWISE NeoWISE funkce pomocí make full lightcurve multibands(). Tentokrát jsem pro výpočet fáze použil

Protože časové jednotky WISE jsou MJD, napsal jsem funkci mjd_to_bjd(), která bere souřadnice RA a DEC, čas a převádí je do formátu BJD s odkazem na polohu v Greenwichi. Tato poloha byla zvolena, protože údaje o přesné poloze observatoře se nepodařilo získat. Pro baryocentrickou korekci však bude zcela dostačující.


pouze teoretickou hodnotu periody.

Pozorování byla prováděna ve filtru $W1=3.4~\mu\mathrm{m}$ (součást čtyřpásmového systému WISE).

K výpočtu veličin a jejich nejistot byla použita knihovna Uncertinties pro Python. Chyby byly rozšířeny o Studentův koeficient (2-Tail Confidence Level) s ohledem na stupně volnosti pro každou hodnotu, pro interval spolehlivosti 68.27%.



Obrázek (1) Světelná křivka TESS s periodou P_{AAVSO} . = 2.0462307 d



Obrázek (2) Světelná křivka TESS s periodou P = 2.040403 d


4. Vysledky

Výsledky jsou uvedeny na obrázcích (1), (2) a (3).

5. Závěr

Jak je vidět ze světelných křivek pro TESS, fáze získaná z mnou vypočtené periody má rozštěpy v minimech jasnosti, na rozdíl od tvaru křivky pro teoretickou periodu. To svědčí o nepřesnosti vypočtené hodnoty periody (i když rozdíl mezi nimi je pouze 0.005828 d).

Světelná křivka získaná pomocí WISE



Obrázek (3) Světelná křivka WISE s periodou P_{AAVSO} . = 2.0462307 d

má nižší rozlišení než TESS, ale ukazuje stejné fičury ve formě dvou jasnostních minim.

Pozorovaná hvězda vykazuje proměnnost odpovídající typu EA^[8], která je charakteristická pro zákrytové dvojhvězdy typu Algol. Tyto systémy se skládají ze dvou hvězd, obvykle kulových nebo mírně elipsoidních, které se při pohledu ze Země pravidelně vzájemně zatmívají. Světelná křivka vykazuje zřetelné fáze minimální a maximální jasnosti, přičemž mimo zatmění zůstává jasnost téměř konstantní nebo vykazuje malé změny. Tyto změny mohou být důsledkem reflexních efektů, mírných elipsoidních tvarů hvězd nebo vnitřních změn samotných hvězd.

Chtěl jsem také provést fit světelné křivky, ale nedostatečné údaje o systému mi neumožnily použít dostupné modely^{[3][5]}. Kvůli tomu, že se nepodařilo získat přibližné údaje o teplotách složek systému, jejich hmotnostech, poloměrech a orbitálních parametrech, které fit potřebuje jako výchozí údaje, vede k neadekvátním výsledkům.

Reference

- [1] Aavso. https://www.aavso.org/vsx/ index.php?view=detail.top&oid= 629958.
- [2] The mikulski archive for space telescopes is an astronomical data archive. https://mast.stsci.edu/portal/Mashup/Clients/Mast/Portal.html.
- [3] Miro Fedurco. Elisa. https://github.com/mikecokina/elisa.
- [4] HC-Hwang. Wise light curves. https://github.com/HC-Hwang/wise_light_curves.
- [5] Jonathan Irwin. Eclipsing binary models. https://github.com/ mdwarfgeek/eb.
- [6] PoruchikRzhevsky. Praktickaastrofyzika. https://github. com/PoruchikRzhevsky/ Prakticka-astrofyzika.
- [7] 2018 Vanderspek et al. Tess instrument handbook v0.1. https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/tess/documentation.html.
- [8] C. L. Watson, A. A. Henden, and A. Price. The International Variable Star Index (VSX). Society for Astronomical Sciences Annual Symposium, 25:47, May 2006.