

# Solução numérica de problema de valor inicial

Irineu Palhares

November 2025

# Sumário

Problema de Valor Contorno

Algoritmo de Thomas para matrizes tridiagonais

A forma mais geral dos problema de contorno aos quais nos referiremos é:

$$\begin{aligned}y'' &= f(x, y, y') \\ a_1 y(a) + b_1 y'(a) &= \gamma_1 \\ a_2 y(b) + b_2 y'(b) &= \gamma_2\end{aligned}\tag{1}$$

onde  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  são constantes reais conhecidas, tais que nem  $a_1$  e  $b_1$ , nem  $a_2$  e  $b_2$  sejam nulas ao mesmo tempo.

# O método das diferenças finitas

As aproximações mais usadas para a primeira derivada no ponto  $x_i$  são:

Avançada

$$y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_i}{h}$$

Atrasada

$$y'(x_i) \approx \frac{y_i - y_{i-1}}{h}$$

Centrada

$$y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}$$

## Aproximação para a derivada de segunda ordem

Utilizando a série de Taylor, deduziremos a aproximação mais típica para a derivada segunda, bem como a expressão do erro para ela. Para tal, usaremos a expansão nos pontos  $x_{i+1}$  e  $x_{i-1}$ :

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2!}y''(x_i) + \frac{h^3}{3!}y'''(x_i) + \frac{h^4}{4!}y^{iv}(\xi_{i+1}) \quad (2)$$

$$y(x_{i-1}) = y(x_i) - hy'(x_i) + \frac{h^2}{2!}y''(x_i) - \frac{h^3}{3!}y'''(x_i) + \frac{h^4}{4!}y^{iv}(\xi_{i-1}) \quad (3)$$

E, agora, (2) + (3) nos fornece:

$$y(x_{i+1}) + y(x_{i-1}) = 2y(x_i) + y''(x_i)h^2 + \frac{h^4}{24} \left[ y^{(iv)}(\xi_{i+1}) + y^{(iv)}(\xi_{i-1}) \right]$$

## Fórmula para $y''$

Assim, temos a expressão para  $y''(x_i)$ :

$$y''(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}$$

com erro da ordem de  $h^2$ .

## Exemplo: PVI linear

### Example

$$\begin{aligned}y''(x) + 2y'(x) + y(x) &= x \\ y(0) &= 0 \\ y(1) &= -1\end{aligned}\tag{4}$$

A solução analítica desse problema é  $y = 2e^{-x}(1 - x) + x - 2$ .

# PVC não linear

## Example

$$\begin{aligned}y'' &= y \sin y + xy \\ y(0) &= 1 \\ y(1) &= 5\end{aligned}\tag{5}$$



## Exercícios

### 1. Resolva o problema de contorno

$$\begin{aligned}y'' &= y' + 2y + \cos x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\y(0) &= -0.3, \\y\left(\frac{\pi}{2}\right) &= -0.1\end{aligned}\tag{6}$$

cuja solução analítica é  $y(x) = -\frac{1}{10}(\sin x + 3 \cos x)$ .

### 2. Resolva o problema de contorno

$$\begin{aligned}y'' &= \frac{1}{8}(32 + 2x^3 - yy'), 1 \leq x \leq 3 \\y(1) &= 17, \\y(3) &= \frac{43}{3}\end{aligned}\tag{7}$$

o qual tem solução exata  $y(x) = x^2 + \frac{16}{x}$ .

# Algoritmo de Thomas

Considere o sistema linear tridiagonal

$$\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & a_3 & b_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & a_n & b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}$$

em que:

- ▶  $a_i$  é a subdiagonal ( $i = 2, \dots, n$ ),
- ▶  $b_i$  é a diagonal principal ( $i = 1, \dots, n$ ),
- ▶  $c_i$  é a superdiagonal ( $i = 1, \dots, n - 1$ ).

O algoritmo de Thomas é um método direto composto por duas etapas: *eliminação direta (forward sweep)* e *substituição retroativa (backward substitution)*.

# Construção do algoritmo

Define-se as sequências modificadas  $c'_i$  e  $d'_i$  da seguinte forma:

Para  $i = 1$ :

$$c'_1 = \frac{c_1}{b_1}, \quad d'_1 = \frac{d_1}{b_1}$$

Para  $i = 2, \dots, n$ :

$$\alpha_i = b_i - a_i c'_{i-1}$$

$$c'_i = \frac{c_i}{\alpha_i}, \quad d'_i = \frac{d_i - a_i d'_{i-1}}{\alpha_i}$$

onde  $c'_n$  não é utilizado, pois  $c_n = 0$ .

# Retrosubstituição

A solução é obtida a partir de:

$$x_n = d'_n$$

e, para  $i = n - 1, n - 2, \dots, 1$ :

$$x_i = d'_i - c'_i x_{i+1}$$

O algoritmo é estável desde que:

$$\alpha_i = b_i - a_i c'_{i-1} \neq 0, \quad \forall i$$

Em particular, a matriz tridiagonal deve ser preferencialmente **diagonalmente dominante**.

# Análise de estabilidade de um PVC

Consideraremos aqui, Métodos de Diferenças Finitas para solução de PVC que não são baseados na resolução de problemas de valor inicial. O objetivo é fornecer um apanhado geral, enfatizando os conceitos de dificuldades mais frequentes, como é o caso da restrição do tamanho  $h$  da malha e do tratamento da condição de fronteira com derivadas.

Seja o PVC:

$$\begin{aligned}y''(x) - p(x)y'(x) - q(x)y(x) &= r(x), \\ y(a) &= \alpha, \quad y(b) = \beta.\end{aligned}$$

Impomos a restrição  $q(x) > 0, \forall x \in [a, b]$ .

Após o processo de discretização precisamos impor que a matriz dos coeficientes  $A$  seja diagonalmente dominante. Isso implica que

$$\frac{h}{2}|p(x_i)| \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

que é uma restrição sobre o tamanho do espaçamento  $h$ .

# Erro de truncamento local

O erro de truncamento local  $\tau_i$  é obtido apartir da fórmulação de diferenças. Para o caso considerado o erro é dado por:

$$\tau_i = \frac{h^2}{12} \left( y^{(4)}(\xi_i) - 2p(x_i)y'''(\eta_i) \right), \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

onde  $\xi_i, \eta_i \in [x_{i-1}, x_{i+1}]$ . Assim, o erro de truncamento local é  $O(h^2)$  e quando  $h \rightarrow 0$  o método tende para a equação diferencial com ordem  $O(h^2)$  e dizemos que o método é consistente de ordem 2.

# Problema mal posto

O problema a ser resolvido pode apresentar dificuldades inerente se ele for mal posto. Por exemplo,

## Example

$$\begin{aligned}y'' + \kappa^2 y &= 2\kappa^2 x, \\ y(0) &= 0, \\ y(1) &= 1,\end{aligned}\tag{8}$$

cuja solução analítica é  $y(x) = -\frac{\sin(\kappa x)}{\sin(\kappa)} + 2x$ .

Para  $\kappa = \pi$  o problema não tem solução. Para  $\kappa = \pi + \epsilon$ ,  $\epsilon$  pequeno,  $y(x) \approx -\epsilon^{-1} \sin((\pi + \epsilon)x) + 2x$ . Assim, uma pequena variação nos dados do problema implica em grande variação na solução que passou a existir. O problema acima constitui um exemplo de um problema mal posto.

# Exercícios

1. Construa um método de segunda ordem para resolver o seguinte PVF:

$$y'' + xy' + y = 2x, \quad y(0) = 1, \quad y(1) = 0.$$

Admitindo  $h = 0.1$  construa o sistema linear associado e resolva-o por meio do algoritmo de Thomas.

2. Seja o seguinte PVC:

$$y'' = \frac{\lambda^2}{8} - \frac{x^2}{32y^2}, \quad y(0) = 0, \quad 2y'(1) - (1 + \nu)y(1) = 0.$$

Determine  $y(1)$ , para  $\nu = 0.3$  e  $\lambda = 0.991$ , usando  $h = 0.1$ .