

Cvičenie druhé

Obsah

1	Diferenciálna rovnica	1
2	Pomocou MATLAB-Simulink	1
3	Analytický	2
4	Pomocou Laplaceovej transformácie	4
5	Pomocou Symbolic toolboxu (MATLAB)	5
6	Pomocou ODE solvera – numerické riešenie (MATLAB)	6

1 Diferenciálna rovnica

Majme diferenciálnu rovnicu:

$$\ddot{y} + 5,4\ddot{y} + 9,7\dot{y} + 5,592y = 2e^{-1,2t} \quad (1)$$

Nájdime jej riešenie nasledujúcimi spôsobmi:


1. analyticky
2. pomocou Laplaceovej transformácie

Pre daný dynamický systém zvolme nenulové začiatočné podmienky nasledovne:


$$y(0) = 1 \quad \dot{y}(0) = 1 \quad \ddot{y}(0) = 1$$

2 Pomocou MATLAB-Simulink

Simulačná schéma zodpovedajúca diferenciálnej rovnici (1) je na Obr. 1. Začiatočné podmienky integrátorov v schéme sú nastavené rovnako ako boli zvolené v zadaní. Simuláciou získaný časový priebeh je na Obr. 2.



Obr. 1: Simulačná schéma



Obr. 2: Simuláciou získaný časový priebeh

3 Analytický

Rovnica (1) je nehomogénna lineárna diferenciálna rovnica s konštantnými koeficientami tretieho rádu ($n_r = 3$). Jej Charakteristická rovnica je

$$s^3 + 5,4s^2 + 9,7s + 5,592 = 0 \quad (2)$$

Riešeniami Charakteristickej rovnice sú

$$s_1 = -2,1 + 0,5i \quad s_2 = -2,1 - 0,5i \quad s_3 = -1,2 \quad (3)$$

Fundamentálne riešenia (módy) rovnice (1) zodpovedajúce jednotlivým riešeniam Charakteristickej rovnice sú

$$y_1(t) = e^{(-2,1+0,5i)t} = e^{-2,1t} (\cos(0,5t) + i \sin(0,5t)) \quad (4a)$$

$$y_2(t) = e^{(-2,1-0,5i)t} = e^{-2,1t} (\cos(0,5t) - i \sin(0,5t)) \quad (4b)$$

$$y_3(t) = e^{-1,2t} \quad (4c)$$

Totíž, vo všeobecnosti možno rozlišovať niekoľko prípadov, pre ktoré platí:

1. Ak má charakteristická rovnica n navzájom rôznych riešení s_i pre $i = 1, \dots, n$, potom zodpovedajúce fundamentálne riešenia (módy) sú: $e^{s_1 t}, e^{s_2 t}, \dots, e^{s_n t}$.
2. Ak sa medzi n koreňmi charakteristického polynómu vyskytne k -násobný koreň, vytvoríme k lineárne závislých riešení: $e^{s_i t}, t e^{s_i t}, \dots, t^{k-1} e^{s_i t}$
3. V prípade výskytu dvojice komplexne združených koreňov charakteristického polynómu, $s_{1,2} = \alpha \pm j\beta$, kde j je imaginárna jednotka, využijeme na určenie fundamentálnych riešení Eulerov vzťah

$$e^{(\alpha \pm j\beta)t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t \pm j \sin \beta t) \quad (5)$$

Preto potom možno písať príslušné fundamentálne riešenie v tvare

$$c_1 e^{(\alpha+j\beta)t} + c_2 e^{(\alpha-j\beta)t} = e^{\alpha t} (c' \cos \beta t + c'' \sin \beta t) \quad (6)$$

kde sú imaginárne časti nulové.

Výsledné reálne všeobecné riešenie homogénnej časti má tvar

$$y_{h_{vs}}(t) = c_1 e^{-2,1t} \cos(0,5t) + c_2 e^{-2,1t} \sin(0,5t) + c_3 e^{-1,2t} \quad (7)$$

kde c_1, c_2 a c_3 sú reálne konštanty.

Pravá strana $q(t)$ diferenciálnej rovnice (1) má vo všeobecnosti tvar $q(t) = e^{\alpha t} P_n(t)$, pričom platí

$$P_n(t) = 2 \quad (8a)$$

$$\alpha = -1,2 \quad (8b)$$

Pre tento špeciálny tvar pravej strany má partikulárne riešenie $\psi(t)$ tvar $\psi(t) = t^k e^{\alpha t} Q_n(t)$, kde k je násobnosť koreňa α a $Q_n(t)$ je všeobecný polynóm rovnakého stupňa ako $P_n(t)$. V tomto prípade

$$k = 1 \quad (9a)$$

$$Q_n(t) = A_0 \quad (9b)$$

Partikulárne riešenie $\psi(t)$ určíme použitím metódy neurčitých koeficientov, a teda partikulárne riešenie a jeho derivácie dosadíme do diferenciálnej rovnice.

$$\psi(t) = A_0 t e^{-1,2t} \quad (10a)$$

$$\dot{\psi}(t) = A_0 e^{-1,2t} - 1,2 A_0 t e^{-1,2t} \quad (10b)$$

$$\ddot{\psi}(t) = -2,4 A_0 e^{-1,2t} + 1,44 A_0 t e^{-1,2t} \quad (10c)$$

$$\ddot{\psi}(t) = 4,32 A_0 e^{-1,2t} - 1,728 A_0 t e^{-1,2t} \quad (10d)$$

Rovnice (10) dosadíme do diferenciálnej rovnice (1) a upravíme.

$$\begin{aligned} 2e^{-1,2t} = 4,32 A_0 e^{-1,2t} - 1,728 A_0 t e^{-1,2t} + 5,4 (-2,4 A_0 e^{-1,2t} + 1,44 A_0 t e^{-1,2t}) \\ + 9,7 (A_0 e^{-1,2t} - 1,2 A_0 t e^{-1,2t}) + 5,592 (A_0 t e^{-1,2t}) \end{aligned} \quad (11a)$$

$$\begin{aligned} 2e^{-1,2t} = 4,32 A_0 e^{-1,2t} - 1,728 A_0 t e^{-1,2t} - 12,96 A_0 e^{-1,2t} + 7,776 A_0 t e^{-1,2t} \\ + 9,7 A_0 e^{-1,2t} - 8,5 A_0 t e^{-1,2t} + 5,592 A_0 t e^{-1,2t} \end{aligned} \quad (11b)$$

$$2e^{-1,2t} = 1,06 A_0 e^{-1,2t} + 3,14 t e^{-1,2t} \quad (11c)$$

Z (11c) vyplýva

$$2 = 1,06 A_0 \quad \Rightarrow \quad A_0 = \frac{2}{1,06} \doteq 1,8868 \quad (12)$$

a partikulárne riešenie $\psi(t)$ je

$$\psi(t) = 1,8868 t e^{-1,2t} \quad (13)$$

Všeobecné riešenie diferenciálnej rovnice (1) je súčet (7) s (13):

$$y_{vs}(t) = c_1 e^{-2,1t} \cos(0,5t) + c_2 e^{-2,1t} \sin(0,5t) + c_3 e^{-1,2t} + 1,8868 t e^{-1,2t} \quad (14a)$$

Konštanty c_1 , c_2 a c_3 sú dané konkrétnymi začiatočnými podmienkami, ktoré sa dosadia do príslušných derivácií všeobecného riešenia. V tomto prípade sú potrebné okrem nulte derivácie (14a) aj prvá a druhá derivácia všeobecného riešenia:

$$\begin{aligned} \dot{y}_{vs}(t) = 1,8868 e^{-1,2t} - 2,2642 t e^{-1,2t} - 1,2 c_3 e^{-1,2t} - 2,1 c_2 e^{-2,1t} \sin(0,5t) \\ + 0,5 c_2 e^{-2,1t} \cos(0,5t) - 2,1 c_1 e^{-2,1t} \cos(0,5t) - 0,5 c_1 e^{-2,1t} \sin(0,5t) \end{aligned} \quad (14b)$$

$$\begin{aligned} \ddot{y}_{vs}(t) = -4,5283 e^{-1,2t} + 2,717 t e^{-1,2t} + 1,44 c_3 e^{-1,2t} + 4,16 c_2 e^{-2,1t} \sin(0,5t) \\ - 2,1 c_2 e^{-2,1t} \cos(0,5t) + 4,16 c_1 e^{-2,1t} \cos(0,5t) + 2,1 c_1 e^{-2,1t} \sin(0,5t) \end{aligned} \quad (14c)$$

Dosadením začiatočných podmienok do (14a), (14b) a (14c) získame sústavu troch rovníc o troch neznámych, ktorá má v maticovom zápise tvar

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2,1 & 0,5 & -1,2 \\ 4,16 & -2,1 & 1,44 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 - 1,8868 \\ 1 + 4,5283 \end{bmatrix} \quad (15)$$

a jej riešením je

$$c_1 = -5,0979 \quad (16a)$$


$$c_2 = -8,5498 \quad (16b)$$

$$c_3 = 6,0979 \quad (16c)$$

Riešením diferenciálnej rovnice (1) je

$$y(t) = -5,0979 e^{-2,1t} \cos(0,5t) - 8,5498 e^{-2,1t} \sin(0,5t) + 6,0979 e^{-1,2t} + 1,8868 t e^{-1,2t} \quad (17)$$

Graficky je riešenie znázornené na Obr. 3.



Obr. 3: Grafické znázornenie riešenia získaného analyticky

4 Pomocou Laplaceovej transformácie

Rovnica (1) má po Laplaceovej transformácii tvar

$$s^3 Y - s^2 - s - 1 + 5,4 (s^2 Y - s - 1) + 9,7 (s Y - 1) + 5,592 Y = \frac{2}{(s + 1, 2)} \quad (18)$$

Po úprave

$$s^3 Y - s^2 - s - 1 + 5,4 s^2 Y - 5,4 s - 5,4 + 9,7 s Y - 9,7 + 5,592 Y = \frac{2}{(s + 1, 2)} \quad (19a)$$

$$Y (s^3 + 5,4 s^2 + 9,7 s + 5,592) + (-s^2 - s - 1 - 5,4 s - 5,4 - 9,7) = \frac{2}{(s + 1, 2)} \quad (19b)$$

$$Y (s^3 + 5,4 s^2 + 9,7 s + 5,592) + (-s^2 - 6,4 s - 16,1) = \frac{2}{(s + 1, 2)} \quad (19c)$$

$$Y = \frac{2}{(s + 1, 2) (s^3 + 5,4 s^2 + 9,7 s + 5,592)} + \frac{(s^2 + 6,4 s + 16,1)}{(s^3 + 5,4 s^2 + 9,7 s + 5,592)} \quad (19d)$$

Korene polynómu $s^3 + 5,4 s^2 + 9,7 s + 5,592$ sú (3) a korene polynómu $s^2 + 6,4 s + 16,1$ sú

$$s_4 = -3,2 + 2,4207i \quad s_5 = -3,2 - 2,4207i \quad (20)$$

a teda (19d) je možné napísať v tvare

$$\begin{aligned} Y &= \frac{2}{(s + 2,1 - 0,5i)(s + 2,1 + 0,5i)(s + 1,2)^2} \\ &+ \frac{(s + 3,2 - 2,4207i)(s + 3,2 + 2,4207i)}{(s + 2,1 - 0,5i)(s + 2,1 + 0,5i)(s + 1,2)} \\ &= Y_1 + Y_2 \end{aligned} \quad (21)$$

Na spätnú Laplaceovu transformáciu využijeme Heavisideov rozvojový vzorec

$$y(t) = \sum_{i=1}^k e^{s_i t} \sum_{j=1}^{r_i} \frac{[G_i^{(r_i-j)}(s)]_{s=s_i}}{(r_i - j)!(j - 1)!} t^{j-1} \quad (22)$$

kde $G_i = Y(s)(s - s_i)^{r_i}$, s_i ($i = 1, \dots, j$) sú póly prenosovej funkcie $Y(s)$ a r_i ($i = 1, \dots, j$) je ich násobnosť.

Spätná transformácia $Y_1(s)$.

Najprv je potrebné určiť hodnoty $\left[G_i^{(r_i-j)}(s)\right]_{s=s_i}$:

$$G_1(s_1) = \frac{2}{(-2, 1 + 0, 5i + 2, 1 + 0, 5i)(-2, 1 + 0, 5i + 1, 2)^2} = 1,602 - 0,9968i \quad (23a)$$

$$G_2(s_2) = \frac{2}{(-2, 1 + 0, 5i + 2, 1 - 0, 5i)(-2, 1 + 0, 5i + 1, 2)^2} = 1,602 + 0,9968i \quad (23b)$$

$$G_3(s_3) = \frac{2}{(-1, 2 + 2, 1 - 0, 5i)(-1, 2 + 2, 1 + 0, 5i)} = 1.8868 \quad (23c)$$

$$\dot{G}_3(s_3) = -\frac{2(2s_3 + 4, 2)}{(s_3^2 + 4, 2s_3 + 4.66)^2} = -\frac{2(2(-1, 2) + 4, 2)}{((-1, 2)^2 + 4, 2(-1, 2) + 4.66)^2} = -3.204 \quad (23d)$$

Tieto hodnoty sa potom dosadia do (22) a po úprave:

$$y_1(t) = e^{(-2, 1 + 0, 5i)t} (1,602 - 0,9968i) + e^{(-2, 1 - 0, 5i)t} (1,602 + 0,9968i) + e^{-1,2t} \left(\frac{-3,204}{(2-1)!(1-1)!} t^0 + \frac{1,8868}{(2-2)!(2-1)!} t^1 \right) \quad (24a)$$

$$y_1(t) = e^{-2,1t} (3,204 \cos(0,5t) + 1,9936 \sin(0,5t)) - 3,204e^{-1,2t} + 1,8868te^{-1,2t} \quad (24b)$$

Spätná transformácia $Y_2(s)$:

Určenie hodnôt $\left[G_i^{(r_i-j)}(s)\right]_{s=s_i}$ pre prípad $Y_2(s)$:

$$G_1(s_1) = \frac{(-2, 1 + 0, 5i + 3, 2 - 2, 4207i)(-2, 1 + 0, 5i + 3, 2 + 2, 4207i)}{(-2, 1 + 0, 5i + 2, 1 + 0, 5i)(-2, 1 + 0, 5i + 1, 2)} = -4,1508 + 5,2715i \quad (25a)$$

$$G_2(s_2) = \frac{(-2, 1 - 0, 5i + 3, 2 - 2, 4207i)(-2, 1 - 0, 5i + 3, 2 + 2, 4207i)}{(-2, 1 - 0, 5i + 2, 1 - 0, 5i)(-2, 1 - 0, 5i + 1, 2)} = -4,1508 - 5,2715i \quad (25b)$$

$$G_3(s_3) = \frac{(-1, 2 + 3, 2 - 2, 4207i)(-1, 2 + 3, 2 + 2, 4207i)}{(-1, 2 + 2, 1 - 0, 5i)(-1, 2 + 2, 1 + 0, 5i)} = 9,3017 \quad (25c)$$

A potom:

$$y_2(t) = e^{(-2, 1 + 0, 5i)t} (-4,1508 + 5,2715i) + e^{(-2, 1 - 0, 5i)t} (-4,1508 - 5,2715i) + 9,3017e^{-1,2t} \quad (26a)$$

$$y_2(t) = e^{-2,1t} (-8,3016 \cos(0,5t) - 10,543 \sin(0,5t)) + 9,3017e^{-1,2t} \quad (26b)$$


Výsledné riešenie je súčtom $y_1(t)$ s $y_2(t)$

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = e^{-2,1t} (-5,0976 \cos(0,5t) - 8,5494 \sin(0,5t)) + 6,0977e^{-1,2t} + 1,8868te^{-1,2t} \quad (27)$$

Grafické znázornenie riešenia je na Obr. 4.

5 Pomocou Symbolic toolboxu (MATLAB)

Pre výpočet riešenia pomocou toolboxu Symbolic je potrebné zadať nasledujúce príkazy:




Obr. 4: Grafické znázornenie riešenia získaného pomocou Laplaceovej transformácie

```
yt = dsolve('D3y + 5.4*D2y + 9.7*Dy + 5.592*y = 2*exp(-1.2*t)', 'y(0)=1', 'Dy(0)=1', 'D2y(0)=1')
ezplot(yt, [0 10])
```

Odpoveďou je riešenie a vykreslenie jeho priebehu znázornené na Obr. 5.

```
yt =
100/53*t*exp(-6/5*t)+17129/2809*exp(-6/5*t)-120082/14045*exp(-21/10*t)*sin(1/2*t)
-14320/2809*exp(-21/10*t)*cos(1/2*t)
```



Obr. 5: Grafické znázornenie riešenia získaného pomocou toolboxu Symbolic

6 Pomocou ODE solvera – numerické riešenie (MATLAB)

Pre numerický výpočet riešenia pomocou procedúry `ode45` je potrebné previesť diferenciálnu rovnicu (1) na systém diferenciálnych rovníc 1. rádu. V tomto prípade:

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (28a)$$

$$\dot{x}_2 = x_3 \quad (28b)$$

$$\dot{x}_3 = -5.4x_3 - 9.7x_2 - 5.592x_1 + 2e^{-1.2t} \quad (28c)$$


Tento systém sa potom zapíše ako funkcia, ktorú bude procedúra `ode45` používať

```
function dx = fundif(t,x);
dx(1) = x(2);
dx(2) = x(3);
dx(3) = -5.4*x(3) - 9.7*x(2) - 5.592*x(1) + 2*exp(-1.2*t);
dx = dx(:);
```

Samotné použitie procedúry `ode45` sa vykoná nasledovnými príkazmi:

```
[t,y] = ode45('fundif',[0 10],[1; 1; 1]);  
plot(t,y(:,1))
```

Výsledný priebeh riešenia je na Obr. 6.



Obr. 6: Grafické znázornenie riešenia získaného pomocou ode45