

normal-prob-plot

November 1, 2024


```
[1]: from scipy.stats import zscore
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm
#its just an example npp of original values v/s theortical values(z scores)
def npp(data):
    data = sorted(data)
    p = [(data.index(i)-0.5)/len(data) for i in data]
    z = zscore(p)


    # t = [norm.ppf(i, np.mean(data), np.std(data)) for i in p]
    #xi=[np.std(data)*zi+np.mean(data) for zi in z]

    xi=norm.ppf(p)

    plt.scatter(data, xi)
    plt.ylabel('Z values')
    plt.xlabel(' values')
    plt.show()
    plt.plot(data, xi,'ro',data, data)
    plt.show()

#n datapoints
n = 100
data = np.random.randn(n)
npp(data)
```







```
[2]: X1 = [3.01, 3.35, 4.79, 5.96, 7.89]


X2 = [3.89, 4.75, 4.75, 5.20, 5.78, 5.80, 6.33, 7.21, 7.90]

X3 = [108.047, 109.249, 103.385, 112.454, 95.780, 122.734, 109.842, 120.858,
      98.604, 98.122, 95.971, 98.173, 87.437, 91.884, 92.193, 83.882]

def npp1(data):
    p = []
    t = []
    data = np.sort(np.array(data))
    p = [(i - 0.5)/len(data) for i in range(1, len(data)+1)]
    t = [norm.ppf(i, np.mean(data), np.std(data)) for i in p]
    plt.plot(data, t, 'ro', data, data)
    plt.show()



npp1(X1)
npp1(X2)
npp1(X3)
```







```
[3]: import pandas as pd

df = pd.read_csv('train.csv')
plt.hist(df.ApplicantIncome)
plt.show()
npp1(df.ApplicantIncome)
df1 = pd.read_csv('train.csv')
plt.hist(df1.CoapplicantIncome)
plt.show()
npp1(df1.CoapplicantIncome)
```







[]: