

# Algorithmen in der Direkten Anwendung

NK

January 7, 2015

# Table of contents

## Teil I - Westliche Randstrme

Analytisch

Numerisch

## Teil II - Geostrophische Ozeanwirbel

Was ist ein *Eddy*?

*detection and tracking*-Algorithmus

# Bewegungsgleichungen

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{u} - \nabla p + \nabla \cdot \mathbf{T} + \rho \mathbf{g}$$

*– Coriolis – Druckgrad. + Reibung + Gravi.*      (1)

$$\frac{Dm}{Dt} = 0 \quad (2)$$

# Approximationen/Manipulationen

# Approximationen/Manipulationen

- ▶ mesoskalige Turbulenz parametrisiert  
*Reynolds averaging*

# Approximationen/Manipulationen

- ▶ mesoskalige Turbulenz parametrisiert  
*Reynolds averaging*
- ▶ Corioliskraft linearisiert  
 $\mathbf{f}(y) = f_0 + \beta y$

# Approximationen/Manipulationen

- ▶ mesoskalige Turbulenz parametrisiert

*Reynolds averaging*

- ▶ Corioliskraft linearisiert

$$\mathbf{f}(y) = f_0 + \beta y$$

- ▶ Hydrostatische Approximation

$$\rho \mathbf{g} = -\frac{\partial p}{\partial z}$$

# Approximationen/Manipulationen

- ▶ mesoskalige Turbulenz parametrisiert

*Reynolds averaging*

- ▶ Corioliskraft linearisiert

$$\mathbf{f}(y) = f_0 + \beta y$$

- ▶ Hydrostatische Approximation

$$\rho \mathbf{g} = -\frac{\partial p}{\partial z}$$

- ▶ zeitlich konstant

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = 0$$



# Approximationen/Manipulationen

- ▶ mesoskalige Turbulenz parametrisiert

*Reynolds averaging*

- ▶ Corioliskraft linearisiert

$$\mathbf{f}(y) = f_0 + \beta y$$

- ▶ Hydrostatische Approximation

$$\rho \mathbf{g} = -\frac{\partial p}{\partial z}$$

- ▶ zeitlich konstant

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = 0$$

- ▶ Inkompressibilität

Massenerhaltung  $\rightarrow$  Volumenerhaltung ( $\rho = \text{const}$ )

# Approximationen/Manipulationen

- ▶ mesoskalige Turbulenz parametrisiert

*Reynolds averaging*

- ▶ Corioliskraft linearisiert

$$\mathbf{f}(y) = f_0 + \beta y$$

- ▶ Hydrostatische Approximation

$$\rho \mathbf{g} = -\frac{\partial p}{\partial z}$$

- ▶ zeitlich konstant

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = 0$$

- ▶ Inkompressibilität

Massenerhaltung  $\rightarrow$  Volumenerhaltung ( $\rho = \text{const}$ )

- ▶ Horizontale Geschwindigkeiten viel größer als vertikale

$$w = 0$$

# Approximationen/Manipulationen

- ▶ mesoskalige Turbulenz parametrisiert

*Reynolds averaging*

- ▶ Corioliskraft linearisiert

$$\mathbf{f}(y) = f_0 + \beta y$$

- ▶ Hydrostatische Approximation

$$\rho \mathbf{g} = -\frac{\partial p}{\partial z}$$

- ▶ zeitlich konstant

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = 0$$

- ▶ Inkompressibilität

Massenerhaltung  $\rightarrow$  Volumenerhaltung ( $\rho = \text{const}$ )

- ▶ Horizontale Geschwindigkeiten viel größer als vertikale

$$w = 0$$

- ▶ vertikal integrieren

$$\int_H \mathbf{u} \, dz = \mathbf{U}$$

# Viereckiges flaches Honigbecken

brig bleibt...

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{u} - \nabla p + \nabla \cdot \mathbf{T} + \rho \mathbf{g}$$

$\Downarrow$

$$0 = -(f_0 + \beta y) \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{U} - gH \nabla h + \tau_s - \tau_b + A \nabla^2 \mathbf{U} \quad (3)$$

$$\frac{D\mathbf{U}}{Dt} = 0 \quad (4)$$

# Curl Operation

$$0 = \nabla \times \left[ -\mathbf{f} \times \mathbf{U} - gH\nabla h + \tau_s - \tau_b + A\nabla^2 \mathbf{U} \right]$$

# Curl Operation

$$\begin{aligned} 0 &= \nabla \times \left[ -\mathbf{f}(y) \times \mathbf{U} - gH\nabla h + \tau_s - \tau_b + A\nabla^2 \mathbf{U} \right] \\ &= -\beta V + \nabla \times (\tau_s - \tau_b) + A\nabla \times \nabla^2 \mathbf{U} \end{aligned}$$

# Stromfunktion

$$\mathbf{U} = \nabla \psi(x, y) \quad (5)$$

soll heißen...

$$U = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$$

$$V = \frac{\partial \psi}{\partial x}$$



# Stromfunktion

$$0 = -\beta V + \nabla \times (\tau_s - \tau_b) + A \nabla \times \nabla^2 \mathbf{U}$$

$\Downarrow$

$$0 = -\beta \frac{\partial \psi}{\partial x} + \nabla \times (\tau_s - \tau_b) + A \nabla^4 \psi \quad (6)$$

## weitere Approximationen

- ▶ Bodenreibung proportional zu **U**  
 $\tau_b = R\mathbf{U}$

## weitere Approximationen

- ▶ Bodenreibung proportional zu  $\mathbf{U}$

$$\tau_b = R\mathbf{U}$$

- ▶ keine laterale Reibung!

$$A\nabla^4\psi = 0$$

## weitere Approximationen

- ▶ Bodenreibung proportional zu  $\mathbf{U}$   
 $\tau_b = R\mathbf{U}$
- ▶ keine laterale Reibung!  
 $A\nabla^4\psi = 0$
- ▶ Windstress sinusoidale Funktion von  $y$   
 $\tau_s = F \cos(\pi y/B)$

## weitere Approximationen

$$0 = -\beta \frac{\partial \psi}{\partial x} + \nabla \times (\boldsymbol{\tau}_s - \boldsymbol{\tau}_b) + A \nabla^4 \psi$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} 0 &= -\beta \frac{\partial \psi}{\partial x} - R \nabla \times \mathbf{U} - F \nabla \times \cos(\pi y/B) \\ &= -\beta \frac{\partial \psi}{\partial x} - R \nabla^2 \psi + \frac{F\pi}{B} \sin(\pi y/B) \end{aligned}$$

$$R \nabla^2 \psi + \beta \frac{\partial \psi}{\partial x} = F \alpha \sin(\alpha y) \quad (7)$$

...mit  $\alpha = \frac{\pi}{B}$

# Analytische Lösung möglich

Inhomogene partielle Differentialgleichung 2er Ordnung.

$$R\nabla^2\psi + \beta\frac{\partial\psi}{\partial x} = F\alpha\sin(\alpha y)$$

# Numerische Lösung

- ▶ variable Beckenform
- ▶ variabler Windstress

# Finite Differenzen

TODO bild aus BSC gitter!



# Finite Differenzen

Beispiel  $\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}$  durch Taylorreihe diskretisiert:

$$\psi(x + \delta x) = \psi(x) + \frac{\delta x}{1!} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\delta x^2}{2!} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \dots \quad (8)$$

$$\psi(x - \delta x) = \psi(x) - \frac{\delta x}{1!} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\delta x^2}{2!} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \dots \quad (9)$$

# Finite Differenzen

Beispiel  $\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}$  durch Taylorreihe diskretisiert:

$$\psi(x + \delta x) = \psi(x) + \frac{\delta x}{1!} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\delta x^2}{2!} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \dots \quad (8)$$

$$\psi(x - \delta x) = \psi(x) - \frac{\delta x}{1!} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\delta x^2}{2!} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \dots \quad (9)$$

(8) - (9):

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} \approx \frac{\psi(x + \delta x) - \psi(x - \delta x)}{2\delta x}$$

# Here Ordnungen

Beispiel:  $\nabla^2$  an der Stelle  $(0, 0)$

$$\begin{aligned}\nabla^2 \psi(0, 0) &= \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} \\ &\approx \frac{\psi(1, 0) - 2\psi(0, 0) + \psi(-1, 0)}{\delta x^2} + \frac{\psi(0, 1) - 2\psi(0, 0) + \psi(0, -1)}{\delta y^2}\end{aligned}$$

# Numerische Lösung

$$R\nabla^2\psi + \beta\frac{\partial\psi}{\partial x} = W(x, y)$$

...erst mal ohne  $\beta\frac{\partial\psi}{\partial x}$

# Numerische Lösung

$$R\nabla^2\psi + \beta\frac{\partial\psi}{\partial x} = W(x, y)$$

...erst mal ohne  $\beta\frac{\partial\psi}{\partial x}$

$$\nabla^2\psi = W(x, y)$$

# Numerische Lsung

$$R\nabla^2\psi + \beta\frac{\partial\psi}{\partial x} = W(x, y)$$

...erst mal ohne  $\beta\frac{\partial\psi}{\partial x}$

$$\nabla^2\psi = W(x, y)$$

mit Randbedingung (willkrlich)

$$\psi_{bndry} = 0$$

# Jacobi-Methode

*first guess:  $\psi^{k=0} = \text{random}$*

$$\nabla^2 \psi_{i,j}^k = W_{i,j}$$

# Jacobi-Methode

*first guess:  $\psi^{k=0} = \text{random}$*

$$\nabla^2 \psi_{i,j}^k = W_{i,j}$$

*k:*

$$\nabla^2 \psi_{i,j}^k - W_{i,j} = \Phi_{i,j} \quad (10)$$



# Jacobi-Methode

*first guess:  $\psi^{k=0} = \text{random}$*

$$\nabla^2 \psi_{i,j}^k = W_{i,j}$$

*k:*

$$\nabla^2 \psi_{i,j}^k - W_{i,j} = \Phi_{i,j} \quad (10)$$

*k + 1:*

$$\nabla^2 \psi_{i,j}^{k+1} - W_{i,j} = 0 \quad (11)$$

# Jacobi-Methode

(11) - (10):

$$\nabla^2 \psi_{i,j}^{k+1} - \nabla^2 \psi_{i,j}^k = -\Phi_{i,j} \quad (12)$$

# Jacobi-Methode

einsetzen :

$$\begin{aligned}\frac{\psi_{i+1,j}^k - 2\psi_{i,j}^{k+1} + \psi_{i-1,j}^k}{\delta x^2} - \frac{\psi_{i+1,j}^k - 2\psi_{i,j}^k + \psi_{i-1,j}^k}{\delta x^2} + \dots &= -\Phi_{i,j} \\ \frac{-2\psi_{i,j}^{k+1} + 2\psi_{i,j}^k}{\delta x^2} + \frac{-2\psi_{i,j}^{k+1} + 2\psi_{i,j}^k}{\delta y^2} &= -\Phi_{i,j} \\ 2\delta y^2 \left( -\psi_{i,j}^{k+1} + \psi_{i,j}^k \right) + 2\delta x^2 \left( -\psi_{i,j}^{k+1} + \psi_{i,j}^k \right) &= -\Phi_{i,j} \delta y^2 \delta x^2 \\ 2 \left( \delta y^2 + \delta x^2 \right) \left( -\psi_{i,j}^{k+1} + \psi_{i,j}^k \right) &= -\Phi_{i,j} \delta y^2 \delta x^2 \\ \psi_{i,j}^{k+1} &= \psi_{i,j}^k + \Phi_{i,j} \frac{\delta y^2 \delta x^2}{2 \left( \delta y^2 + \delta x^2 \right)}\end{aligned}$$

s

a

a