


LA CONVENTION DIABÈTE

Initiative pour la Promotion de la Qualité et l'Epidémiologie du Diabète sucré (IPQED)


DONNÉES 2023-2024

Diabète de type 1


Caractéristiques




Contrôle de la glycémie




Examens annuels (par centre, % effectué) MEDIANE [P10-P90]



Facteurs de risque (% de patients présentant)



Complications (% de patients avec 1 ou plusieurs)



À retenir – DT1

- ▶ Chez les adultes atteints de DT1, la durée du diabète augmente et la population vieillit.
- ▶ En 2024 environ 25 % des patients utilisent une pompe à insuline.
- ▶ La prise en charge ciblée améliore le contrôle glycémique, le profil lipidique et la pression artérielle.
- ▶ Malgré l'augmentation de l'âge et de la durée du diabète, la prévalence des complications a diminué.
- ▶ Il convient toutefois de prêter attention au contrôle du poids à long terme et aux examens annuels des pieds.



LA CONVENTION DIABÈTE

Initiative pour la Promotion de la Qualité et l'Epidémiologie du Diabète sucré (IPQED)


DONNÉES 2023-2024

Diabète de type 2


Les patients recevant une ou deux injections quotidiennes d'insuline sont suivis depuis 2016 dans le trajet de soins. Les chiffres ci-dessous reposent exclusivement sur les patients recevant trois injections quotidiennes d'insuline ou plus (ou deux injections d'insuline en association avec un analogue du GLP-1).




Caractéristiques




Contrôle de la glycémie




Examens annuels (par centre, % effectué) MEDIANE [P10-P90]



Facteurs de risque (% de patients présentant)



Complications (% de patients avec 1 ou plusieurs)



À retenir – DT2

- ▶ Parmi les adultes atteints de DT2 recevant trois ou plus injections quotidiennes d'insuline traités dans le cadre de la convention, la durée du diabète augmente et la population vieillit.
- ▶ La prise en charge ciblée améliore le contrôle glycémique, le profil lipidique et la pression artérielle.
- ▶ Les complications oculaires et podologiques ont diminué ; les complications macrovasculaires et rénales ont augmenté, probablement en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation de la durée du diabète.
- ▶ Il convient toutefois de prêter attention au contrôle du poids à long terme et aux examens annuels des pieds.

