

Prediction, learning and games

1 Глава 2

1. Для iid последовательности Y_1, Y_2, \dots с $P(Y_i = 1) = p$. Будем ставить по большинству. \hat{Y}_{n+1} положим равным тому значению из 0 и 1, которое принимается большим числом Y_1, Y_2, \dots, Y_n . Если поровну, то ставим 0. Проведём оценки для случая $p < \frac{1}{2}$. Случай $p > \frac{1}{2}$ рассматривается симметрично, а случай $p = \frac{1}{2}$ рассмотрим отдельно.

$$\begin{aligned} P(\hat{Y}_{n+1} \neq Y_{n+1}) &= \sum_k P\left(\sum_{i=1}^n Y_i = k, \hat{Y}_{n+1} \neq Y_{n+1}\right) = \\ &= P(Y_1 + \dots + Y_n > n/2, Y_{n+1} = 0) + P(Y_1 + \dots + Y_n \leq n/2, Y_{n+1} = 1) = \\ &= (1-p)P(Y_1 + \dots + Y_n > n/2) + pP(Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n \leq n/2) = \\ &= (1-p)P(Y_1 + \dots + Y_n > n/2) + p(1 - P(Y_1 + Y_2 + \dots > n/2)) = \\ &= p + (1-2p)P(Y_1 + \dots + Y_n > n/2). \end{aligned}$$

Имеем

$$P(Y_1 + \dots + Y_n > n/2) \leq \frac{\mathbb{E}e^{\alpha(Y_1 + \dots + Y_n)}}{e^{\alpha n/2}} = \left(\frac{pe^{\alpha} + 1 - p}{e^{\alpha/2}}\right)^n.$$

При $\alpha = \ln \frac{1-p}{p}$ правая часть принимает значение $2\sqrt{p(1-p)}^n$. Матожидание регрета не превосходит

$$\sum_{k=0}^n (2\sqrt{p(1-p)})^k \leq \frac{1}{1 - 2\sqrt{p(1-p)}}.$$

Итак, регрет имеет константное матожидание. В случае $p = \frac{1}{2}$ матожидание лосса есть pn , и такое же матожидание лосса каждого из экспертов. Самые сложные распределения при $p \approx \frac{1}{2}$.

2.

3.

4.