## ma00aa

Calculates volume integrals of Chebyshev polynomials and metric element products.

[called by: dforce.] [calls: metrix.]

## contents

## 1.1 chebyshev-metric information

1. The following quantities are calculated:

$$\mathsf{DToocc}(\mathsf{l,p,i,j}) \ \equiv \ \int ds \ \overline{T}'_{l,i} \ \overline{T}_{p,j} \ \phi \phi d\theta d\zeta \ \cos\alpha_i \cos\alpha_j \tag{1}$$

$$\mathsf{DToocs}(\mathsf{1},\mathsf{p},\mathsf{i},\mathsf{j}) \equiv \int ds \, \overline{T}'_{l,i} \, \overline{T}_{p,j} \, \oint \!\!\!\!\! \oint \!\!\! d\theta d\zeta \, \cos\alpha_i \sin\alpha_j \tag{2}$$

$$\mathsf{TTsscs}(\mathsf{l},\mathsf{p},\mathsf{i},\mathsf{j}) \equiv \int ds \, \overline{T}_{l,i} \, \overline{T}_{p,j} \, \oint \!\!\!\! \oint \!\! d\theta d\zeta \, \cos \alpha_i \sin \alpha_j \, \overline{g}_{ss} \tag{6}$$

$$\mathsf{TTssss}(\mathsf{1},\mathsf{p},\mathsf{i},\mathsf{j}) \equiv \int ds \, \overline{T}_{l,i} \, \overline{T}_{p,j} \, \oint \!\!\!\! \oint \!\! d\theta d\zeta \, \sin \alpha_i \sin \alpha_j \, \overline{g}_{ss} \tag{8}$$

$$\mathsf{TDstcc}(\mathsf{l},\mathsf{p},\mathsf{i},\mathsf{j}) \equiv \int ds \, \overline{T}_{l,i} \, \overline{T}'_{p,j} \, \oint \!\!\!\!\! \oint \!\!\! d\theta d\zeta \, \cos\alpha_i \cos\alpha_j \, \bar{g}_{s\theta} \tag{9}$$

$$\mathsf{TDstcs}(\mathsf{1},\mathsf{p},\mathsf{i},\mathsf{j}) \equiv \int ds \, \overline{T}_{l,i} \, \overline{T}'_{p,j} \, \oint \!\!\!\!\! \oint \!\!\! d\theta d\zeta \, \cos\alpha_i \sin\alpha_j \, \bar{g}_{s\theta} \tag{10}$$

$$\mathsf{TDstcc}(\mathsf{1,p,i,j}) \quad \equiv \quad \int ds \ \overline{T}_{l,i} \ \overline{T}'_{p,j} \ \oint \!\! \oint \! d\theta d\zeta \ \cos\alpha_i \cos\alpha_j \ \bar{g}_{s\zeta} \tag{13}$$

$$\mathsf{TDstcs}(\mathsf{l},\mathsf{p},\mathsf{i},\mathsf{j}) \equiv \int ds \, \overline{T}_{l,i} \, \overline{T}'_{p,j} \, \oint \!\!\! \oint \!\! d\theta d\zeta \, \cos \alpha_i \sin \alpha_j \, \overline{g}_{s\zeta} \tag{14}$$

$$\mathsf{TDstss}(\mathsf{1},\mathsf{p},\mathsf{i},\mathsf{j}) \equiv \int ds \, \overline{T}_{l,i} \, \overline{T}'_{p,j} \, \oint \!\!\!\! \oint \!\! d\theta d\zeta \, \sin \alpha_i \sin \alpha_j \, \overline{g}_{s\zeta} \tag{16}$$

$$DDstsc(1,p,i,j) \equiv \int ds \, \overline{T}'_{l,i} \, \overline{T}'_{p,j} \, \oint \!\! \! \oint \!\! d\theta d\zeta \, \sin \alpha_i \cos \alpha_j \, \overline{g}_{\theta\zeta}$$
 (23)

where  $\overline{T}_{l,i} \equiv T_l \, \bar{s}^{m_i/2}$  if the domain includes the coordinate singularity, and  $\overline{T}_{l,i} \equiv T_l$  if not; and  $\bar{g}_{\mu\nu} \equiv g_{\mu\nu}/\sqrt{g}$ .

2. The double-angle formulae are used to reduce the above expressions to the Fourier harmonics of  $\bar{g}_{\mu\nu}$ : see kija and kijs, which are defined in preset.

ma00aa.h last modified on 7-07-26 15:09:58.00;

SPEC subroutines;