

Hloubeno : 7.1.2016

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 1VS

IČV :

NV : 212,24 m n.m.

Dokumentoval : Mgr.Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 536,25

Y : 700 759,49

AJ8

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁŠPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	R10 MÚK Kosmonosy
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,50		1		C10	clOr	2	I	0				1 Jíl se střední plasticitou – tmavě hnědý, humózní, svrchu prorostlý kořínky rostlin, tuhý humózní horizont
0,80		2		F6Cl	Cl	3	I	Q1	VN	PV	N	
			0,8–1,5									
		3		R6(CH)		3	I	Kt1	VN	N	N	2 Jíl se střední plasticitou – světle hnědý, šedě smouhovaný, frakce písku jemnozrná, s drobnými vápnitými zrnky, p.o.: 200 až 250 kPa, tuhý až pevný kvartér - fluvilární sediment
2,70			1,50									
		4		R6		3	I	Kt1				3 Eluvium slínovce – jíl s vysokou plasticitou – šedohnědý, s akumulacemi CaCO ₃ , se střípky slínovce v prtech roztíratelných, pevný, R6(CH)
4,80			2,50									4 Slínovec velmi zvětralý – šedý, střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce dobitelný, silně laminovaně vrstevnatý, velmi měkký, R6
6,00		5		R5		4	I	Kt2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, převážně úlomkovitě rozpadavý, v ruce lámavý, velmi tenké vrstevnatý, měkký, R5 křída - turon - teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek

NP 4,4–4,6 neporušený vzorek

VODA 4,76 vzorek podzemní vody

H 14–18 horninový vzorek

T 1,0–9,0 technologický vzorek