

Hloubeno : 9.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 228,53 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 480,71

Y : 699 182,05

HJ129

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50		1 0,5–2,0 T		CS0	Or	2	I	Orn				1 Písek jílovitý – tmavě hnědý, humózní, s ojedinělými valouny křemene do 4cm, tuhý humózní horizont
4,20		2		S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	2 Písek jílovitý – rezavý, nevytříděný s valouny křemene o vel. 1–10 cm v objemu 10–20%, na bázi zvodnělý, ulehlý
5,10		3 4,7–5,0 PQR	4,20	S3S-F	grSa	3	I	Q10	MN	V	PV	3 Písek s jemnozrnnou příměsí – rezavý, se štěrkem tvořeným valouny křemene o vel. 1–4 cm v objemu 30–40%, zvodnělý, ulehlý fluviální sediment - pleistocén - kvartér
5,90		4		R6/R5		3	I	K2				4 Slínovec mírně zvětralý – šedý, místy rezavě obarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámavý, hornina velmi měkká R6/R5
11,00		5		R5		4	I	K3				5 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámavý případně rozbitelný 1 úderem kladiva, hornina měkká R5 teplícké souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PQR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek