

Hloubeno : 19.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 216,14 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 283,15

Y : 699 938,06

J119

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁŠPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,60		1 POR		CHO	clOr	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – hnědočerný, litický, organická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–3 cm (>5 %), tuhá
1,20		2 0,7–0,9 POR		F8CH	saCl	3	I	Q13	NN	N	N	humózní horizont
1,90		3 1,2–1,4		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, béžově skvrnitý, s příměsí nevytřídněného písku, pevný
3,20		4		R6		3	I	K1				deluviální sediment - kvartér
5,00		5		R6		3	I	K1				3 Slínovec zcela zvětralý – béžový, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevného jílu, krájitelná nožem, hornina extrémně měkká
												4 Slínovec zcela zvětralý – béžový, šedivě a rezivě skvrnitý, střípkatý s jílovou výplní, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
												5 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v rukou, hornina extrémně měkká
												teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁŠPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek