

Hloubeno : 10.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 222,94 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 762,44

Y : 696 069,59

J185

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,70		1		MS0	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – černá, organická, litická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 2–5 cm (10 %), tuhá humózní horizont
0,80		2		F4CS	saCl	3		Q8	NN	PV	PV	
1,00		3		G5GC	saciGr	3		Q11	N	PV	PV	
2,00		4		G5GC	saciGr	3	I	Q11	N	PV	PV	2 Jíl písčitý – šedivý, rezivě skvrnitý, písčité frakce jemnozrnná, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–3 cm (>5 %), pevný
3,40		5		G5GC	saciGr	3	I	Q11	N	PV	PV	3 Štěrkl jílovitý – rezavý, štěrková frakce v podobě valounů 1–4 cm (50 %), písčité frakce střednězrnná, zpevněný, rozbitelný jedním úderem kladiva, ulehlý
4,90		6		S3S-F	Sa	3	I	Q10	MN	V	PV	4 Štěrkl jílovitý – rezavý, šedivě skvrnitý, štěrková frakce v podobě valounů 1–4 cm (50 %), písčité frakce hrubozrnná, zpevněný, rozbitelný jedním úderem kladiva, ulehlý
5,00		7		F8CH	Cl	3		Q7	NN	N	N	5 Štěrkl jílovitý – běžově hnědý, rezivě skvrnitý, písčité frakce střednězrnná, v úsecích 2,3; 2,7 a 3,2 zpevněný, ulehlý
5,30		8		S5SC	clSa	3		Q9	N	PV	PV	6 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – běžově hnědý, rezivě skvrnitý, písčité frakce hrubozrnná, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 5–10 cm (10 %), ulehlý
5,80		9		F8CH	Cl	3	I	Q7	NN	N	N	
6,00		10		F8CH	Cl	3		Q7	NN	N	N	7 Jíl s vysokou plasticitou – běžově šedý, rezivě skvrnitý, přeplavené eluvium slínovce, pevný
7,00		11		F8CV	Cl	3	I	Q7	NN	N	N	8 Písek jílovitý – běžově hnědý, rezivě skvrnitý, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–5 cm (>5 %), zpevněný, ulehlý
												9 Jíl s vysokou plasticitou – tmavě šedý, rezivě skvrnitý, přeplavené eluvium slínovce, čočkovitá struktura, tuhý až pevný
												10 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, rezivě skvrnitý, v mázdrách obsah hrubozrnného písku, výrazně vlhký, měkký
												11 Jíl s velmi vysokou plasticitou – běžový, rezivě a šedivě skvrnitý, příměs štěrkové frakce v podobě valounů křemene do 1 cm (>5 %), v hloubce 6,6 m poloha hrubého písku, pevný
												fluvilní sediment - pleistocén - kvartér
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
poloporušený
vzorekNP
neporušený
vzorekVODA
vzorek
podzemní vodyH
horninový
vzorekT
technologický
vzorek