

Hloubeno : 6.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,29 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 537,11

Y : 695 717,17

J190

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		SM0	sis0r	2	I	0rn				1 Písek hlinitý – tmavě šedohnědý, humózní, s ojedinělými valouny křemene do 2 cm v objemu do 10%, suchý, drobný, středně uhlý humózní horizont
1,60		2		S4SM	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	2 Písek jílovitý – rezavý, nevytříděný, s valouny křemene do 3 cm v objemu 10–15%, uhlý
2,00		3		F8CH	Cl	3	I	Q7	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – zelenošedý, pevný
3,00		4		S3S-F	Sa	3	I	Q10	N	V	PV	4 Písek s jemnozrnnou příměsí – rezavý, hrubozrnný, s hojnými valouny křemene do 4 cm v objemu 25%, uhlý
6,00		5		S3S-F	Sa	3	I	Q10	N	V	PV	5 Písek s jemnozrnnou příměsí – rezavě hnědý, středně až hrubozrnný, s ojedinělými valouny křemene do 6 cm v objemu do 5%, uhlý fluvální sediment - pleistocén - kvartér
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek