

Hloubeno : 3.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,51 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 944,52

Y : 694 224,87

J252

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1 POR 0,7-1,0		SMO	sisoř	2	1	Orn				1 Písek hlinitý – tmavě hnědý, humózní, s valouny křemene do 10 cm, pevný humózní horizont
1,50		2		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavě hnědý, písčitá frakce nevytříděná, pevný
2,40		3		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – šedohnědý, písčitá frakce nevytříděná, tuhý
3,34		4	3,34	S5SC	clSa	3	I	Q9	NN	PV	PV	4 Písek jílovitý – šedohnědý, a rezavý, nevytříděný, středně ulehlý (tuhý)
4,30		5		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	5 Jíl písčitý – šedý, písčitá frakce jemně až střednězrná, rezavě smouhvaný, tuhý
5,00		6		F8CH	saCl	3	I	Q7	NN	N	N	6 Jíl s vysokou plasticitou – černý, s příměsí jemně až středně zrného písku, silný organický oděr, tuhý fluvialní sediment - pleistocén - kvartér
6,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4-3,6poloporušený
vzorekNP
4,4-4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14-18horninový
vzorekT
1,0-9,0technologický
vzorek