

Hloubeno : 20.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 212,24 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 609,47

Y : 700 632,46

KS257

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30 0,50 0,70 0,90 1,00		1 2 3 4 5 6 7 8	1,71 1,90	MSO MSO F4CS F4CS F4CS	sasiOr sasiOr saCl saCl saCl	2 2 3 3 3	1 1 1 1 1	Or Or Q3 Q3 Q3				1 Hlína písčitá – hnědočerná, organická, litická, tuhá 2 Hlína písčitá – černá, organická, litická, pevná humózní horizont 3 Jíl písčitý – tmavě béžový, příměs štěrkové frakce v podobě valounů do 1 cm (>5 %), pevný 4 Jíl písčitý – světle béžový, bíle skvrnitý, obsahuje vápenaté čocky, tuhý 5 Jíl písčitý – tmavě béžový, písčitá frakce výrazně hrubozrnná, pevný 6 Jíl s vysokou plasticitou – šedý, rezivě a bíle skvrnitý, obsahuje vápenaté proplástky, tuhý 7 Písek jílovitý – okrově šedý, rezivě skvrnitý, hrubozrnný, zvodnilý, ulehlý 8 Písek jílovitý – okrově šedý, štěrková příměs v podobě valounů do 3 cm (10 %), ulehlý fluviální sediment - holocén - kvartér

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody