

Hloubeno : 25.8.2021

Vrtník : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 216,52 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 532,50

Y : 698 449,23

PJ143

| HLOUBKA<br>m | HORNINA GRAFICKY | ODBĚR VZORKŮ | HLADINA PODZEMNÍ VODY<br>m | TŘÍDA DLE ČSN 736133 | POJMENOVÁNÍ ZEMIN<br>DLE ČSN EN ISO 14688-1 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133 | GEOTECHNICKÝ TYP | NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO | VHODNOST PRO NÁSYPY<br>DLE ČSN 736133 | VHODNOST PRO PODLOŽÍ<br>DLE ČSN 736133 | I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP                                                                                                                        |
|--------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ±0=Nv        |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                       |                                        | MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN                                                                                                                         |
| 0,70         |                  | 1            |                            | MLO                  | siOr                                        | 2                          | I                          | Orn              |                           |                                       |                                        | 1 Hlína s nízkou plasticitou – béžově hnědá, příměs suboválné štěrkové frakce 1–3 cm (>5 %), tuhá                                                          |
| 0,90         |                  | 2            |                            | MLO                  | siOr                                        | 2                          | I                          | Orn              |                           |                                       |                                        | 2 Hlína s nízkou plasticitou – černohnědá, s prachovou litickou příměsí, organická, pevná                                                                  |
| 1,70         |                  | 3            |                            | CSO                  | Cl                                          | 2                          | I                          | Q3               | NN                        | NN                                    | NN                                     | humózní horizont                                                                                                                                           |
| 2,40         |                  | 4            | 2,24                       | F8CV                 | Cl                                          | 3                          | I                          | Q2               | VN                        | N                                     | N                                      | 3 Jíl písčitý – černý, na bázi se štěrkovou příměsí v podobě valounů 1–4 cm (>5 %), organický (10,9% dle lab. rozboru), tuhý                               |
| 4,20         |                  | 5            |                            | R6                   | Cl                                          | 3                          | I                          | K1               | VN                        | N                                     | N                                      | 4 Jíl s velmi vysokou plasticitou – béžový, rezivě a bíle skvrnitý, ve vrstevnatých plochách vápenaté výplně, pevný fluvialní sediment - holocén - kvartér |
|              |                  |              | 7,10                       |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                       |                                        | 5 Slínovec zcela zvětralý – tmavě béžový, šedivě skvrnitý, charakter velmi pevného jílu, krájitelný nožem, extrémně měkká hornina                          |
|              |                  |              | 9,10                       |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                       |                                        | 6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, dělitelný v menších úlomcích, úlomky dělitelné obtížně v rukou, případně nutný jeden úder kladivem, velmi měkká hornina  |
| 9,80         |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                       |                                        | 7 Slínovec slabě zvětralý – šedý, dělitelný ve větších úlomcích, k dělení nutné 2–3 údery kladivem, vzdálenost diskontinuit velmi malá, měkká hornina      |
| 14,00        |                  | 7            |                            | R5/R4                |                                             | 4                          | I                          | K3               |                           |                                       |                                        | teplické souvrství – svrchní křída                                                                                                                         |

## VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI  
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE  
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ  
N – NEVHODNÉ  
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ  
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI  
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ  
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ  
N – NAMRZAVÁ  
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ  
nN – NENAMRZAVÁ  
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ  
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek

NP 4,4–4,6 neporušený vzorek

VODA 4,76 vzorek podzemní vody

H 14–18 horninový vzorek

T 1,0–9,0 technologický vzorek