

Hloubeno : 30.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 226,04 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 848,98

Y : 694 228,80

PJ219

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TRÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1 NP 0,5–0,8		MLO	siOr	2	I	Orn				1 Hlína s nízkou plasticitou – hnědá, se šterkovou příměsí v podobě valounů křemene 1–5 cm (>5 %), slabě organická, tuhá humózní horizont
0,90		2		F4CS	clSa	3	I	Q14	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavý, slídnatý, písčité frakce střednězrná, pevný
2,10		3		F8CH	Cl	3	I	Q13	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – béžový, bíle a rezivě skvrnitý, v mezivrstvách polohách vápenaté mázdry, velmi pevný deluvialní sediment - kvartér
5,70		4	2,89	R6	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela až velmi zvětřalý – béžově šedý, převážně střípkatý s obsahem menších úlomků, dělitelný prsty, hornina extrémně měkká
10,00		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětřalý – béžově šedý, rozpad střípkatý s obsahem větších úlomků, dělitelný v ruku, hornina extrémně měkká
13,70		6		R5		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětřalý – šedý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný obtížně v ruku, případně po jednom úderu kladiva, hornina velmi měkká
14,00		7		R5/R4		4	I	K3				7 Slínovec slabě zvětřalý – šedý, úlomkatý, dělitelný 2–3 údery kladiva, hornina měkká teplícké souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek