

Hloubeno : 3.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Pištěk

NV : 218,73 m n.m.

X : 1 011 943,93

Souprava : Hyndaga

Dokumentoval : Pavlová

Y : 697 315,50

J28

| HLOUBKA<br>m<br><br>±0=Nv | HORNINA GRAFICKY | ODBĚR VZORKŮ | HLADINA PODZEMNÍ VODY<br>m | TŘÍDA DLE ČSN 736133 | POJMENOVÁNÍ ZEMIN<br>DLE ČSN EN ISO 14688-1 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133 | GEOTECHNICKÝ TYP | NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO | VHODNOST PRO NÁSPY<br>DLE ČSN 736133 | VHODNOST PRO PODLOŽÍ<br>DLE ČSN 736133 | I/16 Mladá Boleslav – Martinovice                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        | MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN                                                                                                                                                                                                 |
| 0,80                      |                  | 1            | 0,45                       | MIO                  | siOr                                        | 2                          | I                          | Orn              |                           | NN                                   | NN                                     | 1 Hlína se střední plasticitou – tmavě hnědá, s organickými zbytky, mírně zavlhlá (do 0,2m), velmi jemně slídnatá, tuhá humózní horizont                                                                                           |
| 1,15                      |                  | 2            |                            | F8CH                 | saCl                                        | 2                          | I                          | Q2               | VN                        | N                                    | N                                      | 2 Jíl s vysokou plasticitou – hnědý, limonitem rezavě smouhovaný, s písčitou příměsí v 1,1m, valounky křemene o vel. 1cm, tuhý<br>fluviální sediment - holocén                                                                     |
| 2,20                      |                  | 3            |                            | R6(CH)               | Cl                                          | 3                          | I                          | K1               | VN                        | N                                    | N                                      | 3 Slínovec – eluvium charakteru jílu s vysokou plasticitou, hnědošedý, limonitem rezavě smouhovaný, ztuhlá tence laminovaná vrstvenost, místy bílé vápnité konkrce, pevný místy s vápnitými konkrkami o velikosti až 3 cm, pevný   |
| 4,60                      |                  | 4            |                            | R6                   | Cl                                          | 3                          | I                          | K1               | VN                        | N                                    | N                                      | 4 Slínovec velmi zvětralý – světle šedé až šedohnědý (2,2–3,0m), tence laminovaný, střípky v ruce drobitelné, od 3,0 úlomkovitě rozpadavý, do 3,0m zcela zvětralý slínovec charakteru jílu s vysokou plasticitou, extrémě měkký R6 |
| 6,00                      |                  | 5            |                            | R5                   |                                             | 4                          | I                          | K2               | MN-N                      | N-PV                                 |                                        | 5 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, silně laminovaný (10–15mm), úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5<br>křída - turon/coniac- teplecké souvrství                                                      |

## VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI  
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE  
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI  
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ  
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  
3,4–3,6  
poloporušený  
vzorekH  
14–18  
horninový  
vzorekNP  
4,4–4,6  
neporušený  
vzorekT  
1,0–9,0  
technologický  
vzorekVODA  
4,76  
vzorek  
podzemní vody